

אופסומיט® טבליות מצופות 10 מ"ג

החומר הפעיל וكمותו:
כל טבליה מצופה מכילה:
10 מ"ג מאציטנטן (Macitentan 10 mg)

לרשימת החומרים הבלתי פיעלים, אנא ראה סעיף 6.

קרה בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

כרטיסים מידע בטיחותי למטופלים

בנוסף לעalon, לתכשיר אופסומיט קיימים כרטיסים מידע בטיחותי למטופלים, בנוגע לנזק אפשרי לעובר. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול באופסומיט ובמהלך הטיפול באופסומיט ולפיעול על פיו. יש לעיין בכרטיסים מידע בטיחותי למטופלים ובעalon לצריך בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס והעלון לעיון נוסף בעת הצורך.

אין ליטול אופסומיט אם את בהריון מאחר והשימוש בתרופה זו עלול להזיק לעובר (ראי סעיף 2 "לפני שימוש בתרופה" תת-סעיפים "אין להשתמש בתרופה אם" – "הריון, הנקה ופוריות").
אם את אישת בಗיל הפוריות העשויה להרות, יש לבצע בדיקת הריון לפני תחילת הטיפול באופסומיט ובאופן שגרתי כל חדש במהלך נטילת התרופה וכן חדש לאחר סיום הטיפול. יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת הריון. את חיבת להשתמש באמצעות המימן מניעת הריון במהלך השימוש באופסומיט, וכן חדש אחד לאחר סיום הטיפול (ראי סעיף 2 תחת סעיף 2 פוריות, הריון והנקה).

1. למה מיועדת התרופה?

- התרופה מיועדת לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי (PAH) במבוגרים, ומשמשת להאטת התקדמות המחללה.
- יתר לחץ דם ריאתי עורקי הינו לחץ דם גבוה בכל הדם המובילים דם מהלב לריאות (העורקים הריאתיים).
- אופסומיט מרחיב את עורקי הריאה ועל ידי כך מקל על הלב להזרים דם דרכם. זה מוריד את לחץ הדם, מקל את הסימפטומים ומשפר את מהלך המחללה.
- התרופה יכולה לשפר את יכולתך לבצע פעילות גופנית, להקל על התסמיינים ולדוחות את הצורך בטיפול נוספת. בנוסף, התרופה יכולה להפחית את סיכויך להתאשפז כתוצאה מהמחלה.

קובוצה רפואייתית: חוסם לקולtan אנדוותלי

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה אלרגי לחומר הפעיל (מאציטנטן), סודה או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.
- את בהריון, מתכנתת בהריון, או אם עוללה להיכנס בהריון מכיוון שאתה לא משתמש באמצעי מניעה אמינים. ראי גם סעיף "הריון, הנקה ופוריות".
- את מניקה. ראי גם סעיף "הריון, הנקה ופוריות".
- אתה סובל ממחלה בכבד או אם יש לך רמה גבוהה של אנזימי כבד בدم. היועץ ברופא והוא חיליט אם תרופה זו מתאימה לך.

**ażhorot miyadot haengavot leshimush batrufah
לפני הטיפול באופסומיט ספר לרופא שלך אם:**

- אתה סובל מאנמיה.
- אתה סובל מבעיות כליניות. התרופה עלולה לגרום לירידה נוספת בחץ הדם ולירידה ברמת המוגלבין בחולמים הסובלים מבעיות כליניות.
- אתה הגיע למazon כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני טיפול ב-PAH, כולל Opsumit עם מחלת חסימתית של עורק הריאה (חסימה של וריד הריאה), השימוש בתרופות לטיפול ב-PAH, כולל-ftaomiyut ורציניות בקוצר נשימה וחמצן נמוך, **יש לספר לרופא מיד**. הרופא שלך עשוי לבצע בדיקות נוספות, ולקיים איזה משטר טיפול הוא המתאים ביותר עבורך.

ילדים ומתבגרים
אין להשתמש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 18.

שימוש בקשישים
קיים ניסיון מוגבל בשימוש באופסומיט במטופלים מעל גיל 75. יש להשתמש באופסומיט בזיהירות בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב
לפני תחילת השימוש בתרופה ובמהלכו הרופא יפנה אותך לבצע בדיקות דם ב כדי לבדוק האם יש לך אנמיה (מספר נמוך של כדוריות דם אדומות) או ליקוי בתפקוד הכבד.

סימנים המעידים על אנמיה (מספר נמוך של כדוריות דם אדומות):

- סחרחות
- עייפות/תחושת חוליה/חולשה
- קצב לב מהיר, פעיםות לב מוגשות
- חיוורן

אם הנrk מבחין באחת מהתופעות אלו, **ספר לרופא שלך**

סימנים המעידים על ליקוי בתפקוד הכבד כוללים:

- בחילה (דחף להקיא)
- הקאה
- חום גבוה
- כאב בטן
- צהבת (הצהבת העור או הלבן שבעיניים)
- שתן בצלב כהה

- גרד בעור
- עייפות לא רגילה או תשישות
- **תסמיינים דמווי שפעת (כאבי מפרקים ושרירים המלוים בחום)**
אם הנר מרגיש באחת מתופעות אלו, **ספר מיד לרופא שלך**.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם **לקחת לאחרונה**, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- **ריפאמפיין, קלאריתרומיצין, טליתרומיצין, ציפורופולוקסצין, אריתרומיצין** (תכשיiri אנטיביוטיקה המשמשים לטיפול בZHOMIM)
- **פניטואין** (תרופה המשמשת לטיפול בהתקפים)
- **קארבאמאזפין** (טיפול בדיכאון ובאפילפסיה)
- **Wort St. John's** (היפריקום, תכשיר צמחי המשמש לטיפול בדיכאון)
- **ריטונאביר, סקוונאביר** (טיפול ב-**HIV**)
- **נאצוזון** (טיפול בדיכאון)
- **קטוקונאצול** (למעט שמפו), פלוקונאצול, איטראקונאצול, מיקונאצול, וויריקונאצול (טיפול בZHOMIM)
- **פטריזיטים**
- **אמידרון** (שליטה בקצב הלב)
- **ציקלוספורין** (משמש למניעת דחית איבר לאחר השתלה)
- **דילטיאזם, רופמייל** (טיפול ביתר לחץ דם או בעקבות מסויימות לבב)

שימוש בתרופה ומazon
ניתן ליטול עם או ללא מזון.
אם אתה נוטל **פיירין כתוסף תזונה**, זה עלול לשנות את האופן שבו הגוף מגיב לחלק מהתרופות הרפואיות, כולל אופסומיט. אם זה המקרה, אנא דבר עם הרופא שלך או עם הרוקח.

הריון, הנקה ופוריות:
אופסומיט עלולה לגרום לך לעוברים מהריון שהחל לפני או במהלך הטיפול בה. אם את אישת בגיל הפוריות העשויה להרות, הרופא שלך יבקש ממך לבצע בדיקת הריון **לפni** תחילת הטיפול באופסומיט ובאופן שגרתי **כל חודש** במהלך נטילת התרופה **וכן חדש לאחר סיום הטיפול**. יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת הריון. אל תיטלי את התרופה אם את בהריון או מתכנת להיכנס להריון. את חיבת להשתמש באמצעות מהימן למניעת הריון במהלך השימוש באופסומיט, וכן חדש אחד נוסף לאחר סיום הטיפול.

הרופא שלך או הגניקולוג שלך ידריכו אותך לגבי אמצעים מהימנים למניעת הריון במהלך השימוש באופסומיט. הרופא ימליץ לך על אמצעי מניעה אחד בעל יעילות גבוהה, למשל התקן תורן רחמי או קשירת החצוצרות או שימוש בשילוב של שיטות [כגון אמצעי מנעה הורמוני ואמצעי מנעה חוץ] (כגון דיאפרגמה, ספוגית למניעת הריון או שעל בן- הזוג שלך להשתמש אף הוא בקונדום) או שני אמצעי מנעה חוץ[ם]. התיעצי עם הרופא שלך בנוגע לשימוש בשתי שיטות למניעת הריון. במידה וניתוחך בין הזוג לכריתת צינור הזרע היא השיטה שנבחרה למניעת הריון, חובה להשתמש במקביל באמצעות הורמוני או חוץ.

דווחי לרופא שלך באופן מיידי אם נכנסת להריון במהלך השימוש באופסומיט, אם את חושבת שיתיכון שאת בהריון או אם את מתכנת להרות בעתיד הקרוב.
לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. אין להניך בזמן השימוש בתרופה. דברי עלך עם הרופא שלך.

נהיגה ושימוש במכונות:

תרופה זו עלולה לגרום לתופעות לוואי כגון כאב ראש וללחץ דם נמוך (ראה פירוט בסעיף 4), ותסמייני המחלת שלך גם עלולים לגרום לך להיות פחות כשיר לניהיגה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אופסומיט מכיל לקטוז, לציטין שמקורו בסויה ונתן. טבליות אופסומיט מכילות סוכר הנקרא לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך איסכילות לסתוכרים מסוימים, יש לידע את הרופא על כך לפני ניתוחת התרופה. בנוסף, טבליות אופסומיט מכילות לציטין המופק מסויה. אם אתה אלרגי לsonoia, אין ליטול את התרופה (ראה סעיף 2. "אין להשתמש בתרופה אם").

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מ"ג (טבלייה, למשל נטרן 23 מ"ג) לטליה, כלומר "נטול נטרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- תרופה זו תירשם לך על ידי רופא המנוסה בטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי בלבד.
- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
טבלייה אחת של 10 מ"ג פעמיים ביום, רצוי באותו השעה בכל יום.
אין לעבר על המנה המומלצת.

- יש לבളוע את הטבלייה בשלמותה עם כוס מים.
- אין **לעלום**, לחצות או לרסק את הטבלייה.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה
אם נטלה יותר טבליות מכלפי שנאמר לך לקחת, אתה עלול לחות כאב ראש, בחילה או הקאות. אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, קח את המנה הבאה כשאתה נזכר ולאחר מכן המשך בזמן הנטילה הרגלים. אין ליטול מנה כפולה ב כדי לפצוץ על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להמשיך בנטילת התרופה על מנת לשנות במחלתך. אין להפסיק את נטילת התרופה אלא אם כן הרופא הורה לך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הימך זיקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באופסומיט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אף אחת מהן.

יש לפנوت מיד לרופא אם:

- אתה סובל מסימנים העולים להיעיד על ליקוי בתפקוד הלבן כדוגמת: בחילה, הקאה, חום, כאב בטן, הצחבת העור והעיניים (צחבות), שתן כהה, גירוד בעור, עיפיות חריגת או תשישות (לאות או עייפות), תסמים נסמיים דמוני שפעת (כאבים בפרקם ובשריריהם המלווים בחום).

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי **שאין שכיחות** – תופעות שሞיפות ב-עד 1 משתמש מתוך 100 :
תగובות של רגשות יתר (נפיחות מסביב לעיניים, פנים, שפתיים, לשון או גרון, גרד /או פריחה).
אם הנר מבחן באחת מתופעות אלן, ספר מיד לרופא שלך.

תופעות לוואי שכיחות מאוד - תופעות שמויפות ביותר ביותר מ- 1 משתמש מתוך 10 :

- אנטמייה (מספר נמוך של כדורי דם אדומות) או ירידה בהמוגלובין

- כאב ראש
- ברונכיטיס (דלקת בדרכי הנשימה)
- דלקת של האף והגרון
- בצתת (ນפיחות בעיקר בקרסולאים וכפות הרגליים)

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמויפות ב- עד 1 משתמש מתוך 10 :

- דלקת גרון
- שפעת
- דלקת בדרכי השתן
- לחץ דם נמוך
- גודש באף (אף סתום)
- עלייה בתפקודי הכבד
- לויוקפניה (ירידה במספר תאי הדם הלבנים)
- טרומבווציטופניה (ירידה במספר טסיות הדם)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראיתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.
 - אין להשליך תרופות לביב או לאשפפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

ኖסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose (E460i), povidone K-30, sodium starch glycolate Type A, magnesium stearate (E572), polysorbate 80 (E433), polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), talc (E553b), soya lecithin (E322), and xanthan gum (E415).

כל טבילה מכילה כ- 37 מ"ג לקטוז.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות צבען לבן עד קרם (off white), קמרות בשני הצדדים, עגולות, מצופות, עם הכיתוב "10" בשני הצדדים.
כל אריזת אופסומיט מכילה 15 או 30 טבליות המסדרונות באריזות מגשית.
לא כל האריזות משוקחות.

יבואן ובעל הרישום וכתובתו:
ג'י-ס' הלט' קר בע"מ, קיבוץ שפים , 6099000 ישראל

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
152-72-34061-00
152-72-34061-01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
נערך ביולי 2021 , בהתאם להנחיות משרד הבריאות.