

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

פטרוקסימין קצף וטרינרי

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון

כל מיכל אלומניום מכיל 13.4 פטרוקסימין קצף וטרינרי, הכולל את החומר הפעיל:
ריפקסמין 100 מ"ג

Rifaximin 100 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה

לטיפול בזיהומים בקטריאלים של האיברים הגינטליים בפרות ובסוסות.
לטיפול באנדומטריטיס חריף וכרוני, מטריטיס, צרביציטיס, וולווגיניטיס ופיומטרה.

קבוצה תרפויטית- אנטיביוטיקה לשימוש תוך רחמי.

4. התוויות נגד

אין להשתמש בבעלי חיים בעלי רגישות ידועה לריפקסימין או לאנסמיצינים (ansamycins) או
לאחד מהמרכיבים הבלתי פעילים.

5. תופעות לוואי

יתכנו הופעת תגובות אלרגיות.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה: פרות וסוסות.

7. מינון ואופן המתן

פרות:

אנדומטריטיס חריף וכרוני, מטריטיס, צרביציטיס: (1/2-2 מיכלים) 50-200 מ"ג במתן חד-
פעמי בהתאם לגודל הרחם.
וולווגיניטיס- (1/2-2 מיכלים) 50-200 מ"ג בהפרש של 24 שעות מהמנה הראשונה.
פיומטרה: (1/2-2 מיכלים) 50-200 מ"ג לאחר ניקוי חלל הרחם, במנה חד פעמית, בהתאם
לגודל הרחם.

סוסות:

אנדומטריטיס חריף וכרוני: 100-400 מ"ג (1-4 מיכלים) במנה חד פעמית. בהתאם לגודל
הרחם. אפשר לחזור על הטיפול בהתאם להוראות הרופא הווטרינר המטפל.

8. אופן השימוש בתכשיר

למיכל סגר אוניברסלי (Rekord) המתאים לרוב קטטרי מתכת או פיפטות של הזרעה מלאכותית.

פרות:

1. מקם את צוואר הרחם בבדיקה רקטלית (Rectal Palpation).
2. החדר קטטר לרחם לאחר חיטוי השפתיים (Vulvar lips).
3. חבר הקטטר למיכל, ודא שהמיכל נמצא בצורה אנכית ובניצב לקטטר.
4. לחץ על כפתור המיכל למשך הזמן הדרוש כדי לקבל הרחבה מספקת של הרחם.
5. הסר הקטטר בזהירות מהרחם.

סוסות:

1. מקם את צוואר הרחם בבדיקה רקטלית.
2. החדר הקטטר לנרתיק עד צוואר הרחם (Cervix orifice) ואחר כך לתוך הרחם.
3. חבר הקטטר למיכל, ודא שהמיכל נמצא בצורה אנכית ובניצב לקטטר.
4. לחץ על כפתור המיכל למשך הזמן הדרוש כדי לקבל הרחבה מספקת של הרחם.
5. הסר הקטטר בזהירות מהרחם.

9. זמן המתנה:

אין צורך בזמן המתנה לחלב או לבשר.

10. אזהרות

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה**
יש לנער היטב לפני השימוש.
יש לתת פטרוקסימין קצף וטרינרי במתן וגנילי/רחמי.
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים**
 - במידת האפשר, יש להשתמש בתרופה אך ורק על בסיס תוצאות בדיקת רגישות.
 - שימוש בתרופה באופן שאינו תואם את המצוין בהוראות העלון עלול להוביל לעלייה בשכיחות החיידקים העמידים בפני הריפקסימינים והאנסמיצינים ולהפחית את יעילות הטיפול בתרופות אנטי מיקרוביאליות אחרות, בשל עמידות צולבת.
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר**
 - אנשים עם רגישות ידועה ל- ריפקסימין או לאנסמיצינים אחרים חייבים להשתמש בתכשיר בזהירות ולהימנע ממגע עם התרופה הווטרינרית.
 - מטעמי בריאות והגיינה תמיד מומלץ להשתמש בכפפות מגן בעת מתן תרופה גניקולוגית.
- **הריון והנקה של בעל החיים המטופל**
אין להשתמש במהלך ההריון. אין התוויות נגד לשימוש בזמן הנקה.
- **תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות**
לא ידוע.
- **מינון יתר**
מתן מנות יתר של קצף עלול לגרום לקרעים בדפנות הרחם.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל 25°C ולהגן מפני אור ומפני מקורות חום.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Liquid paraffin, Butane/Propane (75:25), Cetostearyl alcohol

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**
קופסת קרטון המכילה 6 מכלים של 13.4 גרם תרופה. לקצף צבע כתום-אדום.

- **בעל הרישום:**

ROMAT LTD.
HA'MAAPILIM 39/104 , HERZLIYA 4654327

- **יצרן:**

FATRO S.P.A.,
VIA EMILIA 285 - 40064 ,OZZANO EMILIA, BOLOGNA, ITALY

- **מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:**
081-40-92211
- **נערך ביולי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**