

ميوكولين جليينود 25 ملغ أقرصون

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على 25 ملغ بيتانيكول كلوريد

(bethanechol chloride 25 mg)

المواد غير الفعالة ومُسيبات الحساسية: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه

النشرة على معلومات موجزة عن التواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه

إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصِف هذا الدواء من أجله. لا تعطيه للأطفال؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك

تشابه بين حالاتك الصحية وحالتهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء معدّ لتخفيف عضلة المثانة البولية في حالات احتباس البول بعد عملية

جراحية لدى البالغين.

المجموعة العلاجية: محاكيات اللاودي، إسترات الكولين.

2. قبل استعمال الدواء

يُنَعَّم استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- كنت تعاني من الربو القصبي (bronchial asthma)؛
- كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم (ضغط دم منخفض)؛ ارتفاع ضغط الدم (ضغط دم مرتفع)؛ انخفاض وتيرة نظم القلب (وتيرة نظم القلب أفل من 60 نبضة في الدقيقة)؛ أو أمراض قلبية معينة (مرض الشريان التاجي، اضطرابات في التوصيل الكهربائي الأذيني البطيني)؛
- كنت تعاني من الصرع (مرض السقوط)، مرض الباركنسون (الشلل العنقسي)؛
- كانت لديك مشاكل في ضبط منعكس التبول نتيجة خلل في تناسق عضلات المثانة - عندما لا يحدث ارتخاء فعال في العضلة العاصرة (إحدى عضلات المثانة) في نفس الوقت؛
- اجتزت مؤخرًا عمليات جراحية في المسالك البولية أو الجهاز الهضمي - بسبب خطر التعافي في غير الكافي؛
- كان لديك انسداد في الأمعاء، أو المسالك البولية؛
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الرقمية؛
- كنت تعاني من فرط نشاط العصب المبهم (vagus nerve)؛ التهاب الجفون (peritonitis)؛
- كانت لديك قروح في المعدة أو الأمعاء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي قبل تناول ميوكولين جليينود 25 ملغ:

إذا كانت لديك مشاكل صحية أخرى.

إذا كنت تعاني من الحساسية.

إذا كنت تتناول أي دواء آخر (يشمل مستحضرات لا تتطلب وصفة طبية).

إذا كنت تعاني من اضطراب عصبي معين (اعتلال عصبي مُستقل)، مثلًا:

مرتبط بالسكري.

عند البدء بالعلاج يمكن أن تسبب التغييرات في الوضعية مثلًا عند الانتقال من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم الانتصابي).

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير معدّ للاستعمال لدى الأطفال دون سن 18 عاماً.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

• أدوية مضادة للكولين (مواد تخفف تأثير أستيل كولين، مادة ينتجها الجسم إنتاجًا طبيعيًا؛ مثل الأتروپين)، كينيدين وپروكليناميد تخفف تأثير بيتانيكول كلوريد.

بشكل مشابه، يخفف ميوكولين جليينود 25 ملغ تأثير الأدوية المضادة للكولين.

• تزيد مثبطات الكولينستيراز (مواد تثبط توكب أستيل كولين، مثلًا: في علاج مرض

الزهايمر أو مرض ألزهايمر العصلي الجذلي (myasthenia gravis)

مدة تأثير ميوكولين جليينود 25 ملغ. بشكل مشابه، يزيد ميوكولين جليينود 25

ملغ تأثير مثبطات الكولينستيراز.

• يمكن أن يسبب الاستعمال المتزامن لمستحضرات حاصرات العقد العصبية

انخفاضًا حادًا في ضغط الدم، يكون مسبقًا بآدم حال في البطن غالبًا.

استعمال الدواء والغذاء

لمنع الغثيان، يجب تناول ميوكولين جليينود 25 ملغ مع القليل من المشروب، قبل

نحو ساعة أو بعد ساعتين من تناول الوجبة.

الحمل، الإرضاع، والحساسية

لا يُنصَح بتناول هذا الدواء خلال فترة الحمل والرضاعة. يمكن أن يسبب بيتانيكول

كلوريد نقصات في الرحم وقد ينتقل عبر حليب الأم. عليك استشارة الطبيب أو

الصيدلي قبل تناول أي دواء.

السياقة واستخدام الماكينات

نظرًا للأعراض الجانبية المحتملة مثل الشعور بالدوار أو الدوخة، الغثيان،

انخفاض ضغط الدم، تنموش الرؤية وتغييرات في القدرة على تكيف العينين، يمكن

أن يطرأ تأثير سلبي على القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع

الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج

بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المعتادة للبالغين (إلا إذا حدد الطبيب بشكل آخر) هي 1-2 أقرص

(جرعة تعادل 25-50 ملغ بيتانيكول كلوريد)، لتناول حتى 4 مرات في اليوم

(توازي هذه الجرعة جرعة قصوى يومية مقدارها 8 أقرص أو 200 ملغ

بيتانيكول كلوريد).

يجب بدء العلاج بجرعة منخفضة، ثم رفع الجرعة حتى التوصل إلى النتيجة

المُروَّغ فيها.

لتسهيل الابتلاع، يمكن شطر القرص واستعماله فورًا. يجب ابتلاع كل نصفي

القرص معاً فور شطره.

يُنَعَّم سحق الأقرص.

ليست هناك معلومات عن مضغ الأقرص.

توجه إلى الطبيب إذا شعرت بأن تأثير ميوكولين جليينود 25 ملغ قوي جدًا أو

ضعيف جدًا.

في حال لم يطرأ تحسن على حالتك خلال 30 يومًا، يجب التوجه إلى الطبيب.

سيوفك الطبيب العلاج، ويصف لك علاجًا بديلًا.

إذا تناولت عن طريق جرعة أعلى توجه فوراً إلى الطبيب.

• شعور بالحُمى، شعور بالتوتر، وصداع

تشتمل أعراض الجرعة المفرطة على غثيان، تشنجات في البطن، حاجة ملحة للتبول، عدم السيطرة على التبول والتبرز، تعرق، انخفاض ضغط الدم (قد تحدث صدمة)، ضيق في أداء القلب، ربو، صعوبات في التنفس مع إفراز من القصبات الهوائية أو سيلان اللعاب الغزير.

إذا نسيت تناول ميوكولين جلينبود 25 ملغ

تناول الجرعة التالية في الموعد المخطط له. يُمنع تناول جرعة مضاعفة تعويضا عن الجرعة المنسية.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! افحص اللاصقة والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ميوكولين جلينبود 25 ملغ أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

• أعراض جانبية شائعة جدا (لدى أكثر من 1 من بين 10 متعالجين)

• زيادة إفراز اللعاب والتعرق

• حاجة ملحة للتبول

• احمرار الجلد

• أعراض جانبية شائعة (لدى 1 حتى 10 من بين 100 متعالج)

• ببطء وثيرة نبض القلب، أقل من 60 نبضة في الدقيقة (bradycardia)

• إسهال

• هبوط درجة حرارة الجسم (hypothermia)

• انخفاض ضغط الدم

• أعراض جانبية ليست شائعة (لدى 1 حتى 10 من بين 1,000 متعالج)

• غثيان وتقيؤات

• اضطرابات في الجهاز الهضمي

• مغص معوي

• أعراض جانبية نادرة (لدى 1 حتى 10 من بين 10,000 متعالج)

• بشكل خاص، مع بداية العلاج، يمكن أن تسبب التغييرات المفاجئة في الوضعية لشعور بالدوار أو الدوخة (انخفاض ضغط الدم الانتصابي)

• أعراض جانبية نادرة جدا (لدى أقل من 1 من بين 10,000 متعالج)

• زيادة إفراز الدموع، شوش الرؤية، تغييرات في قدرة العينين على التكيف
• ألم في الصدر، صعوبات في التنفس، تشنج القصبات الهوائية، صفير أثناء التنفس، لا سيما لدى المتعالجين الذين لديهم ميل لأن يشكوا من مشاكل في التنفس

• تجشؤ، قرحة في المعدة أو الأمعاء

• طفح جلدي (الدخنية البلورية – Miliaria crystallina)

5. كيف يُخزّن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد ولأول الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا يجوز التسبب بالتقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة/اللوحة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب التخزين دون 25°C. يجب التخزين في العبوة الأصلية لحمايته من الرطوبة

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Calcium sulfate dihydrate, maize starch, talcum.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص ميوكولين جلينبود 25 ملغ هي أقراص بيضاء، مسطحة مع خطر للشرط، ومطبوع عليها "MY25" في جانب واحد.

تحتوي كل عبوة على 50 أو 100 قرص.

قد لا تتسوّق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: بروفام م.ض.، ص.ب. 4046، بن غوروين 23، زخرون يعقوب 30900

اسم المنتج وعنوانه:

Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse

Arabellastrasse 17, 81925 Munich, Germany

رقم تسجيل المستحضر في سجل المستحضرات الرسمي في وزارة الصحة:

167-20-35286-00

تم تحريرها في أيار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.