

עלון לצריך לפי תקנות הרווחים (תקשירים) התשמ"א – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

שם התכשיר וצורתו: **מאלווקס פלאס תרחיף**

חומרים פעילים וכמותם ביחידות מינון:

כל כפיה (5 מ"ל) תרחיף מכילה:

אלומיניום הידרוקסיד	175 mg
מגנזיום הידרוקסיד	200mg
סימתייקן	25mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6.

קרא בעין את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווח.

שומר על עלון זה, יתכן ותצטרכך לקרוא בו שוב.
עליך להשתמש על פי ההוראות בסעיף המינון בעلون זה. היועץ ברווח אם הנך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא באם תסמי המחלת (סימפטומים) חמניים או אינם משתפרים.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

מאלווקס פלאס מכיל שלוש תרופות שונות: שתיים ששויות לקבוצה הנקראט סותרי חומצה ואחת שהיא נגד גזים.
מאלווקס פלאס משמש כסותר חומצה, נגד גזים ולהקללה על תחושת הצרבת במערכת העיכול.
קבוצה רפואיית: סותר חומצה ווסף גזים במערכת העיכול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם הנך:

- רגש (אלרגי) לאלומיניום הידרוקסיד, מגנזיום הידרוקסיד, סימתייקן, או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6). סימנים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבלעה או בנשימה, נפיחות בשפתים, בפנים, בגרון או בלשון.
- מרגיש תשישות חמורה.
- סובל מבעיות בכליות/אי ספיקת כליות.
- סובל מכאבים חזקים בבטן או מחסימת מעיים חריקת או מלאה.
- סובל מרמת זרחן (פואפאט) נמוכה בدم (היפופוטמייה). ניתן להזות מצב זה בבדיקה הדם שלו.

אין לך תחת את התרופה אם אחד מהסעיפים הנזכרים מעלה נוגע אליך. במקרה ואינך בטוח, שוחח עם הרופא שלך או הרווח, לפני השימוש בתרופה.

ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה:

פנה לרופא או לרווח לפני תחילת הטיפול אם:
- הנך נמצא בדיאת דלת זרחן.
אתה סובל מפורפירה ועובר המודיאליה.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

בילדים קטנים השימוש במגנזיום עלול לגרום להיפרמגנזה (יתר מגנזיום בדם), במיוחד אם הם סובלים מבעיה בכליות או מהתייבשות.

אם אתה נוטל, או אם נטلت לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרווח. אין לך תחת מאלווקס פלאס ותרופות אחרות באותו הזמן, מכיוון שמאלווקס פלאס עלול לפגוע בפעולות של תרופות אחרות. אם מאלווקס פלאס נלקח תוך שעה מתרופה אחרת, הוא יכול להשפיע על סיגת התרופה בדם.

תרופות מסוימות עלולות להיות מושפעות מפגנדים הידרואסיד או עלולות להשפיע על פעילותו של המגנים הידרואסיד.

יש להמתין פרק זמן של שניות לפחות בין נטילת תרופות אחרת לבין נטילת המאלוקס פלו (מרווח של 4 שעות לפחות אוורוקוינולין).

- במיוחד ספר לרופא או ברוק אם אתה נוטל, נטלת לאחרונה או עלול ליטול:**
- תכשירים הניתנים למחלות לב/חץدم כגון צינידין, מטפורולול, אטנולול, פרופרנולול, דיגוקסין
 - תכשירים לטיפול באנמיה כגון: מלחי ברזל
 - תרופות מקבצת גגד₂H הניתנות לטיפול בקיבת גאגן: סימטידין, רנטידין, פומוטידין
 - תכשירים לטיפול במילריה כגון: כלורוקווין, הידרואסיכלורוקווין
 - תרופות מקבצת ביסופוספונטים הניתנות לטיפול באוטופורוז או למחלת FAGT גאגן: סודיום אלנדראונט, סודיום אטידרונט, סודיום ריזדרונט
 - תכשירים לטיפול באלהגיות, דלקות או בתגובה בלתי תקינה של מערכת החיסון – גלאוקורטיקואידים
 - תכשירים לטיפול בחשופת – אטמברוטול, איזונייזיד
 - תכשירים לטיפול באלהומות גאגן: פלאורוקווינולין, לינקוזאמידים, קטוונזול טראציצילינים, צפלוספורינים (צפופודוקסימים, צפדיינר), ריפמפיקין.
 - תכשירים גירולפטים מקבצת פוטיאזינים גאגן: פלופנזין, תיוריידין
 - תכשיר לטיפול בעודף אשלגן – פוליסטרין סולפונאט (קיאקסאלאט –)
 - תכשירים נגד כאבים גאגן: דיפלוניל, אינדומטacen
 - תכשיר למניעת עששת גאגן: סודיום פלאוריד
 - תכשיר לטיפול בחסר הורמן של בלוטת התannis – לבוטירוקסן
 - תכשירים להורדת רמות כולסטרול בדם גאגן: רוזובסטטין
 - סיליצילטים, כולל אספירין
 - קלורפרומאדzin, (אנטי פסיכון)
 - ויטמינים
 - מתן משולב עם צינידין יכול לגרום להעלאת רמות הциינידין בדם.
 - מתן משולב עם תכשירים המכילים ציטראט יכול להעלות את רמות האלומיניום בעיקר בחולמים הסובלים מבעיות בתפקוד הכליה

שימוש בתרופה ומדוזן

ניתן לקחת את התרחיף עם מים או חלב.
יש לשותות את התרחיף 20 דקות עד שעה לאחר הארוחות וכן לפני השינה.

הירין והנקה

- יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה אם:
- הנך בהירין, עשוי להיכנס להירין או חושבת שהןך בהירין. אין להשתמש בתרופה בשלושת חודשי ההירין הראשונים.
- הנך מניקה או מתכנתת הנקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

מאלווקס פלוס מכיל סורביטול. תרופה זו מכילה 224 מ"ג سورביטול בכל מנה של 5 מ"ל سورביטול הוא מקור לפירוקטווז. אם הרופא אמר לך כי הנך סובל מבעיות של חסור סבילות או הפרעה בעיכול של סוכרם מסוימים, או אם אובחנת כוסובלמאי סבילות תורשתית לפירוקטווז ([HFI] hereditary fructose intolerance), הפרעה גנטית נדירה, שהסובלים ממנה אינם יכולים לפרק פירוקטווז, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד השתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן השימוש בתכשיר.
מיועד למנתן דרך הפה, יש לנער היטב לפני השימוש.
אם נחוץ ניתן לקחת את התרופה עם מים או חלב.
עליך להשתמש בכפיפות מדידה או בכוסית מדידה המיעודת לממדת הכמות הנכונה של התרופה. אין להשתמש בכפיפות ביתית לצורכי מדידת כמות התרופה. ה캡יות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

מינון מקביל למבוגרים, קשישים וילדים בני 12-18 שנים :
5-10 מ"ל , 4 פעמים ביום, 20 דקות עד שעה לאחר הארוחות וכן לפני השינה או לפני הוראות הרופא.

מינון מקביל לילדים בני 6-12 שנים :
5 מ"ל , 3-4 פעמים ביום, 20 דקות עד שעה לאחר הארוחות וכן לפני השינה או לפני הוראות הרופא.

אין לעبور על המנה המומלצת.
אם התסמים לא חולפים יש לפנות לרופא.

תרופה זו אינה מיועדת לילדיים מתחת לגיל 6 שנים.

אין לקחת יותר משבועיים ללא הוראת רופא.

בדיקות ועקב

אם עלייך לבצע בדיקות אבחנתיות בחומרים רפואיים רדיואקטיביים עלייך לדוח לרופא שהנק לוקח תרופה זו, כיוון שתוצאות הבדיקה עלולות להיות מושפעות מונוכחות אלומיניות.

אם נטלה בטיעות מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אחרת. במקרה זה הנך עלול לסבול משלשול, כאב בטן, נפיחות, הקאות, בעיות עיכול, צרבת, קיבת רגישה, עצירות, אובדן תיאבון, יובש בפה. אלו יכולות להיגרם מחסימת מעיים. מינונים גבוהים של התכשיר עלולים לגרום או להחמיר מחסור בזרחן, בעיות עצומות, עלייה ברמות הסידן בשתן, רככת העצומות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה השימוש במאלקוט פלווא עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות לוואי. "תיכון ולא תסבול מכך אחד מהן".

הפסק לוקח את התרופה וננה מיד לרופא או לחדר המיון של בית חולים אם:

תופעות לוואי עם שכיחות לא ידועה (לא ניתן להערכתה מהנתונים הקיימים): הנך סובל מרופיחה אדומה וגבשושית, נפיחות בעפיפיים, בפנים, בשפטים, בפה או בלשון, גרד, קשיי נשימה או בליעה. זו יכולה להיות תגובה אלרגית.

פנה לרופא אם הופעה תופעת לוואי, אחת מהתופעות הבאות מחמירה או מתמשכת יותר מספר ימים או הופעה תופעת לוואי שלא צוינה בעלון:

תופעות לוואי לא שכיחות(עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 100 מטופלים):

- עצירות

- שלשול

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 10,000 מטופלים): הירמאנזמיה (יתר מגנזיום בدم), כולל באבחנה לאחר שימוש ממושך במטופלים עם פגיעה בתפקוד הכליליות.

תופעות לוואי עם שכיחות לא ידועה (לא ניתן להערכתה מהנתונים הקיימים):

- היפופוסתמיה (ירידה ברמת הזרחן בדם) העולאה להופיע במינון גבוה של התכשיר ואף במינון רגיל, בעיקר במקרים הנמצאים בדיאטה דלת זרחן.

- היפראלומינניה (עליה חריגה של אלומיניום בדם)

- כאב בטן

ניתן לבדוק על תופעות לוואי למשרד הבריאות בזאת שמאפשרת לחיצה על הקישור "דיוח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופה" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon כדיוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלת. אין לגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא

אין להשתמש בתרופה אחרית תאריך התפוגה (Date. exp) המופיע על גבי הארזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- -30°C . אין להקפיא. יש לשמור את הקבקוק סגור היטב. לנער לפני השימוש.

לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים.

אין להשליך תרופות באשפה הביתי או לתוך הביוב הביתי. שאל את הרוקח שלך איך להשליך תרופות שאינן זקוקות יותר. אמצעים אלו יעדכו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

וסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Sorbitol liquid 70% (non crystallizing) 320mg/5ml, Hydroxypropylcellulose, Microcrystalline cellulose + Carmellose sodium, Lemon flavor, Citric acid Monohydrate, Hydrogen peroxide solution 30%, Swiss Cream flavor, Methylcellulose, Sodium saccharin 1.125 mg/5ml, Domiphen bromide 0.42mg/5ml, Purified water.

כיצד נראה תרופה ומה תוכן הארץיה

תרחיף מאלאקס פלווא הוא צבע לבן בטעם וריח של לימון וארוז בבקבוק לבן בגודל של 355 מ"ל.
עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר, אם יש לך שאלה כלשהי או איןך בטוח בדבר מה אתה פונה לרופא.
בעל הרישום וכתובתו: אונופי אונטטייס ישראל בע"מ; ת.ד 8090, נתניה.

נערך במאי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות:
1076520354
לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

MAALPLUS-SUS -17.0