

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب بيطري فقط
لاستعمال الحيوانات فقط

ماربوسيل أقراص للمضغ – 20 ملغ بيطري

يحتوي كل قرص: marbofloxacin 20 mg

ماربوسيل أقراص للمضغ – 80 ملغ بيطري

يحتوي كل قرص: marbofloxacin 80 mg

مواد غير فعالة:

Lactose, povidone, liver powder, yeast powder, anhydrous colloidal silice, crospovidone, hydrogenated castor oil, magnesium stearate.

المجموعة العلاجية: مضاد حيوي من فئة فلروكينولونات الجيل الثالث.

الفعالية الطبية: للكلاب – لعلاج عداوى الجلد

(مثلا: Skinfold pyoderma, impetigo, folliculitis, furunculosis, cellulites) عداوى في المسالك البولية (المتعلقة أو غير المتعلقة في التهاب البروستاتة) وعداوى في مجاري التنفس الناجمة عن الجراثيم الحساسة لـ marbofloxacin.

الجرعة: 2mg/1kg/day مرّة في اليوم.

كلاب متوسطة الحجم: ماربوسيل أقراص للمضغ 20 ملغ – قرص واحد لكل 10 كغم وزن جسم.

كلاب كبيرة الحجم: ماربوسيل أقراص للمضغ 80 ملغ – قرص واحد لكل 40 كغم وزن جسم.

مدة العلاج:

- في عداوى الجلد والأنسجة الرخوة تكون مدة العلاج 5 أيام على الأقل، ويمكن الاستمرار حتى 40 يومًا بحسب استمرار المرض.
- في العداوى في المسالك البولية تكون مدة العلاج 10 أيام على الأقل، ويمكن الاستمرار حتى 28 يومًا بحسب استمرار المرض.
- في العداوى في مجاري التنفس تكون مدة العلاج 7 أيام على الأقل، ويمكن الاستمرار حتى 21 يومًا بحسب استمرار المرض.

موانع الاستعمال: يُمنع الاستعمال للكلاب التي هي دون سن 12 شهرًا

(أو دون سن 18 شهرًا لدى الأنواع الكبيرة بشكل خاص للكلاب ذات فترة نمو طويلة جدًا مثل الكلب الدانماركي الضخم (Great Dane) وغيرها). يُمنع الاستعمال للعداوى الناجمة عن الجراثيم اللاهوائية، الخميرة والفطريات. يوصى باتخاذ الحذر عند الاستعمال للكلاب التي تعاني من مرض الصرع بسبب أعراض جانبية عصبية محتملة. معروف أن الفلروكينولونات تستجيب لإعطاء كاتيونات عبر الفم مثل ألومنيوم، كالسيوم، مغنيزيوم وحديد. في حالات كهذه يحدث انخفاض في التوافر البيولوجي. pH البول المنخفض ممكن أن يسبب ضررًا لفعالية المستحضر. يُمنع الاستعمال للقطط – يوصى لها بجرعات أقل.

في التجارب التي أجريت على الفئران والأرانب لم يُشاهد أي تأثير للدواء على إنثا الحيوانات الحوامل، لكن لم يتم فحص تأثير المستحضر على إنثا الكلاب الحوامل.

فرط الجرعة: ممكن أن يؤدي إلى اضطرابات عصبية خطيرة والتي يتم علاجها عرضيًا.

الأعراض الجانبية: في الجرعات الموصى بها لم تُشاهد أعراض جانبية خطيرة.

ممكن ظهور أعراض جانبية مثل تقيؤ، براز رخو، تغيير في العطش أو ازدياد في النشاط، هذه الأعراض ممكن أن تخففي بصورة تلقائية بعد

العلاج ولا تُلزم إيقاف العلاج.

لدى الكلاب الصغيرة ممكن ظهور تآكل في غضروف المفاصل، لذلك يجب اتخاذ الحذر عند الاستعمال والحرص على الجرعة لدى الكلاب الصغيرة.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

تحذير للمربي: إذا كنت تعلم بوجود حساسية لديك للفلوروكوينولات، يُمنع لمس المستحضر.

التخزين

- يجب الخزن بدرجة حرارة تحت 25°C.
- احتفظ به بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

المنتج: VETOQUINOL 70204 LURE CEDEX FRANCE

صاحب التسجيل: إيعزر لينفيتش م.ض.، أدوم 6، ص.ب. 7006، المنطقة الصناعية كانوت

رقم التسجيل لـ ماربوسيل أقراص للمضغ 20 ملغ بيظري:
083-92-92396

رقم التسجيل لـ ماربوسيل أقراص للمضغ 80 ملغ بيظري:
083-93-92397

تم تحريرها في تموز 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة