

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי התרופה  
משווקת על פי מרשם רופא וטרינרי בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

## מרבוציל טבליות ללעיסה 20 מ"ג וטרינרי

כל טבליה מכילה: Marbofloxacin 20 mg

## מרבוציל טבליות ללעיסה 80 מ"ג וטרינרי

כל טבליה מכילה: Marbofloxacin 80 mg

**חומרים בלתי פעילים:** Lactose, povidone, liver powder, yeast powder, anhydrous colloidate silice, crosopovidone, hydrogenated castor oil, magnesium stearate.

### קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הפלואורוקווינולונים דור שלישי

**פעילות רפואית:** בכלבים – לטיפול בזיהומי עור (לדוגמה, Skinfold pyoderma, impetigo, folliculitis, furunculosis, cellulites), זיהומים בדרכי השתן (קשורים או לא קשורים לפרוסטטיטיס) וזיהומים בדרכי הנשימה הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים ל Marbofloxacin.

**מינון:** 2mg/1kg/day פעם ביום.

כלבים בינוניים: מרבוציל טבליות ללעיסה 20 מ"ג – טבליה אחת ל-10 ק"ג משקל גוף.  
כלבים גדולים: מרבוציל טבליות ללעיסה 80 מ"ג – טבליה אחת ל-40 ק"ג משקל גוף.

### משך הטיפול:

- בזיהומי עור ורקמות רכות משך הטיפול יהיה לפחות 5 ימים וניתן להמשיך עד 40 יום, בתלות במהלך המחלה.
- בזיהומים בדרכי השתן משך הטיפול יהיה לפחות 10 ימים וניתן להמשיך עד 28 יום בתלות במהלך המחלה.
- בזיהומים בדרכי הנשימה משך הטיפול יהיה לפחות 7 ימים וניתן להמשיך עד 21 יום בתלות במהלך המחלה.

### התוויות נגד:

אין להשתמש בכלבים שגילם מתחת ל-12 חודשים (או מתחת ל-18 חודשים בזנים גדולים במיוחד של כלבים, בעלי תקופת גדילה ארוכה יותר כגון דני ענק ועוד).  
אין להשתמש בזיהומים הנגרמים ע"י חיידקים אנארוביים שמרים ופטריית. מומלץ להיזהר בשימוש בכלבים הסובלים מאפילפסיה עקב תופעות לוואי אפשריות נירולוגיות. פלואורוקווינולונים ידועים כמגיבים עם מתן אורלי של קטיונים כמו אלומיניום, קלציום, מגנזיום וברזל. במקרים כאלו יש ירידה של הזמינות הביולוגית. pH נמוך של השתן יכול לפגוע באפקטיביות התכשיר.  
אין להשתמש בחתולים- להם מומלצים מינונים נמוכים יותר.  
בניסויים על עכברים וארנבים לא נראתה השפעה של התרופה על חיות בהריון, אך לא נבדקה השפעת התכשיר על כלבות בהריון.

### מינון יתר:

עלול לגרום להפרעות נירולוגיות חמורות שיטופלו באופן סימפטומטי.

### תופעות לוואי:

במינונים המומלצים לא נצפו תופעות לוואי חמורות.  
תופעות לוואי כגון הקאה, צואה רכה, שינוי בצמא או עליה בפעילות עלולות להופיע, סימנים אלו נעלמים ספונטנית לאחר הטיפול ואינם מחייבים הפסקת הטיפול.  
בכלבים צעירים עלולה להופיע שחיקת סחוס במפרקים לכן יש להיזהר בשימוש ולהקפיד על המנה בכלבים צעירים.  
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

**אזהרה למגדל:** אם הנך יודע על רגישותך לפלואורוקווינולונים, יש להימנע ממגע עם התכשיר

### אחסון:

- לשמור מתחת ל- 25°C
- הרחק מהישג ידם של ילדים

היצרן: Vetoquinol 70204 LURE CEDEX, FRANCE

בעל הרישום: אליעזר לינביץ בע"מ, אדום 6, ת.ד. 7006, א.ת. כנות  
מספר הרישום של מרבוץיל טבליות ללעיסה 20 מ"ג וטרינרי: 083-92-92396  
מספר הרישום של מרבוץיל טבליות ללעיסה 80 מ"ג וטרינרי: 083-93-92397

נערך ביולי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.