

# نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبية فقط

## **پنتاسا تحاميل**

### **1 غرام**

التركيب:

تحتوي كل تحميلا على: 1 غم ميسالازين (mesalazine) المواضيع الفعالة: انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

#### **1. لم أعد هذا الدواء؟**

پنتاسا تحاميل معد لعلاج التهاب القولون التقرحي (ulcerative proctitis).  
الفصيلة العلاجية: دواء مضاد للالتهاب من عائلة الساليسيلات.

#### **2. قبل استعمال الدواء**

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت:

- حساساً (الديك حساسية) لميسالازين أو لأحد مركبات الدواء (انظر الفصل 6).
- حساساً (الديك حساسية) للساليسيلات الأخرى (مثل: أسيپيرين).
- تعاني من فشل كبدي أو كولي حاد.

#### **تحذيرات خاصة متطرفة باستعمال الدواء**

قبل بدء العلاج بالدواء أخبر الطبيب إذا كنت:

- تعاني أو عانيت في الماضي من مرض في الكبد أو الكلى.
- تتناول أدوية قد تؤثر في نشاط الكلى مثلًا: آزاثيوبيرين.
- معرضًا سابقاً لحساسية تجاه دواء يتضمن سولفالازين.
- تعاني من مشكلة في الرئتين، لا سيما من الربو.
- تطور لديك ذات مرة طفح جلدي خطير أو حدث لديك نقشر الجلد، بثرات و/أو قروح فموية بعد تناول ميسالازين.

#### **أثناء العلاج بالدواء**

- إذا بدأت تعاني بشكل مفاجئ من تشنجات في البطن، ألم في البطن، حمى، صداع شديد أو طفح - توقف عن تناول الدواء وتوجه إلى الطبيب فوراً.

• أثناء العلاج بميسالازين قد تتطور حصى في الكلى. يمكن أن تشمل الأعراض على آلام في جوانب البطن، وعلى دم في البول. يجب شرب كمية كافية من السوائل أثناء العلاج بميسالازين.

• يجب تجنب التعرض للحفاف أثناء تناول الدواء. قد يحدث الحفاف بعد التقويات وأو الإسهال المتواصل، الحرارة المرتفعة، والتعرق المفرط. في حال حدوث هذه الحالات استشر الطبيب أو الصيدلي في أسرع وقت.

الفحوصات والمتتابعة

أثناء العلاج بالدواء، قد يطلب منك الطبيب أن تجري فحوصات دم وبول للتتأكد من أن أداء الكلى سليم.

#### **التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طيبة ومكمّلات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- آزاثيوبيرين، 6 - ميركابوتبيورين أو ثيوچوانين.

• أدوية مضادة لتخثر الدم (مثلًا وارفارين).

#### **الحمل والإرضاع**

إذا كنت حاملاً، تخطّطين للحمل أو مرضعة، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء. هناك تجربة محدودة حول استعمال ميسالازين أثناء الحمل والإرضاع. قد يتطور الطفل أعراض حساسية بعد الرضاعة، مثلًا: إسهال. إذا تطور إسهال لدى الطفل، يجب إيقاف الرضاعة.

#### **السيافقة واستعمال الماكينات**

ليس هناك أي تأثير معروف للدواء في قدرتك على السيافقة وأو تشغيل الماكينات.

#### **3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تพتص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متتأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحدّدهما الطبيب فقط. للاستعمال لدى البالغين فقط، لا يوصى بالاستعمال لدى الأطفال. الجرعة الموصى بها عادة للبالغين هي حتى تحميلة واحدة في اليوم قبل النوم.

الدواء معد للعلاج الشرجي (عبر فتحة الشرج). بهدف إطالة مدة بقاء الدواء في الجسم، يوصى بعد الدخال إلى فتحة الشرج قبل النوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال پنتاسا تحاميل:

يُستحسن التبرز قبل إدخال التحميلة.

1. استعمل تحميلة واحدة من خلال تمزيق الغلاف وفق العلامة المشار إليها.

2. ضع إصبع مطاط على الإصبع الذي سوف تستعمله لتدخل التحميلة إلى فتحة الشرج.

3. أخرج التحميلة من غلاف البليستر قبل الإدخال، بواسطة دفع التحميلة عبر البليستر.

4. لتسييل عملية الإدخال، يمكن ترتيب التحميلة بقليل من الماء.

5. أدخل ببطء التحميلة كلها داخل فتحة الشرج. يمكن القيام بذلك بسهولة أكبر عبر الاستلقاء على جنبك ورفع ركبتك في الساق الأخرى.

6. أبق مستيقلاً لبعض دقائق بعد إدخال التحميلة لكي تبقى التحميلة في مكانها. إذا خرجت التحميلة من فتحة الشرج خلال الدقيقة الـ 10 الأولى، أدخلها مجدداً.

7. تخلص من الغلاف الفارغ، وإصبع المطاط، واصبع المطاط، واغسل يديك.

إذا كنت تتناول الدواء عن طريق الخطأ، إذا استعملت عن طريق الخطأ عدداً أكبر من التحاميل التي يتعين عليك استعمالها، أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء، إذا نسيت أن تستعمل هذا الدواء في الوقت المحدد، عليك استعماله فوراً تذكر، ولكن يجب الحفاظ على فارق زمني مده 6 ساعات على الأقل قبل تناول الجرعة القادمة.

لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال!

يجب المداومة على العلاج تبعاً للتوصيات الطبية.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يُمنع تناول الأدوية في الظل! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### **4. الأعراض الجانبية**

كجميع الأدوية، قد يُسبب استعمال پنتاسا أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل أنّ تعاني من أيٍ منها.

عند الاستعمال عبر فتحة الشرج، قد تشعر بأعراض جانبية موضعية مثلًا: حكة وانزعاج في فتحة الشرج، وحاجة طارئة إلى التبرز.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً في حال حدوث:

• بقع لونها حارماً على الجسم، غير مرتفعة، شبيهة بنقاط لعنة السهام أو مستدير، تكون مصحوبة غالباً بثارات في المركز، نقشر الجلد، قروح في الفم، البلعوم، الأنف، الأعضاء التناسلية والعينين. يمكن أن تحدث هذه الأعراض الخطيرة بعد حمى أو ملازمة شبيهة بالإلنفلونزا.

• حكة، طفح جلدي، تورم الوجه، الشفتين أو الحنجرة. صعوبات في التنفس أو صفير (علامات تشير إلى رد فعل حساسي).

• تضرر الجلد نتيجة رد فعل تحسسي أو عدوى (erythema multiforme Stevens-Johnson syndrome) الذي يلحق ضرراً بالجلد.

• تغيير كمية أو لون البول (علامات تشير إلى ضرر في الكلى).

• ألم في الصدر، ارتفاع وتيرة نبضات القلب، وتعب بعد بذل الجهد (علامات تشير إلى مشكلة في القلب).

• التهاب الكلى أو فشل كبدي. تشمل الأعراض على اصفرار العينين وأو الجلد، بول داكن، ألم في البطن، حمى، تعب أو غثيان.

• التهاب البكريات، ارتفاع وتيرة نبضات القلب، وتعب بعد بذل الجهد (علامات تشير إلى مشكلة في القلب).

• التهاب الأمعاء الداخلية من الأمعاء الغليظة.

• ارتفاع وتيرة شيوخها غير معروفة (لا يمكن تقييمها استناداً إلى المعلومات المتوفرة):

• حصى في الكلى مصحوبة بألم في الكلى (انظر أيضًا الفصل 2).

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٍ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

إلا إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يُمنع تناول الأدوية في الظل! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل

مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### **5. كيف يُخزن الدواء؟**

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم.

لا تسبب بالتفويت من دون تعليمات صريحه من الطبيب.

• يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

• يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة أقل من 25°C.

#### **6. معلومات إضافية**

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Povidone, macrogol 6000, magnesium stearate, talc.

كيف يَبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

تحامي مسليزيل، عليها نقاط، لونها أبيض مائل إلىبني ضارب إلى الأصفر. تحتوي كل عبوة على 28 تحميلاً، معبأة في بليستر يتضمن 7 تحميلاً و 28 إصبعاً مطاطياً.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: شركة فرينج فارماسيوتيكالس م.ض، شارع هشيطه 8، الحديقة الصناعية، قيساريا 3088900.

تم تحرير هذه النشرة في أيار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 26904 73 062.

لتسييل قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأنباء كل الجنسين.

DOR-Supp-0621-06