

עלון לצרכן לפי התקנות הרוקמים (תכשיצן לפי התקנות 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

הדלימה
תמיסה לזריקה
כל מרקו מוכן מראש/טמן מוכן מראש מכול אדאליומאב 40 mg Adalimumab
חוזרים בילה פעילים ואלרגנים ראה סעיף 6 "מידע נוסף ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התחמוה"
קורא בעיון את העניין עד סופו כטרם שתמשם בתרופה.
עלון זה מכיל מידע המציע על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקת. חרופה זו נרשמה לטיפול במחלתן. אל לעבור אותה לזרמים. אל לעולה לרוקם ללא איפיוס אם נראה לך כי מצבים יגבירו.
בנוסף לעלון, יקום כיוריסט מידע בנויותו למטופל "עלון" הוחכשר הדלימה תמיסה לזריקה, כרטיס זה מכיל מידע חשוב בענין לטיפול מיוחד לטיפול במחלת הטיפול הטיפול בהדלימה תמיסה לזריקה, ושמעל לפעול לפני, יש לך יו כיוריסט מידע בטריותו למטופל ובעלון לצרכן לפני שתחיל להשתמש בתכשיר זה. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

להשתמש בזה, חשוב כי בכל פעם שיתוך מקבל את התרופה בבית המרקחת, מודא כי אתה מקבל את אותה התרופה שהרופא מומחה שלך נשך לך. אם התרופה שלך קבלתה נראית שונה מזו שאתה מקבל בדרך-כלל או שהיא שונה משום מה, קשר עם הרוקת מיד על מנת לודא שקבלת את התרופה הנכונה. כל הלחצה או שינוי מיון של תרופה המכילה אדאליומאב תעשה לך על-ידי הרופא המומחה המספל. אנו בודק כי השם המסחר של התכשיר שפרטם על-ידי הרופא המומחה שלך, וזה לשם התרופה שקבלת מהרוקת.

1. יתנה מיוחדת התרופה?

הדלימה מועדת לטיפול ב:

- דלקת פרקים שריונית (Rheumatoid arthritis) פעילה, בעיקרת עד חמורה במבוגרים. כאשר טיפול מקובל אחר לא מצליח.
- דלקת מפרקים שריונית חמורה, פעילה ומתקדמת במבוגרים, אשר אל טופול עובר עם מטאקסאל (methotrexate).

דלקת חוליות מקשות (Ankylosing spondylitis) פעילה וחמורה במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.

- הסקאלר ספונדילוארטריטיס ללא עדויות רדיוגרפיות לדלקת חוליות מקשות (Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of spondyloarthritis) במבוגרים, כאשר היה הגובה אל מספרק או אי-כשירות מוחלט. טיפול ראשוני עם אדאליומאב (ASAs).
- דלקת מפרקים ספחיות (Psoriatic arthritis) פעילה ומתקדמת במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.
- ספחית בודית (Psoriasis) (Psoriasis) בוגרת עם חמורה במבוגרים, שמועדמים לטיפול סיסטמי.

הירדאדנטיס סופרטבה (Hidradenitis suppurativa) פעילה, בוגרת עד חמורה במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.

- הדלימה (Crohn's disease) פעילה, בוגרת עד חמורה במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח או שאינו מומאם.

דלקת כבית של המעי הגדול (Ulcerative colitis) פעילה, בוגרת עד חמורה במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח או במטופלים שלא קיילם לקבל טיפולם מקובלים אחרים.

יבאייטיס (Uveitis) -דלקת של העיבה (כוללת, אחרות או אמצעית), ממקור יד ירוחמי במבוגרים, כאשר טיפול בסטרואידים אינו מספק או אינו מומאם.

החלת בכבית המבטבת במעי (Intestinal Behcet's disease) במבוגרים, כאשר טיפול מקובל אחר לא הצליח.

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה זו אם:
<ul style="list-style-type: none">היך רגש אלרגי לאדאליומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לשיטת המרכיבים הלא פעילים, ראה סעיף 6 "מידע נוסף". יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים. יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני נטילת התרופה, ספר לרופא שלך אם:

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני נטילת התרופה, ספר לרופא שלך אם:

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

קבוצה תרפיטית: מדאס חיסון חוסם (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha

הדלימה מכילה את החומר הפעיל אדאליומאב, תרופה הפעלת על מערכת החיסון (ההגנה) של גופך. הסטרה של אדאליומאב היא הולון הקורא (TNF-α) Tumor Necrosis Factor alpha, שמונאס ברמות מוגברות במחלות הרוקמיות המפטרות מעלה. באמצעות הקישור של הדלימה ל-TNF-α, היא מפחיתה את התהליך הולקטי במחלות אלה.

תזונה אלנית
אם יש לך **תגבות אלונית** עם תסמינים כגון: לחץ בוחה, צלצועים, סחרחורת, נפיחות או פריחה, את תוריק יחור הדלימה יוצר קשר עם הרופא שלך מיד, כמיוון במעקבים צרימים, תופעות אלה יכולות להיות מסכנות חיים.

עיסון
אם יש לך **יורחם**, מלד ירוחם ממשך או ירוחם מקומי (למשל, כבד, ברזל), התייעך עם הרופא שלך לפני שתחיל לטול הרוקת או אחר כיוון, קשר עם הרופא שלך.

אם אתה עול לזריות ביורמים, חתך קולת ביוט סיפול בהדלימה, סיכון זה עלול להגביר אם תפודק יש לך ילום חסור, כולל מחלת יראת סרטן אוזרות מחדשת הנוגעות לשימוש בתרופה, חשוב שתספרי לרופא שלך אם יש לך תסמינים של ירוחמיס, למשל, חום, פעמים, חחושש יפוח, בעות שנים.

- יש לך אי-ספיקת לב בקנות או תמורה, חשוב לספר לרופא שלך אם היך אף על מבעים צרימים של הלב (ראה "אזהרות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה").

הסקל לטיפול את התרופה ופנה מיד ליעוץ רופא, אם אתה מבחין בתופעות הלוואי הבאות:
פריחה חמורה, סחרחורת או תסמנים אחרים של תגובה אלרגית.

נפיחות כבדים, ברויים, בריליים.

קשיש שגרת קשיש ביער.

קוצר נשימה במנוחה או נפיחות בכפות הרגליים.

ספר לרופא שלך בהרדם האפשרי אם אתה מבחין בכל אחת מתופעות הלוואי הבאות:
סימנים של ירוחם מוחים, הרגשת חול, פעמים, בעות שניים, צריבה בעת מרוק ששן.

הרגשת חולשה או עייפות.

הרגשת ישיעה, עקוצץ.

חיסור תחושה, אינטימפיה.

חולשה ברזע או ברזל.

בלטה או פגע פחוח שאינו נרפא.

סימנים ותסמינים המרמזים על בעות בדם כמו חום מוחמשך, בלחות, דמום, חיוורון.

התסמינים המתוארים מעלה יכולים להיות סימנים לתופעות הלוואי המפטרות לזהל, אשר געפו עם אדאליומאב:

תופעות לוואי שכיחות מאד (Very common) (משוות להשפע על יותר מ-1 מתוך 10 אנשים):

תגבות באזור הרוקת (כולל כאב, נפיחות, אדמומות או נדוד);

ירוחמיס בודים העשינה (כולל הרקחות, מלות, ירוחם בינוסיים, דלקת ראות);

כאב ראש, כאב ברגל.

התסמינים המתוארים מעלה יכולים להיות סימנים לתופעות הלוואי המפטרות לזהל, אשר געפו עם אדאליומאב:

תופעות לוואי שכיחות (Common) (משוות להשפע על עד 1 מתוך 10 אנשים):

ירוחמיס בודים הרוקת (כולל כאב, נפיחות, אדמומות או נדוד);

ירוחמיס במעי (כולל דלקת במערכת העיכול);

ירוחמיס במעי (כולל צלוציס ועקבת חוררת);

ירוחמיס בפה (כולל ירוחמיס בשיניים ופגעי קורן);

ירוחמיס במערכת הרבייה;

ירוחם בודים השתן;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;

ירוחמיס בפרקינים;