

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوّق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

هاديلما محلول للحقن
كل حقنة جاهزة مسبقاً / جاهز قلم مسبقاً تحتوي / يحتوي: <p>Adalimumab 40 mg</p>
لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية: انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء».
اقرأ النشرةتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضى في ذلك لتغطية الآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
تحتوي بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج» للمستهضر هاديلما محلول للحقن. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ هاديلما محلول للحقن، والتصريف وحقنها. يجب قراءة «بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج» والنشرة للمستهلكتمعن حتى قبل بدء إستعمال هذا المستحضر، يجب حفظ البطاقة لقراءتهاتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

نقلت إبتهايك، من المهم في كل مرة تتلقى فيها الدواء في الصيدلية، أن تتأكد من تلقاك الدواء ذاته الذي وصفه الطبيب المحضض الخاص بك، إلى بدا الدواء الذي لتلقيه مختلفا عن ذلك الذي لتلقاه عادة أو تغيرت تعليمات الإستعمال، لا يواصل الصيدلي حالاً لتأكد من تلقاك الدواء الصحيح، أي تبديل أو تغيير للمقدار الدوائي للدواء الراوي على الاديوماب يجب أن يتم فقط من قبل الطبيب المحضض المعالج، الرجاء تأكد من أن الإسم التجاري للمستحضر الذي وصف من قبل الطبيب المحضض الخاص بك مطابق لإسم الدواء الذي لتلقيته من الصيدلي.

1. أ. أعراض متخصص الداء؟

هاديلما مخصص للمعالجة:
إلتهاب المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid arthritis) ،النشط، المتوسط حتى خطير لدى الكبار، بعد فشل علاج إعتيادي آخر
إلتهاب المفاصل الروماتيزمي الشديد، النشط والمتقدم لدى كبار، لم يتعافوا في الماضي بيميثورتيكسات (methotrexate)
إلتهاب الفقار الرثاني (ankylosing spondylitis) النشط والشديد، لدى كبار، بعد فشل علاج إعتيادي آخر
إلتهاب المفاصل القفاري العموري بدون شواهد التصوير الشعاعي لإلتهاب الفقار الرثاني (Axial spondylitis)
عدم إستجابة غير كافية أو عدم تحمل للأدوية المضادة للإلتهاب الالاستيرويديه (NSAIDs).
إلتهاب المفاصل الالتهابي (psoratic arthritis) النشط والمتقدم، لدى الكبار، بعد فشل علاج إعتيادي آخر
الصدفية اللويحية (plaque psoriasis) المتوسطة حتى الشديدة لدى الكبار، المرشحن لعلاج جهازية.
إلتهاب الكبد الحفرقة اليهقي (Intradentis suppurativa) ،النشط، المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، عند فشل علاج إعتيادي
مرض كرون (Crohn’s disease) المتوسط حتى الشديد، لدى كبار، بعد فشل أو عدم ملائمة علاج إعتيادي آخر
إلتهاب القولون العرجي (Liberative colitis) ،النشط، المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، عند فشل علاج إعتيادي آخر
أو رد على متعالجين لا يمكنهم تلقي علاجات إعتيادية أخرى.
إلتهاب الكلى (VHS) –،إلتهاب العينية (الشامل، الخلفي أو المتوسط، من مصدر غير تلوئي لدى الكبار، عندما يكون العلاج بالمستيرويدات غير كاف أو غير مناسب.
مرض نُهجت الذي يتجلى في الأمام (disease Behçet’s intestinal) لدى الكبار، عند فشل علاج إعتيادي آخر.
الفصيلة الملاجية: منظم مناعي، حاجب TNF-α (Tumour Necrosis Factor).
تحتوي هاديلما على المادة الفعالة، أديالموماب، دواء يعمل على الجهاز المناعي (الداعي) لحسك. هدف أديالموماب هو بروتين الجسم TNF-α (Tumour Necrosis Factor). حيث يكون مسبقا مرتفعة بالأمرض الإلتهابية المتفصلة أعلاه، بواسطة إرتباط هاديلما بـ TNF-α، فهو يقلل من المسيرة الإلتهابية في هذه الأمراض.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا:
كنت حساساً (البرحي) لـ أديالموماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

وجدت لديك تلوئت متعلق، بما في ذلك السلس، أنظر تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء». من المهم أن تخبر طبيبك إذا وجدت لديك أعراض لتلوئات، مثل، سخونة، جروح، الشعور بالإرهاق، مشاكل في الأسنان.

وجدت لديك قصور متوسط أو شديد في القلب، من المهم أن تخبر طبيبك إذا وجدت لديك أو كانت لديك حالات قلبية خطيرة (أنظر «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء».

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل تناول الدواء، إتحك لطبيبك إذا:

إذا وجدت لديك **ردود فعل تحسسية** مع أعراض مثل ضغط بالصدر، صفير، دوام، إنتفاخ أو طفح، لا تحقن بعد الآن هاديلما وأصل طبيبك حالاً، لأنه وفي حالات نادرة، قد تشكل هذه الأعراض خطراً على الحياة.

تعثت
إذا وُجد لديك **تلوث**، يشمل تلوث لفترة طويلة أو تلوث موضعي (مثلًا، قترح بالرجل) إستشر طبيبك قبل بدء إستعمال هاديلما، إذا لم تكن واثقًا، إتصل طبيبك.
خلال تلقاك علاج ب هاديلما أنت قد تصاب بتلوئات بسهولة أكبر. هذه الخطورة قد تزداد إذا وجد لديك خلل في وظيفة الرئتين. تلك التلوئات قد تكون جدية وتشمل السلس، تلوئات ناتجة عن فيروسات، فطريات، طفيليات أو جرثيم. تلوئات إنتهازية أخرى تلوئات شاذة التي تتعلق بجهاز مناعي مضعف، وإتقان الدم (نحج دموي (sepsis)، قد تشكل هذه التلوئات في حالات نادرة خطراً على الحياة. من المهم إبلاغ طبيبك إذا تطورت لديك أعراض مثل سخونة، جروح، الشعور بإرهاق أو مشاكل في الأسنان. من شأن طبيبك أن يوصي بالتوقف بشكل مؤقت عن إستعمال هاديلما.

السلس
نظرا لأنه تم التبليغ عن حالات من **السلس** لدى مرضى عولجوا ب هاديلما، يفحص طبيبك فيما إذا توجد لديك علامات وأعراض للسلس قبل أن تبدأ العلاج ب هاديلما. هذا يشمل تقييم طبي شامل، بما في ذلك الأسواق الطبية لديك وفحوص استقصائية (مثلًا، تصوير بالأشعة السينية للصدر وفحص توبركولن (tuberculin test)). يجب توثيق الفحوص ونتائجها في بطاقة المتعالج الخاصة بك. من المهم جداً أن تحك لطبيبك إذا مرست ذات مرة بإسلس أو إذا كنت على إتصال قريب مع شخص أصيب بالسلس. يمكن أن يتطور السلس خلال العلاج، حتى ولو تلقيت علاجاً واثقاً ضد السلس. إذا ظهرت أعراض السلس (سعال متواصل، إخفاض الوزن، إتهالك، سخونة طفيفة، أو أي تلوث آخر خلال العلاج أو بعده، إتحك لطبيبك فوراً.

السفولتلوئات المتكسبة
إحك لطبيبك إذا كنت تسكن أو تتجول في مناطق فيها تلوئات فطرية محلية (متوطنة)، مثل ماء النويجات (histoplasmosis)، داء الفطور الكوكسيدية (coccidioidomycosis) أو فطور جرثومية (blastomycosis).
إحك لطبيبك إذا وجدت لديك سابقة تلوئات متكررة أو حالات أخرى تزيد الخطورة لحدوث تلوئات.

قيسيه الإتهاب الكبد الفيروسي نوع B

إحك لطبيبك إذا كنت حاملاً لفيروس الإتهاب الكبد من نوع **B (HBV-Hepatitis B Virus)**، إذا وجد لديك تلوث HBV نشط أو إذا كنت تعتقد أنك قد تكون معرضاً لخطورة العدوى بـ HBV.
إحك لطبيبك إجراء إختيار لـ HBV. هاديلما يمكن أن يؤدي إلى تجديد نشاط تلوث HBV لدى أشخاص حاملين لهذا الفيروس. في حالات معينة نادرة، بالأخص إذا كنت تتناول أخرى مثبطة لجهاز المناعة، يمكن أن يشكل تجديد النشاط لتلوث HBV خطراً على الحياة.

فوق عمر 65 سنة

إذا تجاوزت عمر 65 سنة، قد تكون حساساً أكثر لتلوئات خلال فترة إستعمال هاديلما. يتوجب عليك وعلى طبيبك الإنتباه بشكل خاص لعلامات تلوث خلال فترة علاجك ب هاديلما. من المهم أن تحك لطبيبك إذا وجدت لديك أعراض لتلوئات، مثل سخونة، جروح، الشعور بإرهاق أو مشاكل في الأسنان.

عملية جراحية أو علاج الأسنان
إذا كنت مقداً على إجتياز **عملية جراحية أو علاجات سنينة**، إحك لطبيبك أنك تستعمل هاديلما. من شأن طبيبك أن يوصي بالتوقف عن إستعمال هاديلما بشكل مؤقت.

مرضفيلوخلطيين(المالئين)
إذا كنت تعاني أو تتطور لديك **مرض زوال الخلتاين** (مرض يؤثر على الطبقة العازلة حول الأعصاب، مثل مرض التصلب المتعدد)، بقر طبيبك فيما إذا يتوجب عليك تلقي أو مواصلة تلقي هاديلما، إحك حالاً لطبيبك إذا وجدت لديك أعراض مثل تغيرات في الرؤية لديك، ضعف في الذراعين أو الرجلين أو خدر أو وبخ يذي جزء كان من الجسم.

لقاحات معينة تحتوي على أشكال مخففة لكها حية من الجرثيم أو الفيروسات المسببة لأمراض، حيث لا يجوز إعطاء هذه اللقاحات خلال فترة تلقاك هاديلما. تأكد من طبيبك قبل تلقي أية لقحة. إذا تحك هاديلما خلال فترة الحمل، فإن طفلك قد يكون معرضاً لخطورة أكبر للإصابة بتلوث وذلك حتى حوالي خمسة أشهر بعد تلقاك المقدار الدوائي الأخير أثناء الحمل. من المهم إبلاغ أطباء رضيعك وأفراد مهيين آخرين بحال الصحة بأنك إستعملت هاديلما خلال فترة الحمل الخاصة بك، ليكون بإمكانهم التقرر من يتوجب على رضيعك تلقي أي لقاح.

قصير القلب
إذا وجد لديك **قصور بسيط في القلب** وكنت تتعاج ب هاديلما، فإن وضع قصور القلب لديك يجب أن يكون تحت المراقبة الحثيئة من قبل طبيبك. من المهم أن تحك لطبيبك إذا وجدت لديك أو كانت لديك حالة قلبية جدية، إذا تطورت لديك أعراض جديدة لقصور القلب أو تفاقم للأعراض (مثلًا ضيق تنفس أو إنتفاخ راحتي القدمين، يجب الإتصال حالاً بطبيبك، بقر طبيبك إذا توجب عليك تلقي هاديلما.

سيخوك،كدمات،تقرح أو شجويح

بعد فشل الجسم لدى بعض المتعالجين في إنتاج كمية كافية من خلايا الدم التي تحارب التلوئات أو التي تساعد على إيقاف النزف، إذا تطورت لديك **سخونة** لا تزول، **أو كنت تترقق** أو تتقرح بسهولة كبيرة أو إذا كنت تبدو **شاحباً** جداً، إتصل طبيبك حالاً، من شأن طبيبك أن يقر إيقاف العلاج.

سيطان

تقد كانت هناك حالات نادرة جداً لأزواج معينة من **السرطان** لدى أطفال والبالغين يستعملون هاديلما أو حاجيات TNF-α أخرى، إن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتيزمي الشديد جداً، والذين يعانون من المرض لفترة طويلة، قد يكونون ذوو خطورة أكبر من المعدل لإصابة ب**ليمفوما** (خطورة الإصابة بليمفوما، بلوكيميا و سرطانات من نوع آخر قد تزداد، في حالات نادرة، لوحظ نوع معين خطير من الليمفوما لدى مرضى يستعملون هاديلما. بعض من أولئك المرضى عولجوا أيضاً ب (azathioprine) أو ميركاتيپورين (mercaptopurine).
إحك لطبيبك إذا كنت تستعمل (أنتوبورين أو ميركاتيپورين سوية مع هاديلما.

بالإضافة لذلك، لوحظت حالات **سرطان الجلد لدى نيسبت **ميلانوما****، لدى مرضى يستعملون هاديلما، إذا ظهرت مناطق جديدة لجلد مصاب خلال العلاج أو بعده، أو إذا تغير مظهر علامات موجودة أو مناطق مصابة، إحك لطبيبك.

كانت هناك حالات **سرطان، عددا ليمفوما**، لدى مرضى لديهم مرض رئوي من نوع معين يسمى مرض رئوي إسدادي مزمن (COPD) حيث تمت معالجتها بحاجب TNF-α آخر، إذا وجد لديك COPD، أو كنت من المدخنين بكثرة، عليك التناقش مع طبيبك فيما إذا كان العلاج بحاجب TNF-α مناسباً لك.

عظيمة،شبهة بالذئبة

في حالات نادرة، قد يؤدي العلاج ب هاديلما إلى حدوث متلازمة شبهة بالذئبة. إتصل بطبيبك إذا ظهرت أعراض مثل طفح مستمر مجهول السبب، سخونة، آلم في المفاصل أو إرتفاع الكرياتينين.

إذا كنت من المدخنين بكثرة، عليك التناقش مع طبيبك فيما إذا كان العلاج بحاجب TNF-α مناسباً لك (أنظر أعلاه فقرة «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء».)

الأطفال والمرافقين
هاديلما غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمرافقين دون عمر 18 سنة.

الإختلاط/الغفلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخرًا أو إذا من شأنك تناول، **أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.**

بالأخص إذا كنت تتناول:
إباتاسكيب هاديلما مع ميثورتيكسات (methotrexate) أو مع أدوية معينة من نوع disease-modifying agents anti-rheumatic (sulfasalazine)، هيدروكسي كلوروكوين (hydroxychloroquine)، ليفلوونيد (leflunomide) ومستحضرات الذهب الثمالي (gold salts)، كورتيكوستيرويدات أو مسكنات الآلم، بما في ذلك أدوية مضادة للإلتهاب الالستيرويديه (NSAIDs) non-steroidal anti-inflammatory drugs).

لا يجوز إستعمال هاديلما مع أدوية تحتوي على المواد الفعالة التالية (لعلاج إتهاب المفاصل الروماتيزمي، جراء أباتكيرا (anakinra)
إباتاسيب (abatacept)

إذا توفرت لديك أسئلة، الرجاء إرسال أسألك طبيبك.

الحمل والإرضاع

عليك التفكير في إستعمال وسائل منع حمل مناسبة ومواصلة إستعمالها لمدة 5 أشهر على الأقل بعد الحقنة الأخيرة من هاديلما.

إذا كنت في فترة الحمل، تطمين بأنه من الجائز أنك حامل أو تحظين للحمل، إستشيري طبيبك بخصوص إستعمال هذا الدواء.

يجب إستعمال هاديلما عند الحمل، خلال فترة الحمل، فقط إذا كانت هناك حاجة لذلك.
من خلال بحث تم خلال فترة الحمل، لم تكن هناك خطورة أكبر لحدوث تشوهات خلقية، عندما تلقك الأم الأديوماب خلال فترة الحمل. مقارنة بمهايات لديهن نفس المرض ولم يتلقين أديالموماب.
إذا تلقيت هاديلما خلال فترة الحمل، فإن رضيعك قد يكون معرضاً لخطورة زائدة للإصابة بتلوث.

من المهم إبلاغ أطباء رضيعك والأطباء المهين الأخرى من السجال الصحي عن إستعمالك ل هاديلما خلال فترة الحمل، وذلك حتى تلقى رضيعك أي لقاح (معلومات إضافية بخصوص اللقاحات أنظري الفقرة «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء».)

ل هاديلما قد يكون تأثيراً ضللاً على فترتك على السباقية، على ركوب الدراجة أو إستعمال الماكينات، بعد إستعمال هاديلما قد يظهر شعور بأن العرفة دوار (فوريذهو) وإضطرابات في الرؤية.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
تحتوي **هاديلما على صدوم وسورتوبول**، يحتوي هذا المستحضر الطبي على 20 ملغ سوريتوبول بكل حقنة جاهزة مسبقاً/قلم جاهز مسبقاً، إذا قبل لك من

قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بطبيبك قبل إستعمال هذا المستحضر الطبي.
كذلك، فإن هذا المستحضر الطبي يحتوي على أقل من 1 ميليومول صوديوم (ملغ) بكل مقدار دوائي ذو 0.8 مل، أي أنه فعلياً "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمتستضر.
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحدد من قبل الطبيب المعالج فقط.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الإستعمال

يعطى هاديلما بحقنة تحت الجلد (حقنة تحت الجلد)، لتعليمات الإستعمال، توجه للفقرة 7 «تعليمات الإستعمال».

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا قمت بالخطأ بحقن هاديلما بיותרة أكبر مما تحتاج، فأفضل طبيبك أو الصيدلي، وأشرح لها بأنك إستعملت مقداراً دوائياً أكبر، أحرص دائماً على تجنب الكزنون الخارجية للدواء، حتى ولو كانت باردة. إذا بدأ طفك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً لطبيبك أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحرص على الدواء منك.

إذا نسيبت إستعمال الدواء في الوقت المطلوب
إذا نسيبت أن تحقن نفسك، فعليك حقن المقدار الدوائي التالي من هاديلما لحقنة تتذكرك بذلك، بعد ذلك، إستعمل المقدار الدوائي التالي الخاص بك، كما كنت تستعمله في اليوم المحدد لك في الأصل، أنك لم تنس مقداراً دوائياً.

إذا توقفت عن إستعمال هاديلما

يجب مناقشة طبيبك بخصوص قرار التوقف عن إستعمال هاديلما. من شأن الأعراض أن تعود مع التوقف عن العلاج.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا تتناول الأدوية في العتمة، يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع العنقارات الطبية إذا لزم الأمر كذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال الدواء قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا ندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أغلب الأعراض الجانبية هي خفيفة حتى متوسطة، مع ذلك، فإن بعض منها من شأنه أن يكون جدياً ويتطلب علاجاً. من شأن الأعراض الجانبية أن تحدث حتى أو بعد الحقنة الأخيرة من هاديلما.

توقف عن إستعمال الدواء وتوجه حالاً لتلقي إستشارة طبية، إذا لاحظت الأعراض الجانبية التالية:

طفح شديد، شرى أو علامات أخرى لرد فعل تحسسي؛
إلتهاب في الوجه، في اليدين أو في القدمين؛
صعوبات في البلع؛
دمى تسرع عند بزل مجرود أو عند الإستلقاء أو إنتفاخ راحتي القدمين؛

إحك لطبيبك بأسرع ما يمكن إذا لاحظت أي من الأعراض الجانبية التالية:
علامات تلوئ، مثل سخونة، جروح، الشعور بوعكة، جروح، تلوئت الجيوب الأنفية، إتهاب الرئتين؛
الشعور بضعف أو إرتقا؛
سعال؛
خدر؛

إزدواج الرؤية؛
ضعف في الذراع أو الرجل؛
بروز أو جرح مفتوح لا يلتئم؛
علامات وأعراض تدل على متساك في جهاز الدم مثل سخونة متواصلة، كدمات، نزف، شجوب.

إن الأعراض التي وصفت سابقاً يمكن أن تكون علامات للأعراض الجانبية المتفصلة التالية، التي لوحظت أثناء إستعمال أديالموماب:
أعراض جانبية شائعة جداً (Very common) (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص؛
تلوئات في الطرق التنفسية (تشمل نزف، رشح، تلوئت الجيوب الأنفية، إتهاب الرئتين)؛
سعال؛
خدر؛

إزدواج الرؤية؛

ضعف في الذراع أو الرجل؛
بروز أو جرح مفتوح لا يلتئم؛

علامات وأعراض تدل على متساك في الجهاز الدم مثل سخونة متواصلة، كدمات، نزف، شجوب.

إن الأعراض التي وصفت سابقاً يمكن أن تكون علامات للأعراض الجانبية المتفصلة التالية، التي لوحظت أثناء إستعمال أديالموماب:

أعراض جانبية شائعة جداً (Common) (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص؛

تلوئات في الطرق التنفسية (تشمل نزف، رشح، تلوئت الجيوب الأنفية، إتهاب الرئتين)؛

سعال؛
خدر؛

إزدواج الرؤية؛
ضعف في الذراع أو الرجل؛
بروز أو جرح مفتوح لا يلتئم؛

علامات وأعراض تدل على متساك في الجهاز الدم مثل سخونة متواصلة، كدمات، نزف، شجوب.

إن الأعراض التي وصفت سابقاً يمكن أن تكون علامات للأعراض الجانبية المتفصلة التالية، التي لوحظت أثناء إستعمال أديالموماب:

أعراض جانبية شائعة (Common) (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص؛

تلوئات في الطرق التنفسية (تشمل نزف، رشح، تلوئت الجيوب الأنفية، إتهاب الرئتين)؛

سعال؛
خدر؛

إزدواج الرؤية؛
ضعف في الذراع أو الرجل؛
بروز أو جرح مفتوح لا يلتئم؛

علامات وأعراض تدل على متساك في الجهاز الدم مثل سخونة متواصلة، كدمات، نزف، شجوب.

إن الأعراض التي وصفت سابقاً يمكن أن تكون علامات للأعراض الجانبية المتفصلة التالية، التي لوحظت أثناء إستعمال أديالموماب:

أعراض جانبية شائعة جداً (Very common) (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص؛

تلوئات في الجهاز التنفسي (تشمل تلوئات في الأسنان وجروح البرد)؛

تلوئات في الجهاز التنفسي؛
تلوئت في المسالك البولية؛

تلوئات فطرية؛

تلوئات في المفاصل؛

إزوام حميدة؛
سرطان الجلد؛

ردود فعل تحسسية (تشمل تحسس موسمي)؛

تغيرات بالمزاج (تشمل إكتئاب)؛

قلق؛

صعوبات في النوم؛
إضطرابات في الحس، مثل الشعور بوخز، أو قلة الإحساس؛

شقيقة؛

أعراض ضغط على جذر العصب (تشمل آلم أسفل الظهر وآلم الرجلين)؛

إضطرابات في الرؤية؛

إتهاب العينين؛

إتهاب الحنق وإنتفاخ العين؛

فوريذهو (شعور بأن العرفة دوار)؛

الشعور بأن الفكين يبيض بسرعة؛

إرتفاع ضغط الدم؛

تورم؛

نزف دموي (إنتفاخ صلب يترافق بخثرة دموية)؛

سعال؛

ردو؛

ضيق تنفس؛

إحتراق رئوي؛

إضطراب في الهضم (تسرع الهضم، فحخة، حرقان)؛

مرض إرتداد الحصى (إرتجاع)؛

متلازمة سيكا (تشمل جفاف العينين وجفاف الفم)؛

طفح حاك؛

كدمات؛

إتهاب جلدي (مثل إكزيما)؛

إحترق رائل؛

نساقل شعر؛

جذابة أو تفاقم مرض الصدفية (psoriasis)؛

دم في البول؛

مشاكل كبدية؛

آلم في الصدر؛

وذمة (تراكم سائل في الجسم الذي يؤدي إلى إنتفاخ النسيج المصاب)؛

سخونة؛

إخفاض في عدد الصفيحات الدموية الأمر الذي يزيد من خطورة حدوث نزف وكدمات؛

خلل في السفاه؛

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon)(من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص؛

تلوئات الجهاز العصبي (تشمل إتهاب السحايا الفيروسي)؛

تلوئات إنتهازية (تشمل السلس وتلوئات أخرى تحدث عندما تضعف مقاومة الجسم للأمراض)؛

تلوئات جرثومية؛

إتهاب الريح (diverticulitis) (إلتهاب وتلوث القولون)؛

سرطان، بما في ذلك سرطان الجهاز اللعفاوي (لمفوما) ومelanoma (نوع من سرطان الجلد)؛

إضطرابات في الجهاز المناعي التي قد تؤثر على الرئتين، الجلد والتفدد اللعفاوية (على الأغلب كالحالة المسماة سرطونيةدية)؛

إتهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)؛

إرتجاع؛

إعتلال عصبي (ضرر عصبي)؛

سكتة؛

فقدان السمع، سماع طنين؛

الشعور بضربات قلب غير منتظمة مثل غياب نبضات؛

مشاكل قلبية قد تسبب ضيق تنفس أو إنتفاخ الكاحل؛

جودة قلبية؛

تشكل كسب جدار شريان مركزي، إتهاب وخرثة في الوريد، إسداد وعاء دموي؛

أمراض رئوية تسبب ضيق تنفس (تشمل إتهاب)؛

إنتفاخ رئوي (إنتفاخ رئوي في الرئة)؛

أمصاب حصى (pleural effusion) (تراكم سائل خلف الرئة)؛

صعوبة في البلع؛

وذمة في الوجه؛

إتهاب كيس المرارة؛

كبد شحمي (تراكم شحم في خلايا الكبد)؛

تقرح لبلي؛

تندب؛

تفكك عضلي شاذ؛

ذئبة إحصارية جهازية (systemic lupus erythematosus) (يشمل إتهاب في الجلد، القلب، الرئة، المفاصل)؛

أوجعزة أعضاء أخرى؛

إضطرابات في النوم؛

عجز جنسي (impotence)؛

إلتهابات؛

إبمات إتهاب في الأعصاب (مثل إتهاب في عصب العين، ومتلازمة جيليان- باريه (Guillain-Barré syndrome))

حالة التي قد تسبب ضعف العضلات، أحاسيس شاذة، وخز في الذراعين والجزء العلوي من الجسم)؛

تليف الرئة (تندب الرئة)؛

إنتفاخ في الأمعاء؛

إتهاب الكبد؛

إبمات إتهاب الكبد الفيروسي من نوع B من جديد؛

إتهاب كبدي مناعي ذاتي (إتهاب في الكبد ناتج عن جهاز مناعة الجسم)؛

إتهاب الأوعية الدموية بالجلد (إتهاب وندج جلدي)؛

متلازمة ستيفنس- ج