نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضَرات) - 1986
يُسوّق الدواء بدون وصفة طبيب

ميكال أقراص **Mical tablets**

المادّة الفعّالة وكمّيتها:
يحتوي كل قرص على:
كاربوسيستين 375 ملغم (carbocysteine)

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسيّة في المستحضر - انظر البند 6.

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة، فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدليّ.
يجب عليك تناول المستحضر بحسب تعليمات بند الجرعة في هذه النشرة. قم باستشارة الصيدليّ إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافيّة. يجب أن تتوجّه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسّن بعد 7 أيام.

1. لِمَ أعدّ هذا الدّواء؟
يخفف هذا الدّواء من لزوجة البلغم ويساعد في إخراجه. هذا الدواء مخصص لتخفيف الاضطرابات في الجهاز التنفسي والمصحوبة بإفراز بلغم متزايد و/أو لزج.

المجموعة العلاجيّة: طارد للبلغم

2. قبل استعمال الدواء:
يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسيّة (حساساً) لكاربوسيستين أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).
تشمل علامات ردود الفعل التحسسية: الطفح الجلدي، مشاكل في التنفس أو البلع، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان.
- كنت تعاني من تقرّح في المعدة أو في الأمعاء.

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء
قبل بدء العلاج بميكال أقراص، أعلم الطبيب إذا:
- كنت كبيرًا بالسّن
- عانيت في الماضي من تقرّح في المعدة أو في الأمعاء

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية
إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخّرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبّية والمكمّلات الغذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك. وبشكل خاصّ، إذا كنت تتناول:
- أدوية أخرى من شأنها أن تسبب النّزيف في المعدة

الحمل والإرضاع
لا يُنصح باستعمال ميكال أقراص خلال فترة الحمل والإرضاع.
يُمنع استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت حاملًا، قد تكونين حاملاً، تخططين لتحملي، إذا كنت مرضعةً أو تخططين للإرضاع.

3. كيف تستعمل الدواء؟
يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة المتّبعة عادة، هي:
قرصان، 3 مرات في اليوم. عند حصول تحسّن، بالإمكان التقليل لقرص واحد 4 مرات في اليوم.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج:
إذا لم يحصل تحسّن في حالتك خلال 7 أيام، يجب مراجعة الطبيب. لكن، إذا تفاقمت حالتك الصحية خلال العلاج، فيجب مراجعة الطبيب قبل مرور 7 أيام من العلاج.

طريقة التناول: يجب ابتلاع الدّواء مع قليل من الماء. بالإمكان شطر أو سحق الأقراص قبل ابتلاعها مباشرة. يُمنع الاحتفاظ بأقراص مشطورة أو مسحوقة.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى، فمن الممكن أن تعاني من تلبّك معوي (اضطراب في الجهاز الهضمي).
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمّية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدّد، يُمنع تناول جرعة مضاعفة. قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد، واستشر الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوائيّة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظّارات الطبّية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشِر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية:
كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال ميكال أقراص أعراضًا جانبيّة لدى قسم من المستخدمين. لا تندهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. من المحتمل ألّا تعاني من أيٍّ منها.
يجب وقف الاستعمال والتوجّه إلى الطبيب فورًا أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى في الحالات التالية:
- ردّ فعل تحسّسي. تشمل العلامات: طفح جلدي، مشاكل في التنفس أو البلع، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحلق أو اللسان.
- حويصلات أو نزيف على الجلد، بما في ذلك حول الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية. من الممكن أن تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض شبيهة بالأنفلونزا والحمّى - من الممكن أن تشير هذه الأمور إلى المتلازمة المسمّاة متلازمة ستيڤنز جونسون (Stevens-Johnson syndrome).
- قيء دموي، براز أسود كالزّفت.

يجب إعلام الطبيب أو الصّيدلي إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية التالية أو استمر لأكثر من عدّة أيام:
- الغثيان أو التقيؤ
- الإسهال
- ألم البطن (مغص)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبيّة أو إذا عانيت من أعراض جانبيّة غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:
من الممكن تبليغ وزارة الصحّة عن أعراض جانبيّة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحّة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبيّة، أو عبر دخول الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يخزن الدواء؟
- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيّؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحيّة (exp.) الظاهر على العبوّة. تاريخ انتهاء الصلاحيّة ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين
- يجب التخزين في درجة حرارة تحت 25°C.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المادّة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا:
microcrystalline cellulose, starch pregelatinised, povidone, sodium starch glycolate, colloidal silicone dioxide, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوّة:
تحتوي العبوّة على 20 قرصًا أبيضا مغلفة في شريطين.

اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:
سام أون م.ض. شارع أيهود كينمون (هعڤودا) 25، بات يام.

تم تحرير هذه النشرة بتاريخ 07/2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحّة:
121-18-30069-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.