

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إمترىثير تيقع

أقراص مطالية
التركيب:

يحتوي كل قرص مطالي على:
إمترىسيتابين 200 ملغم (Emtricitabine 200 mg)

تينوفوقيق ديسوبروكسيل (ك فومارات) 245 ملغم (Tenofovir Disoproxil as fumarate) 245 mg

المعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولادات الحساسية أنظر الفقرة 2-6 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6- "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. إذا توفرت لديك أسلطة هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء مخصص لكتاب تجاوزوا عمر 18 سنة.

بالإضافة للنشرة، توفر إمترىثير تيقع كراسة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه الكراسة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ إمترىثير تيقع والتصرف وفقها. يجب قراءة كراسة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ الكراسة لقراءتها ثانية إذا دعت الحاجة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟
إمترىثير تيقع هو علاج لتلوث فيروس العوز المناعي البشري (HIV) لدى الكبار بعمر 18 سنة وما فوق، بمشاركة أدوية إضافية مضادة للفيروسات الرجعية.

الفحصية العلاجية:
مثبتات ترانسكريبتاز العكوس المضادة للفيروسات.

يحتوي إمترىثير تيقع على مادتين فعاليتين، إمترىسيتابين و تينوفوقيق ديسوبروكسيل. هاتان المادتان الفعاليتان عبارة عن دوائين مضادين للفيروسات الرجعية المستعملين لعلاج تلوث HIV. إمترىسيتابين هو مثبت نوكليوزيدي للترانسكريبتاز العكوس و تينوفوقيق عبارة عن مثبت نوكليوتيدى للترانسكريبتاز العكوس. مع ذلك، كلا الدوائين يعرفان عادة كمثبتات نوكليوزيدية للترانسكريبتاز العكوس (NRTIs) و عملهما هو الإخلاص بالنشاط الإعتيادي للإنزيم (ترانسكريبتاز العكوس) الذي يعتبر ضروريًا لمисيرية إستنساخ فيروس الـ HIV.

يستعمل إمترىثير تيقع لعلاج تلوث فيروس العوز المناعي البشري 1 (HIV-1)، لدى الكبار بعمر 18 سنة وما فوق.

• دائمًا يجب إستعمال إمترىثير تيقع بمشاركة أدوية أخرى لعلاج تلوث HIV.

• بالإمكان تناول إمترىثير تيقع بدلًا من تناول إمترىسيتابين و تينوفوقيق ديسوبروكسىيل كلا على حدة عندما يقصد بنفس المقادير الدوائية. أثناء تناول الدواء، فإن حاملي HIV قد لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس، بالرغم من إنخفاض الخطورة جراء علاج ناجع مضاد للفيروسات الرجعية. يجب إستشارة طبيب بخصوص وسائل الحذر اللازمة لمنع العدوى.

هذا الدواء لا يشفى من تلوث HIV. أثناء تناول إمترىثير تيقع فقد لا يزال بالإمكان أن تتطور لديك تلوثات أو أمراض أخرى تتعلق بـ HIV. حتى عندما تناول هذا الدواء فقد لا يزال بإمكانك نقل HIV، بالرغم من أن علاجاً ناجعاً بدواء مضاد للفيروسات الرجعية يقلل من الخطورة. إستشر الطبيب بخصوص إجراءات الحذر الالزمة لمنع العدوى.

• يستعمل إمترىثير تيقع أيضًا لتقليل خطورة العدوى بـ 1-HIV لدى الكبار، عندما يتم تناول الدواء كعلاج يومي، بمشاركة سلوك جنسي آمن:

أنظر الفقرة 2، قائمة إجراءات الحذر التي يجب اتخاذها ضد العدوى بـ 1-HIV.

2) قبل إستعمال الدواء:
لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (اليرجي) لـ إمترىسيتابين، تينوفوقيق، تينوفوقيق ديسوبروكسىيل أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (مدونة في الفقرة 6).

إذا إنطبق عليك أيًا مما ذكر، فعليك إبلاغ الطبيب حالاً بذلك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل إستعمال إمترىثير تيقع من أجل تقليل خطورة العدوى بـ HIV: يمكن أن يساعدك إمترىثير تيقع في تقليل خطورة العدوى بـ HIV فقط إذا لم تصاب بعد بالعدوى.

• قبل بدء العلاج بـ إمترىثير تيقع، عليك ألا تكون حاملاً لـ HIV وذلك من أجل تأكيد من عدم كونك حاملاً لـ HIV حالياً. لا تتناول إمترىثير تيقع على حاملي HIV إلا إذا تأكيد من أنك لست حاملاً لـ HIV.

يتوجب على حاملي HIV تناول إمترىثير تيقع بمشاركة أدوية أخرى.

• الكثير من فحوص تحديد حمل HIV قد لا تشخص عدوى حدث مؤخرًا. إذا كنت مصاباً بمرض يشبه الإنفلونزا، فمن الجائز بأنك قد أصبت مؤخرًا بـ HIV. العلامات التي قد تدل على العدوى بـ HIV هي:

إرهاق؛ سخونة؛ آلام في العضلات أو في المفاصل؛ صداع؛ تقيؤات أو إسهالات؛ طفح؛ تعرق ليلي؛ تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو في منفج الرجلين

بلغ طبيبك عن المرض الشبيه بالإنفلونزا - سواء خلال الشهر الذي يسبق بدء العلاج بـ إمترىثير تيقع أو في أي وقت خلال فترة تناول إمترىثير تيقع.

تحذيرات وإجراءات الحذر خلال فترة تناول إمترىثير تيقع من أجل تقليل خطورة العدوى بـ HIV:

• تناول إمترىثير تيقع كل يوم من أجل تقليل الخطورة، ليس فقط عندما تعتقد بأنك معرض لخطورة العدوى بـ HIV. لا تنتهي إمترىثير تيقع إلا إذا تأكيد من أنك لست حاملاً لـ HIV.

• إنفاس جنسي آمن: بلغ الطبيب فوراً إذا كنت تشك بأنك أصبحت بالعدوى بـ HIV. من الجائز أن يجري الطبيب فحوص إضافية للتتأكد من أنك لست حاملاً لـ HIV.

• إن تناول إمترىثير تيقع لا يضمن عدم العدوى بالفيروس. لذا عليك إتخاذ الخطوات التالية:

○ إحرص على سلوك الجنسي آمن. إستعمل الكوندوم من أجل تقليل التماส مع السائل المنوي، السوائل المهبلية أو الدم.

○ لا تشارط الأدوات الشخصية التي يمكن أن تحتوي على دم أو سوائل من الجسم، مثل فرش الأسنان وشفرات الحلاقة.

○ لا تناول أو تعاود إستعمال الإبر أو أدوات الحقن أو المعدات الطبية.

○ إخضع لفحوص لتواجد أدوية أخرى تيقع في سياق هذه الفقرة.

● تحذيرات تناول إمترىثير تيقع لعلاج HIV أو لتقليل خطورة العدوى بـ HIV:

إن تناول إمترىثير تيقع مع أدوية أخرى تحتوي على شكل آلام عظمية مستمرة أو متبقية حيث تسبب الكسور أحياناً قد تظهر نتيجة تضرر خلايا أنساب الكلية (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). إحك لطبيبك إذا

قاسيت من آلام في العظام أو من كسور في العظام.

قد يؤدي تينوفوقيق ديسوبروكسىيل إلى إنخفاض في كتلة العظام.

للحظ الفقدان الأكبر للعظم في التجارب السريرية لدى المتعالجين الذين عولجوا من HIV بـ تينوفوقيقة ديسوبروكسىيل بمشاركة مثبت

پروتياز مسرع.

بشكل عام، إن تأثيرات تينوفوقيقة ديسوبروكسىيل على صحة العظام على المدى البعيد والخطورة المستقبلية لحدوث كسور لدى الكبار ليس مؤكدة.

إحك لطبيبك إذا علمت بأنك تعاني من هشاشة العظام. إن المتعالجين الذين يعانون من هشاشة العظام معرضون لخطورة أكبر لحدوث كسور.

● تحدث مع الطبيب إذا كان لديك سابقة لمرض كبد، بما في ذلك إلتهاب الكبد، قبل أن تبدأ بتناول إمترىثير تيقع. إذا كنت تعاني من التوقف عن تناول إمترىثير تيقع عن تناول HIV.

● إن تناول إمترىثير تيقع مع أدوية أخرى تيقع على ديدانوزين (أنتريلوكونين - 2 (العلاج تلوث فيروسي))، سيدوفوقيقة فيلپاتاسفير أو سوفوسبيوقيقة فيلپاتاسفير.

● مضادات الإنفلونزا اللاستيروئيدية (NSAIDs)، لتسكين آلام العظام أو العضلات).

إذا كنت تتناول دواء إضافياً مضاداً للفيروسات يسمى مثبت بـ ديدانوزين (HIV)، فمن شأن الطبيب أن يوجهك لإجراء فحوص دم و ذلك من أجل متابعة الأداء الوظيفي للكلى.

من المهم أيضاً أن تخبر الطبيب إذا كنت تناولت فيلپاتاسفير أو سوفوسبيوقيقة فيلپاتاسفير أو ديدانوزين. يدرس الطبيب بدقة فيما إذا يعالجك بمزيج من تينوفوقيقة ديسوبروكسىيل و ديدانوزين.

إحك للطبيب إذا كنت تتناول إحدى هذه الأدوية. إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، أو إذا كان من المحتمل أن تتناول أية أدوية أخرى، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

● إستعمال الدواء والطعام: إذا أمكن، يجب تناول إمترىثير تيقع مع الطعام.

● الحمل والإرضاع: إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بأنك قد تكونين حامل، أو تخططنين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

إذا تناولت إمترىثير تيقع خلال فترة الحمل، فمن الجائز أن يطلب منك الطبيب إجتناب فحوص دم متطرفة وفحوص تشخيصية أخرى لمتابعة تطور طفلك. لدى الأطفال الذين تناولت أدويتهم مثبتات نوكليوزيدية (NRTIs)، خلال فترة الحمل، فإن الفائدة من الوقاية من HIV فاقت خطورة الأعراض الجانبية.

● لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بـ إمترىثير تيقع. السبب لذلك هو أن المواد الفعالة في هذا الدواء تنتقل إلى حليب الأم.

● إذا كنت حاملاً لـ HIV فمن الموصى به ألا ترضعي لمنع إنتقال الفيروس إلى الرضيع عبر الحليب.

السيادة واستعمال الماكولات: قد يؤدي إمترىثير تيقع إلى حدوث دوار. إذا شعرت بدوار عند تناول

إمترىثير تيقع، فلا يجوز السيادة أو شرب الماء أو ماكولات خطيرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء: يحتوي إمترىثير تيقع على لكتوز.

إذا قيل لك من قبل تناول الدواء أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع طبيبك قبل تناول الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغم صوديوم في القرص ولذلك يعتبر خال من الصوديوم.

● كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

يتبَع

لتقليل خطورة العدوى بـ HIV، هي:

- الكبار: قرص واحد لليوم.
- إذا أمكن، يجب تناول إمتريفير تيغ مع الطعام.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.**
- إذا واجهت صعوبة في البلع، بالإمكان سحق القرص بواسطة طرف ملعقة صغيرة (أو تقسيم القرص لأقسام أصغر، لكن يجب الحرص على بلع كافة أقسام القرص فورا) بعد ذلك يجب خلط المسحوق بما يقارب 100 مل (نصف كأس) من الماء، عصير البرتقال أو عصير العنب ومن ثم الشرب فورا.
- دائمًا تناول الجرعة الدوائية التي أوصى بها الطبيب. بذلك تتأكد بأن الدواء الخاص بك ناجع تماما، وتقلل من خطورة تطور مقاومة للعلاج. لا تغير الجرعة الدوائية بدون تعليمات من الطبيب.
- إذا كنت معالجاً بسبب تلوث بـ HIV فإن طبيبك سيصف إمتريفير تيغ مع أدوية أخرى، مضادة للقير وسات الرجعية لتوخيهات حول

- إذا كنت بالغاً وتتناول إمتريفير تيقيع لتقليل خطورة العدوى بـ HIV، فعليك تناول إمتريفير تيقيع كل يوم، ليس فقط عندما تعتقد بأنك معرض لخطورة العدوى بـ HIV.
بخصوص أي سؤال عن منع العدوى بـ HIV أو منع عدوى أشخاص آخرين بـ HIV راجع طبيبك.
- إذا تناولت جرعة دوائية أكبر من المطلوب من إمتريفير تيقيع إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر من المطلوب من إمتريفير تيقيع، فعليك التوجه للطبيب أو لغرفة الطوارئ الأقرب وإستشرهم. أحضر عليه الدواء معك ليكون من السهل عليك وصف ما قمت بتناوله.
- إذا فوت جرعة دوائية من المهم عدم تفويت جرعة دوائية من إمتريفير تيقيع.
- إذا لاحظت ذلك خلال 12 ساعة من الموعد الذي عادة تتناول فيه إمتريفير تيقيع، فتناول القرص بأسرع ما يمكن، يُفضل مع طعام. ومن ثم تناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد الإعتيادي.
- إذا لاحظت ذلك بعد 12 ساعة أو أكثر من الموعد الذي عادة تتناول فيه إمتريفير تيقيع، فلا تتناول الجرعة الدوائية التي فوتها. إنظر وتناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد الإعتيادي، يُفضل مع طعام.
- إذا تقيأت بعد أقل من ساعة واحدة من تناول إمتريفير تيقيع، فتناول قرصا إضافيا. إذا تقيأت بعد مرور أكثر من ساعة واحدة من تناول إمتريفير تيقيع، فلا حاجة لتناول قرصا إضافيا.

- لا تتوقف عن تناول إمترىقيير تيقع لا توقف عن تناول إمترىقيير تيقع
- إذا كنت تتناول إمترىقيير تيقع لعلاج الـ HIV، فإن التوقف عن تناول الأقراص قد يضعف من نجاعة العلاج الذي أوصى به الطبيب ضد HIV.
- إذا كنت تتناول إمترىقيير تيقع لتقليل خطورة العدوى بـ HIV، فلا تتوقف عن تناول إمترىقيير تيقع أو تُنقص أي جرعة دوائية. إن التوقف عن إستعمال إمترىقيير تيقع أو تفويت جرعة دوائية، قد يزيد من خطورة العدوى بـ HIV.
- لا تتوقف عن تناول أمثل بقدر تيقع بدون استشارة الطبيب.

- إذا وجد لديك تلوث من نوع التهاب الكبد B، فمن المهم بشكل خاص عدم التوقف عن العلاج بـ إمتريفير تيقع بدون إستشارة الطبيب أولاً. من الجائز أن تحتاج بعد التوقف عن العلاج إلى إجتياز فحوص دم لعدة أشهر. لا يوصى بالتوقف عن العلاج لدى بعض المتعالجين الذين يعانون من مرض كبدي متقدم أو تليف لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم التهاب الكبد، الذي قد يشكل خطراً على حياتهم.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إمتريفير تيقع قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

أخبر الطبيب عن كل واحد من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية خطيرة محتملة: أخبر الطبيب فوراً

- حموض لبني (فانص من حمض اللبن في الدم) عبارة عن عرض جنبي نادر. مع ذلك، فهو قد يشكل خطراً على الحياة. يظهر الحموض للبني في أوقات متقاربة أكثر لدى النساء، خاصة إذا كن يعانيين من وزن زائد، ولدى الأشخاص الذين يعانون من مرض كبدى. علامات محتملة لحموض لبني:
 - تنفس عميق وسريع
 - ميل للنوم
 - غثيان، تقيؤات
 - آلام في البطن

إذا كنت تعتقد بأن لديك حموض لبني، توجه فوراً إلى الطبيب.

- أي عالمة لإلتهاب أو لتلوث. لدى بعض المتعالجين الذين يعانون من تلوث HIV (إيدز) متقدم وسابقة لتلوثات إنتهازية (تلوثات التي تظهر لدى أشخاص لديهم جهاز مناعة ضعيف)، فإن علامات وأعراض لإلتهاب ناجم عن تلوثات سابقة قد تظهر بعد فترة قصيرة من بدء العلاج المضاد لـ HIV. من المرجح أن سبب هذه الأعراض هو تحسن رد الفعل المناعي للجسم، الذي يسمح للجسم بمحاربة التلوثات التي كانت موجودة من دون أعراض واضحة.
- أمراض مناعية ذاتية، حالة يهاجم فيها جهاز المناعة أنسجة سليمة في الجسم، حيث من شأنها أن تظهر أنسفاً بعد بدء تناول أدوية العلاج.

- تلوث بـ HIV. قد تتطور أمراض مناعية ذاتية بعد أشهر عديدة من بدء العلاج. إنتبه لأي أعراض تلوث أو أعراض أخرى، مثل:
 - ضعف عضلي
 - ضعف يبدأ في راحتي اليدين وراحتي القدمين ويمتد نحو الأعلى بإتجاه جذع الجسم
 - ضربات قلب، إرتجاف أو فرط نشاط (hyperactivity) إذا كنت تلاحظ حدوث هذه الأعراض أو أية علامة لإلتهاب أو لتلوث، توجه فوراً للتلقى علاج طبي.

أعراض جانبية محتملة:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تصيب أكثر من متعالج واحد من بين 10 متعالجين):

- إسهال، غثيان، تقيؤات
- دوار، صداع
- طفح
- الشعور بضعف

من الجائز أن يلاحظ أيضاً من خلال فحوص الدم:

- إنخفاض في نسبة الفوسفور في الدم
- ارتفاع في مستوى الكرياتين كيناز

اعراض جانبية شائعة (قد تصيب حتى متعالج ١ من بين ١٠ متعالجين):

- آلام، آلام في البطن
- أرق، أحلام شاذة
- مشاكل في الهضم التي تؤدي إلى إنزعاج بعد وجبات الطعام، الشعور بنفخة، غازات في البطن
- طفح (بما في ذلك نقاط حمراء أو بقع حمراء كبيرة، تترافق أحياناً بحويصلات وإنتفاخ الجلد)، الذي قد يكون رد فعل تحسسي، حكة، تغيرات في لون الجلد بما في ذلك تشكل بقع داكنة في الجلد

- ردود فعل حساسية اخرى، مثل صفير، إسقاط او السعور بدوخة بسيطة
- من الجائز أيضاً أن يلاحظ من خلال الفحوص:
- إنخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء (إن إنخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء قد يزيد من قابلية حدوث تلوثات)
- إرتفاع نسبة الشحوم الثلاثية (الأحماض الدهنية)، الصفراء أو السكر في الدم
- مشاكل في الكبد وفي البنكرياس

أعراض جانبية غير شائعة (قد تصيب حتى متعالج واحد من بين 100 متعالج):

● ألم في البطن ناجمة عن التهاب البنكرياس

● إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة

● فقر دم (انخفاض تعداد خلايا الدم الحمراء)

● تفكك العضلات، آلام عضلية أو ضعف عضلي التي قد تظهر جراء تضرر خلايا نبيبات الكلية.

من الجائز أن يلاحظ أيضاً من خلال الفحوص:

● إنخفاض في نسب البوتاسيوم في الدم

● إرتفاع في نسب الكرياتينين في الدم

● تغيرات في البول

- أعراض جانبية نادرة (قد تصيب حتى متعالج واحد من بين 1,000 متعالج):
- حموض لبني (انظر "أعراض جانبية خطيرة محتملة")
- كبد دهني
- إصفرار الجلد أو العينين، حكة أو آلام في البطن الناجمة عن التهاب الكبد
- التهاب الكلى، كثرة التبول وعطش، قصور كلوي، تضرر خلايا نبيبات الكلية
- ليونة العظام (تترافق بآلام في العظام. تؤدي هذه الحالة أحياناً إلى

- ألم في الظهر الناجمة عن مشاكل في الكلى

تضرر خلايا نبيبات الكلية الذي قد يكون ذو علاقة بتفكك العضل،
ليونة العظام (ترافق بألم العظام، وأحياناً تؤدي هذه الحالة إلى حدوث كسور)، آلام عضلية، ضعف عضلي وتناقص في مستويات البوتاسيوم أو الفوسفور في الدم.

إذا لاحظت بأي عرض جانبي يظهر في هذه النشرة أو إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، إحك للطبيب أو للصيدلي.

إن وثيرة الأعراض الجانبية التالية غير معروفة:

- مساكل في العظام. قد ينطوي لدى بعض المتعالجين الذين يتناولون أدوية مركبة مضادة للفيروسات الرجعية، مثل إمترىثير تيقع، مرض عظمي يسمى نخر العظم (**osteonecrosis**، موت نسيج العظم نتيجة نقص في تزويد العظم بالدم). إن تناول أدوية من هذا النوع لفترة طويلة، تناول كورتيكosteroidات، شرب الكحول، جهاز مناعي ضعيف جداً وزيادة الوزن هي جزء من عوامل الخطورة العديدة لتطور هذا المرض. علامات نخر العظم تشمل:
 - تصلب المفاصل
 - آلام وأوجاع في المفاصل (خاصة في مفصل الفخذ، في الركبة وفي الكتف)

○ صعوبات في الحركة (الخط)

إذا لاحظت حدوث واحد من تلك الأعراض إحك للطبيب.

خلال فترة العلاج بأدوية لـ HIV من الجائز حدوث زيادة في الوزن وفي مستويات الشحوم والجلوكوز في الدم. يتعلق هذا الأمر جزئياً بتحسين الصحة ونمط الحياة، وفي حالة الشحوم في الدم يتعلق الأمر أحياناً بأدوية لـ HIV ذاتها. يقوم الطبيب بإجراء فحوصات من أجل كشف هذه التغيرات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاشر من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك

5) كافية تخزين الدواء؟

يُرجى مراجعة الطبيب.
التبليغ عن أعراض جانبية
بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il>

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.
- يُحفظ الدواء في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة.

- عبوة قنينة: بالإمكان إستعمال الدواء حتى 60 يوماً منذ فتح القنينة للمرة الأولى.
- إنتبه: تحتوي القنينة على ماسن للرطوبة. لا يجوز بلعه! يجب ترك ماسن الرطوبة داخل القنينة وإغلاق القنينة بإحكام بعد كل إستعمال!
- لا ترمي أي دواء إلى المجاري أو في القمامات المنزلية. يجب إستشارة الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, lactose spray dried, crospovidone, sodium stearyl fumarate, mannitol, mannitol spray dried, polyvinyl alcohol, povidone, titanium dioxide, macrogol, talc, silica colloidal hydrated, indigo carmine aluminium lake/FD&C blue, carmine.

تم إعداد هذه النشرة في حزيران 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
154-22-24150

154.32.34159
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.