

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משוקעת פי מרשם רופא בלבד

אמבריסנטן טבע 5 מ"ג
טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:
אמבריסנטן 5 מ"ג (ambrisentan 5 mg)

אמבריסנטן טבע 10 מ"ג
טבליות מצופות

כל טבליה מצופה מכילה:

אמבריסנטן 10 מ"ג (ambrisentan 10 mg)

חומרים בלתי פעילים ואולרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
פרק 6 "מידע נוסף": **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע מתייצל על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תורפה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

כרטיס מידע ביטחוני למטופלים באמבריסנטן טבע

בנוסף לעלון לצרכן, לתכשיר אמבריסנטן טבע קיים כרטיס מידע ביטחוני למטופל, בנוגע לנזק אפשרי לעובר ופגיעה אפשרית בכבד.

כרטיס זה מכיל מידע ביטחוני חשוב שעליו לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול באמבריסנטן טבע ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס המידע הביטחוני למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס והעלון לעיון נוסף במידת הצורך.

אין ליטול אמבריסנטן טבע אם הינך בהיריון מאחר השימוש בתרופה זו עלול להזיק לעובר (ראי פרק 2 סעיף "איך להשתמש בתרופה", פרק 2 סעיף 'היריון, הנקה ופוריות'). אם הינך אישה בגיל הפוריות העשויה להרות יש לבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול באמבריסנטן טבע ובאופן שגרתי, כל חודש במהלך נטילת התרופה וכן חודש לאחר סיום הטיפול. יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת היריון. הינך חייבת להשתמש באמצעי מהימן למניעת היריון במהלך השימוש באמבריסנטן טבע וכן חודש אחד נוסף לאחר סיום הטיפול (ראי פרק 2 סעיף 'היריון').

1. למה מיועדת התרופה?

אמבריסנטן טבע מכיל את החומר הפעיל אמברינטון.

הוא משמש לטיפול ביתר לחץ דם עורקי בריאה (PAH) במבוגרים. יתר לחץ דם עורקי בריאה הוא לחץ דם גבוה בכלי הדם (עורקי הריאה) המובילים דם מהלב אל הריאות. באישים עם יתר לחץ דם עורקי בריאה, עורקים אלה נששים צרים יותר, כך שהלב צריך לעבוד קשה יותר כדי להזרים דם דרכם. זה גורם לאישים להרגיש עייפות, סחרחורת וקוצר נשימה. אמבריסנטן טבע מרחיב את עורקי הריאה, ובכך מקל על הלב להזרים דם דרכם. זה מוריד את לחץ הדם ומקל על ההסמינים.

אמבריסנטן טבע יכול לשמש גם בשילוב עם טאדאלאפיל המשמש לטיפול ביתר לחץ דם עורקי בריאה.

קצובה תרפויטית

אנטגוניסט לרצפטור אדנותלין.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש **(אלרגי)** לאמבריסנטן, סויה או לכל אחד מהרכיבים האחרים של תרופה זו (מפורטים בפרק 6).
- את בהיריון**, **מתכננת להיכנס להיריון** או **עוללה להיכנס להיריון** מכיוון שאינך משתמשת באמצעי מניעה מהימן. בבקשה קראי את המידע תחת 'היריון'.
- את מגניקה**. קראי את המידע תחת 'הנקה'.
- יש לך מחלת כבד**. פנה לרופא שיחילטי האם תרופה זו מתאימה לך.
- יש לך הצטלקות של הריאות** מסיבה לא ידועה (פיברוזיס ריאתי אידיופטי).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

ספר לרופא לפני נטילת תרופה זו אם יש לך:

- בעיות כבד
 - אנמיה (מספר מופחת של תאי דם אדומים)
 - נפוחות בידים, בקרסוליים או בכפות הרגליים הנגרמת על ידי נזולים (*בצקת היקפית*)
 - מחלת ריאות שבה הורודים ברואות חסומים (*מחלה חסימתית של ריודי הריאה*).
- הרופא יחליט** האם אמבריסנטן טבע מתאים לך.

בדיקות ומעקב

אתה תזדקק לבדיקות דם סדירות

לפני שתתחיל ליטול אמבריסנטן טבע ובפרקי זמן קבועים בזמן שתיטול את התרופה הרופא יערוך בדיקות דם כדי לבדוק:

- האם יש לך אנמיה
- האם הכבד שלך מתפקד כראוי
- חשוב שתעבור בדיקות דם סדירות אלה כל עוד אתה נוטל אמבריסנטן טבע.
- סימנים לכך שיייתכן שהכבד אינו מתפקד כראוי כוללים:
 - אובדן תיאבון
 - בחילה
 - הקאה
 - חום
 - כאב בקיבה (בטן)
 - הצהבה של העור או של לובן העיניים (צהבת)
 - שנן בעור כהה
 - גרד של העור.

אם תבחין באחד מהסימנים האלה: **ספר מייד לרופא**.

ילדים ומתבגרים

אמבריסנטן טבע אינו מיועד לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים מכיוון שהבטיחות והיעילות אינן ידועות בקבוצת גיל זו.

הנגובות ותרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או הרוקח.

ייתכן שהרופא יצטרך להתאים את מנת האמבריסנטן טבע שלך אם אתה מתחיל ליטול ציקלוספורין A (תרופה שמבשמת לאחר השתלה או לטיפול בפסוריאזיס).

אם אתה נוטל ריפאפיצין (אנטיביוטיקה שמבשמת לטיפול בזיהומים חמורים), הרופא ינטר אותך כאשר אתה מתחיל ליטול אמבריסנטן טבע לראשונה.
אם אתה נוטל תרופות אחרות שמבשמות לטיפול ביתר לחץ דם עורקי בריאה (כגון אילופרוסט, אפורסטטנול, סילדנאפיל), ייתכן שהרופא יצטרך לנטר אותך.

ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל אחת מתרופות אלה.

היריון, הנקה ופוריות

הבייץ

אמבריסנטן טבע עלול לגרום נזק לעוברים כאשר ההיריון החל לפני, במהלך או מייד לאחר התרופה.

אם הינך אישה בגיל הפוריות העשויה להרות, **הרופא יבקש ממך לעשות בדיקת היריון** לפני שאת מתחילה ליטול אמבריסנטן טבע ובאופן סדיר כל חודש בזמן שאת נוטלת תרופה זו, וכן חודש לאחר סיום הטיפול. יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת היריון.

אל תיטלי אמבריסנטן טבע אם את בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון.

הינך חייבת להשתמש באמצעי מניעת היריון במהלך השימוש באמבריסנטן טבע וכן חודש אחד נוסף לאחר סיום הטיפול. הרופא או הגינקולוג ידריכו אותך לגבי אמצעים מהימנים למניעת היריון בזמן שאת נוטלת אמבריסנטן טבע.

הרופא ימליץ לך על אמצעי מניעה אחד בעל יעילות גבוהה, למשל התקן תוך רחמי או קשידת חוצצרת או שימוש בשילוב של שיטות [כגון אמצעי מניעה הורמונלי ואמצעי מניעה חוצץ (כגון דיאפרגמה, ספוגית למניעת היריון או שעל בן־הזוג שלך להשתמש אף הוא בקונדום)] או שני אמצעי מניעה חוצצים.

אם ניתוח של בן הזוג לכריתת צינור הזרע היא השיטה שנבחרה למניעת היריון, חובה להשתמש במקרה של אמצעי מניעה הורמונלי או חוצץ.

התייעצי עם הרופא בנוגע לשימושי בשתי שיטות למניעת היריון.

דוחיי לרופא באופן מיידי אם נכנסת להיריון בזמן שאת נוטלת אמבריסנטן טבע או אם את מתכננת להרות בעתיד הקרב או חושבת שיייתכן שאת בהריון.

הנקה

לא ידוע אם אמבריסנטן טבע עובר לחלב אם.

אל תניקי בזמן שאת נוטלת אמבריסנטן טבע. דברי עם הרופא על כך.

פריות

אם אתה גבר שנוטל אמבריסנטן טבע, ייתכן שתרופה זו תפחית את ספירת הזרע שלך. פנה לרופא אם יש לך שאלות או אדגות כלשהן בנוגע לכך.

נהיגה ושימוש במכוונת

אמבריסנטן טבע עלול לגרום לתופעות לוואי כגון לחץ דם נמוך. סחרחורת, עייפות (ראה פרק 4), שיכולות להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכוונת. התסמינים של מצרך גם עלולים לגרום לך להיות פחות כשיר לנהוג או להשתמש במכוונת.

אין לנהוג או להשתמש במכוונת אם אתה מרגיש לא טוב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה אמבריסנטן טבע מכיל קטזו, לציטין (סויה), ונתרן
טבליות אמבריסנטן טבע מנילות כמויות קטנות של סוכר הנפיק לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים פנה לרופא לפני נטילת אמבריסנטן טבע. טבליות אמבריסנטן טבע מכילות לציטין המופק מסויה. אם אתה אלרגי לסויה אל תשתמש בתרופה זו (ראה פרק 2 סעיף "איך להשתמש בתרופה אם").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא אם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימינון ואופן הטיפול בתכשיר.

הימינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המנה המקובלת של אמבריסנטן טבע היא טבליה אחת של 5 מ"ג, פעם ביום. הרופא עשוי

להחליט להגדיל את המנה של 10 מ"ג, פעם ביום.

אם אתה נוטל ציקלוספורין A, אין ליטול יותר מטבליה אחת של 5 מ"ג של אמבריסנטן טבע פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת

איך ליטול אמבריסנטן טבע

הדבר הטוב ביותר הוא ליטול את הטבליה באותו הזמן בכל יום.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם כוס מים.

אין לחצות, לרסק או ללעוס את הטבליה.

אתה יכול ליטול אמבריסנטן טבע עם או ללא מזון.

אם נטלת יותר אמבריסנטן טבע ממה שהיית צריך

אם נטלת יותר מדי טבליות, ייתכן שתהיה בסבירות גבוהה יותר לקבל תופעות לוואי, כגון כאב ראש, סמקה, סחרחורת, בחילה או לחץ דם נמוך שעלול לגרום לסחרחורת. **היוועץ ברופא או ברוקח** אם נטלת יותר טבליות ממה שנרשם.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול אמבריסנטן טבע

אם שכחת מנה של אמבריסנטן טבע, טול את הטבליה ברגע שאתה נזכר, וקח את המנה הבאה בזמנה.

אין ליטול שתי מנות באותו הזמן כדי לפצות על מנה שנשכחה.

אין להפסיק ליטול אמבריסנטן טבע ללא ייעוץ מהרופא. אמבריסנטן טבע הוא טיפול שנתסרך להמשיך ליטול על מנת לשלוט ביתר לחץ דם עורקי בריאה.

יש להתמיד בטיפול כפי שמומלץ על ידי הרופא.

אין להפסיק ליטול אמבריסנטן טבע אלא אם הסכמת על כך עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושי! בדיקת התוית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה הרכב משקפיים או אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, תרופה זו יכולה לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

מציבים שאתה והרופא צריכים לשים לב אליהם:

תגובות אלרגיות

זוהי תופעת לוואי שכיחה העוללה להופיע ב-**עד אחד מתוך 10 אנשים**. ייתכן שתבחין בפריחה או בגרד ובנפיחות (בדרך כלל של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון), שעלולים לגרום לקושי בנשימה או בבלעיה.

נפוחות (בצקת), במיוחד בקרסוליים ובכפות הרגליים

זוהי תופעת לוואי שכיחה מאוד העוללה להופיע **ביותר מאחד מתוך 10 אנשים**.

אי ספיקת לב

כבך שהלב אינו מזרים מספיק דם, הוא גורם לקוצר נשימה, עייפות קיצונית ונפוחות בקרסוליים וברגליים. זוהי תופעת לוואי שכיחה העוללה להופיע ב-**עד אחד מתוך 10 אנשים**.

אנמיה (מספר מופחת של תאי דם אדומים)

זוהי הפרעה בדם שעלולה לגרום לעייפות, חולשה, קוצר נשימה והרגשה כללית לא טובה. לעיתים זה דורש עירוי דם. זוהי תופעת לוואי שכיחה מאוד העוללה להופיע **ביותר מאחד מתוך 10 אנשים**.

תת לחץ דם (לחץ דם נמוך)

עלול לגרום לסחרחורת. זוהי תופעת לוואי שכיחה העוללה להופיע ב-**עד אחד מתוך 10 אנשים**. **ספר לרופא מייד** אם אתה מקבל תופעות אלה או אם הן מתרחשות בפתאומית לאחר נטילת אמבריסנטן טבע.

חשוב לעבור בדיקות דם שגרתיות כדי לבדוק אנמיה ושהכבד מתפקד כראוי. **ודא שקראת גם את המידע בפרק 2** תחת 'אתה תזדקק לבדיקות דם סדירות' ו-סימנים לכך שיייתכן שהכבד אינו מתפקד כראוי'.

תופעות לוואי אחרות

תופעות לוואי שכוחות מאוד:

- כאב ראש
- סחרחורת
- דפיקות לב (פעימות לב מהירות או לא סדירות)
- החרפה של קוצר נשימה זמן קצר לאחר שמתחילים טיפול באמבריסנטן טבע
- נדלת או אף סתום, גודש או כאב של הסינוסים
- בחילה
- שלשול
- תחושת עייפות.

בשילוב עם טאדאלאפיל (תרופה אחרת לטיפול ביתר לחץ דם עורקי בריאה)

תופעות לוואי אחרות

- כאב/י נוחות בחזה.
- תופעות לוואי שכוחות:**
- טשטוש או שניינים אחרים בראייה
- התעלפות
- תוצאות בדיקת דם לא תקינות לתפקוד כבד
- נדלת
- עצירות
- כאב בקיבה (בטן)
- כאב או אי נוחות בחזה
- הסמקה (אדמומיות של העור)
- הקאות
- קאב/י נוחות בחזה.
- תופעות לוואי שכוחות:
- טשטוש או שניינים אחרים בראייה
- התעלפות
- תוצאות בדיקת דם לא תקינות לתפקוד כבד
- נדלת
- עצירות
- כאב בקיבה (בטן)
- כאב או אי נוחות בחזה
- הסמקה (אדמומיות של העור)
- הקאות
- הרגשת חולשה
- דימום מהאף
- פריחה.

בשילוב עם טאדאלאפיל

בנוסף לרשום מעלה, חוץ מתוצאות בדיקת דם לא תקינות לתפקוד כבד:

- לצלולים באוזניים (טיניטוס) רק כאשר נוטלים את הטיפול המשולב.

תופעות לוואי שאינן שכוחות:

- פגיעה בכבד
 - דלקת של הכבד הנגרמת על ידי מערכות ההגנה של הגוף עצמו (דלקת כבד אוטואימונית).
- בשילוב עם טאדאלאפיל**

- איבוד שמיעה באופן פתאומי.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים וילדיו ולאנו תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקריאה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו דוש.

אחסון: מתחת ל- 25 מעלות צלסיוס.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose Monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E171), talc, macrogol/PEG, lecithin (soya) (E322).

כיצד ראתי התרופה ומה תוכן האריזה

אמבריסנטן טבע 5 מ"ג: טבליה מצופה מוארכת, בצבע לבן עד לבן בגוון קרם (off-white) מוטבעת עם '5' בצד אחד - '405' בצד השני.

אמבריסנטן טבע 10 מ"ג: טבליה מצופה מוארכת, בצבע לבן עד לבן בגוון קרם (off-white) מוטבעת עם '10' בצד אחד - '406' בצד השני.

התכשיר משוקק בבקבוק או באריזת בליסטר המכילים 30 טבליות מצופות.

ייתכן שלא כל סוגי האריזות משוקקים.

שם בעל הרישום וכתובתו: אביק שיווק בע"מ ת"ד 8077, נתניה.

שם היצרן וכתובתו: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 3190, פתח-תקוה.

העלון נערך באוגוסט 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אמבריסנטן טבע 5 מ"ג: A-35873-41-167

אמבריסנטן טבע 10 מ"ג: A-35879-42-167

לשם הפסטוז ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת

לכבי שני המינים.

הוצאת טבליה

טבליות אלה מגיעות באריזה מיוחדת כדי למנוע מילדים להוציא אותן.

1. הפרד טבליה אחת:
קלף בעדינות את
השכבה החיצונית.

2. קלף בעדינות את
השכבה החיצונית.

3. הוצא את הטבליה
מה"כיס".

