

مستينون أقراص ملبسة ٦٠ ملغ

مادة فعالة:

Pyridostigmine bromide 60 mg

بيريدوستيجمين بروميد ٦٠ ملغ

لقائمة المواد الغير فعالة – أنظر البند "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لك لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

لم أعد هذا الدواء؟

مستينون أعد لعلاج مرض الوهن العضلي الوبيل.

المجموعة العلاجية:

مثبطات أنزيم كولين-إستراز.

يحتوي مستينون على المادة الفعالة بيريدوستيجمين بروميد وهو مثبط لأنزيم كولين-إستراز ويمنع بذلك التفكك المتزايد لأستيل كولين، المادة التي تنتقل الموجات النابضة من العصب إلى العضلة.
المرضى الذين يعانون من مرض الوهن العضلي الوبيل يشعرون بأن العضلات ضعيفة وتتعب بسرعة. في حالات خطيرة، يصلون إلى حالة شلل العضلات.

قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة بيريدوستيجمين بروميد أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (رجاء أنظر البند "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من إنسداد ميكانيكي في الجهاز الهضمي أو في المسالك البولية.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بمستينون أعلم الطبيب إذا:

- كنت تعاني من الربو أو من مشاكل أخرى في جهاز التنفس مثل صغير في التنفس، صعوبة في التنفس، سعال مزمن
- كان لديك مؤخرًا احتشاء عضلة القلب أو إذا كنت تعاني من وتيرة قلب بطيئة أو من أي حالة طبية أخرى تتعلق بالقلب (فئة كبار السن حساسة أكثر للتغيرات في وتيرة القلب)
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض
- كنت تعاني من قرحة في المعدة
- كنت تعاني من مرض الصرع
- كنت تعاني من مرض الباركنسون
- كنت تعاني من مشاكل في الكلى
- كنت تعاني من غلبة المُنْهَم (vagotonia) – حالة يكون فيها فرط نشاط عصب المبهم، التي تُسبب إلى تباطؤ في وتيرة القلب، ضغط دم منخفض، إمساك، تعرق وتشنجات عضلية مؤلمة
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية
- اجتازت عملية جراحية لإزالة الغدة الزعترية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- ستيرويدات أو أي دواء آخر يُثبط جهاز المناعة
- أدوية مضادة للمُسْكِرِين مثل أتروبين
- أدوية التي تحتوي على ميثيل السليولوز
- مستحضرات مضادات حيوية، خاصة أمينوجليكوزيدات
- أدوية لعلاج عدم انتظام وتيرة القلب
- أدوية التي تؤثر على التوصيل العصبي

- أدوية لإرخاء العضلات أثناء عملية جراحية مثل بأكورونيوم أو فيكورونيوم. إذا كنت ستجتاز عملية جراحية، يجب إعلام الطبيب بأنك تتناول **مستينون**. كذلك، **مستينون** ممكن أن يؤدي إلى إطالة فترة تأثير أدوية أخرى المعدة لإرخاء العضلات مثل سوكساميثونيوم.

الحمل والإرضاع

يجب عليك استشارة الطبيب إذا كنت حاملاً، تظنين بأنك حامل أو تخططين أن تحملي. يجب استشارة الطبيب إذا كنت مرضعة، لأن **مستينون** ينتقل إلى حليب الأم بكميات صغيرة.

السياسة وتشغيل الماكينات

استعمال **مستينون** ممكن أن يؤدي إلى انخفاض حدة النظر وبالتالي قد يُضعف قدرتك على السياسة أو تشغيل مكنات. لا تقم بسياسة سيارة أو تشغيل مكنات إذا كنت تشعر بأن الدواء يؤثر على نظرك.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

مستينون يحتوي على سكروز (سكر القصب). إذا أخبرك الطبيب بأنك تعاني من عدم قدرة تحمل لأنواع معينة من السكريات، يجب عليك استشارة الطبيب المعالج قبل بدء العلاج ب**مستينون**. يُمنع استعمال **مستينون** للمرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية من عدم قدرة تحمل الفركتوز/ جالاكتوز، مشاكل امتصاص جلوكوز - جالاكتوز أو سكرز - إيزومالتار.

كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب، دائماً. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي في حال لم تكن متأكداً. الجرعة وطريقة العلاج سيحدد هما الطبيب، فقط.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

المستحضر غير قابل للشطر.

يجب بلع الملبس مع ماء أو مع أي مشروب غير كحولي آخر.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى مما يجب عليك أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد وقم باستشارة الطبيب.

إذا نسيت تناول أكثر من جرعة واحدة، يجب استشارة الطبيب.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

يُمنع تناول الدواء في الظلام! تحقق من المصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال **مستينون** أعراضاً جانبية لدى قسم من مستعملي الدواء. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية نسبة شيعها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد تواترها بعد):

- اضطرابات في الرؤية، إفراز متزايد للدمع، تقبض الحدقة (تضييق البؤبؤ)
- عدم انتظام وتيرة القلب، إحصار القلب، ضغط دم منخفض، حالات إغماء، بطء وتيرة القلب (bradycardia)، تسرع القلب (tachycardia)
- إفراز متزايد للبلغم، وتضييق مجاري التنفس
- غثيان، تقيؤات، إسهال، تشنجات في البطن، إفراز متزايد لللعاب
- طفح جلدي
- تعرّق متزايد
- ضعف العضلات وتشنجات، ارتجاف العضلات، تشنجات في العضلات
- إلحاح فجائي وقوي للتبول

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية"، الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة خاصة معدة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

كيف يُخزن الدواء؟

- تجنّب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمم.
- لا تنسب التقو بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة الخارجية. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر ذاته.

- احفظ بدرجة حرارة تحت الـ ٢٥°C.
- احفظ في العبوة الأصلية.
- بعد فتح العبوة لأول مرة يمكن استعمال المستحضر لمدة ٣ أشهر.
- يجب إغلاق الزجاجاة بإحكام لحمايتها من الرطوبة.

معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة Pyridostigmine bromide، يحتوي الدواء أيضًا على: Maize starch, Magnesium stearate, Pregelatinised starch, Povidone K 30, Colloidal anhydrous silica, Talc, Acacia spray-dried gum, Iron oxide red (E 172), Iron oxide yellow (E 172), Light liquid paraffin, Hard paraffin, Rice starch, Sucrose crystalline.
- كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:
أقراص مطلية بلون برتقالي – برتقالي فاتح، مستديرة، محدبة، مرزومة ب تقنية زجاجية تحتوي على ٢٠ أو ١٥٠ ملبسات.
- صاحب التسجيل وعنوانه:
ميچافارم م.ض.، ص.ب. ٥١٩، هود هشارون ٤٥١٠٥٠١.
- اسم المنتج وعنوانه:
أي سي أن بولفا، جيشوف، بولندا **لصالح** ميڊا فارما م.ض.، باد هامبورج، ألمانيا.
- تم فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في أيار ٢٠١٦.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ٢١٢٠٠ - ٨٤ - ١٣٠.
- لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.