

نشرة طبية للمستوكات بمحبوب أنظمة الصيدلة

مستحضرات 1986

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب
بروتيازين إكسبيكتورات شراب

التربيبة: كل 5 مل تحتوي على:

بروميتازين هيدروكلوريد 5 ملجم

جوافينزرين 45 ملجم

إيكوكابانا 10 ملجم

براديفيني فاينماد غير الفالة أنتر البند.

أقرأ المقدمة يهانع حتى يهانع قبل استعمال اللدواء، تحذى هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفر لديك أسطلة اضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من هنا، لا تطعمه الآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن يرضي مشاه.

يتوخج عليك مراعحة الطبيب إذا ناقشت علامات المرض (الأعراض)

أو لم تتحسن بعد أيام.

لأي غرض مخصوص هذا الدواء؟

الدواء مخصوص التخفيف المؤقت من السعال الناتج عن الزكام، الحساسية.

العصبية العلاجية: Promethazine هو مضاد الهيستامين

Guaiaphenesin Ipecacuanha و طارдан للبلغم.

قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت مريضاً أو في فترة أسبوعين قبل موعد الولادة المفتر.

إذا رجحت حساسية للملادة المفاجئة، أو أي من المركيبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء، لامات رفع الغطاف تنتهي.

أدوية مهدئنة، أدوية متمنعة مثل زويزيلام أو زوليبيدم.

أدوية مضادة الاكتئاب مثل أمينيتريپتيلين.

استعمال الدواء والطعام: يجب تتناول الدواء بعدوجة الطعام لتجنب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول: لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بالدواء.

الحمل والرضاع: قد يؤثر الكحول على طرفيه التي يعلم بها الدواء.

لا يجوز استعمال الدواء أبداً من أسبوعين قبل موعد الولادة المفتر أو إذا كنت مضطضاً.

بروتيازين يغير في حلبة الماء وقد يضره ذلك طفل.

إذا كنت حاماً أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

السيادة واستعمال الماكينات: يجب أن يستحب خاصية عدم التعرض للسمش. لذلك يجب الامتناع عن التعرض للسمش أثناء فترة استعمال الدواء.

يجب أن يكون المسؤول والأولاد قيد المتابعة الطبية لأنهم أكثر

حساسية للأراضي الجائحة.

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا:

كنت تعاني من سعال متواصل أو سعال مصووب بكثير من النعم.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- خلل في وظيفة الجهاز التنفسى (ربو، التهاب الرئتين -

- مشكلة خطيرة في القلب.

- ارتفاع الضغط داخل العينين (جلاوكوما ضيقية الزاوية).

- خلل في وظيفة الكبد.

- انسداد المعدة.

- صعوبة في التبول.

- سكري (المستحضر يحتوى على السكر).

- صرع.

- اعراض متلازمة راي Reye's Syndrome.

إذا كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، فردو الطبيب أو الصيدلي بالمعلومات.

أدوية مضادة للاكتئاب من فصيلة مثبطات المونو آمين أوكيدياز - لا يجوز استعمال بروتيازين إكسبيكتورات شراب في نفس الوقت مع دواء من فصيلة مثبطات المونو آمين أوكيدياز (MAO's) أو خالد أسبوعين بعد إنهاء الدواء به.

أدوية مثل السبيرين (الملاجء التهاب المفاصل والألم المفاصل) - بروتيازين قد يدفع الأعراض الجائحة لهذا العلاج الوالوني.

أدوية مضادة للكولين - بما في ذلك أدوية علاج متلازمة القولون الصronic، لعلاج الارتجاع أو لعلاج المثانة الصنعية، قد تزيد من احتقان ظهور نوار، جفاف في الفم ورورية متنشوة (مثل الآتروپين ومشتقات).

أدوية مهدئنة، أدوية متمنعة مثل زويزيلام أو زوليبيدم.

أدوية مضادة للاكتئاب مثل أمينيتريپتيلين.

استعمال الدواء والطعام: يجب تتناول الدواء بعدوجة الطعام لتجنب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

عذ الأولاد: عدم الهنوز، اغتمار التوانز وازلاقات، حرقات غير إرادية خاصة في البطن أو الرأس، حبلان، نوبات (تشنج)، فقدان الوعي، نumb، نوبات في الجهاز الهضمى ومشاكل في التنفس، تقيقات، جفاف، اضطرابات في الجهاز الهضمى.

عذ البالغين: على النوم، تعبان، نوبات (تشنج)، ندم، قلب قلبي غير منتظم، فقدان الوعي وصعوبات في التنفس، تقيقات، جفاف، اضطرابات في الجهاز الهضمى، مشاكل في البطن.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قاد ول بلبع الدواء خطأ، فرجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطبغ معك عرقه الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا تتناول جرعة مضانة، تناول الدواء في الوقت المطلوب، فلا تتناول الدواء.

يجب الواظبية على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ أى حدث على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يتوخج عليك مراعحة الطبيب إذا ناقشت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد أيام.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

هذا الدواء قد يستحب حساسية خاصة ضد العرض للسمش. لذلك يجب

الامتناع عن التعرض للسمش أثناء فترة استعمال الدواء.

يجب أن يكون المسؤول والأولاد قيد المتابعة الطبية لأنهم أكثر

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال بروتازين إكسبيكتورانت شراب إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلقى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعانى من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو المستشفى إذا ظهر:

- رد فعل حساسية. الأعراض قد تشمل: طفحًا جلديًا، حموضات، تقرّن الجلد، مشاكل في الابتلاع أو التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الرقبة أو اللسان.
- مشاكل في الكبد قد تؤدي إلى اصفرار العينين أو الجلد (بركان).
- ارتعاش أو تصلب العضلات.
- عدم السيطرة على عضلات الرأس أو الوجه.

• حركات شاذة للسان، تقصبات في عضلات الوجه، استدارة العينين وارتعاش.

- نبضات قلبية سريعة جداً، قوية أو غير منتظمة (خفقان).
- تعب لفترة زمنية طويلة - قد ينجم هذا الشيء عن مشاكل في الدم مثل فقر الدم.

• فرط الحرقة عند الأولاد.

كذلك يجب مراعاة الطبيب إذا تفاقمت الأعراض الجانبية المذكورة أدناه أو استمرت لأكثر من بضعة أيام:

• جفاف في الفم والحنجرة.

• رؤية مشوّشة.

• صعوبة في النبول.

• شعور بالغثيان، ميل إلى النوم، تعب، صعوبات في التوجّه/ ارتباك، كوكبليس، صداع وعدم الهدوء.

• فقدان الشهية وأضطرابات في الهضم.

• شعور بالدوران وإغماء (انخفاض ضغط الدم).

• ارتباك خصوصاً عند البالغين.

• ازدياد التحسّس عند التعرّض للشمس. إذا شعرت بهذا العرض فعليك الامتناع عن التعرّض المباشر للشمس والامتناع عن استعمال المصاصي الشمسية.

• غثيان أو تقيّؤ.

• إسهال.

• أحمرار الجلد.

• بلغم لزج أكثر من المعتاد.

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الأطفال الرضع وبذلك تفادى التسمم. لا تبnip التقوّي بدون تليميـات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) (مندون على العبوة). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- خزنـه في درجة حرارة أقلـ من 25 درجة مئوية.
- صالح لاستعمال لمدة شهرين كحد أقصـى بعد فتحـه.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Sucrose, Sorbitol Solution 70%, Liquid Glucose 80%, Citric Acid, Ethanol 96%, Ascorbic Acid, Orange oil 926., Monosodium Glutamate, Saccharin Sodium, Methyl Hydroxybenzoate, Disodium Hydrogen Phosphate, Propyl Hydroxybenzoate, Sunset yellow FCF, Purified Water

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
- بروتازين إكسبيكتورانت شراب هو سائل شفاف باللون البرتقالي. كل عبوة تحتوي على قبّنة زجاجية واحدة بحجم 125 مل.
- المنتج/صاحب الامتياز وعنوانه: لك من ط المصناعات الكيميائية مصر، شارع هكيمـا 3، كريات ملخيـ.
- هذه النشرة فحصـت وأقرـت من قبل وزارة الصحـة في تاريخ: كانون الأول 2015.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 23206-30-117

من أجل التيسـير ولـتسهيل القراءـة، تـمت صياغـة هـذه النـشرـة بصيـغـة المـذـكرـ. عـلى الرـغـمـ من ذـلـكـ، فـإنـ الدـوـاءـ مـخـصـصـ لـكـلاـ جـنـسـينـ.