פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
לשימוש וטרינרי בלבד
ע"פ מרשם רופא וטרינרי

1. *שם התרופה וחוזקה*

פרגניקול 600 IU וטרינרי **PREGNECOL 600 I.U. VETERINARY**
כל בקבוקון של 10מ"ל מכיל Pregnant Mare Serum Gonadotrophin 600IU

פרגניקול 6,000 IU וטרינרי **PREGNECOL 6,000 I.U. VETERINARY**
כל בקבוקון של 10מ"ל מכיל Pregnant Mare Serum Gonadotrophin 6,000IU

פרגניקול 20,000 IU וטרינרי **PREGNECOL 20,000 I.U. VETERINARY**
כל בקבוקון של 10מ"ל מכיל Pregnant Mare Serum Gonadotrophin 20,000IU

לרשימה מלאה של מרכיבים בלתי פעילים נא עיין בסעיף 8.

2. *תיאור התרופה:* פרגניקול הינו אבקה מיובשת בהקפאה המופקת מפלסמה של סוסות הרות. חוזק המרכיב הפעיל (ביחב"ל) נקבע ע"י בדיקת משקל השחלות של עכברים או חולדות לפי סטנדרט בינלאומי לגונדוטרופין.

3. *התוויה:* פרגניקול עוזר בהגברת הפוריות בבעלי חיים. התרופה מעודדת ייחום בחיות לא מיוחמות. שעור הביוץ עולה עם עלייה במינון התרופה ובמנות גבוהות יותר של פרגניקול נגרם ביוץ יתר (superovulation).

4. *צורת מתן:* בזריקה תוך שרירית (I.M.) או תת עורית (S.C.). בחיות המיועדות למאכל או להנבת חלב המתן מוגבל למתן בחצי הפנימי של הצוואר.

5. *אזהרות:* במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובה אנפילקטית לאחר הזרקה.במרבית המקרים בעלי החיים מתאוששים ללא טיפול, אפשר לטפל בבעלי החיים באמצעות אדרנלין בזריקה תוך שרירית או תוך ורידית.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור :
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

6. *מינונים והוראות שימוש לפי התוויה לבעלי חיים:* חוסר ביוץ (anoestrus) נגרם לעתים קרובות בשל תחזוקה לקויה של בעלי חיים (תזונה ומגורים), ולכן אופטימיזציה של תנאים אלה הכרחית להצלחת הטיפול.

בעלי חיים	התוויות	מינון
כבשים ועזים	ייחום, התחלת ביוץ והגברת שעור הביוץ	500-1000 יחב"ל של פרגניקול מיד לאחר הפסקת מתן פרוגסטרון.
בקר	ייחום	1000-2500 יחב"ל של פרגניקול.
כלבות	ייחום	100-500 יחב"ל של פרגניקול לק"ג משקל גוף במרווחים של 7 ימים עד לביוץ. מתן I.V. 500-1000 יחב"ל של Human chorionic gonadotropin (HCG) ביום הרביעי לביוץ. לחלופין, מתן יום יומי של 20 יחב"ל של פרגניקול לק"ג משקל גוף במשך 10 ימים והזרקת 500-1000 יחב"ל של Human chorionic gonadotropin (HCG) ביום העשירי.
חזירות	ייחום	500-1000 יחב"ל של פרגניקול.

7. *הוראות הכנה:* יש להשתמש מיד לאחר הכנת התרופה.

8. *מרכיבים בלתי פעילים:* Lactose, Mannitol.

9. *תנאי אחסון:* יש לאחסן בטמפרטורה 2-8°C (מקרר).אין להקפיא. יש להגן מפני אור.יש להשתמש מיד לאחר השחזור.יש לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים.

10. *אריזת התרופה:* התרופה משווקת כאבקה לשחזור והזרקה מידית באריזות של 1ו-10 בקבוקוני זכוכית type I של 10מ"ל.
לא כל גדלי האריזה משווקים.

11. *יצרן:* Vetoquinol Australia Pty Ltd, 46 Seaton Street, Armidale, NSW, 2350, Australia.

12. *בעל הרישום:* קומקס בע"מ, דרך שכם 1, ת"ד 19943, ירושלים.

13. *מספרי רישום:*

פרגניקול 600 IU וטרינרי	080-70-91843-00	PREGNECOL 600 I.U. VETERINARY
פרגניקול 6,000 IU וטרינרי	080-72-91845-00	PREGNECOL 6,000 I.U. VETERINARY
פרגניקול 20,000 IU וטרינרי	080-73-91846-00	PREGNECOL 20,000 I.U. VETERINARY

ר חייב מרשם רופא
ملزم بوصفة طبيب
P PRESCRIPTION ONLY MEDICINE
ס-S