

Препарат отпускается без рецепта врача

## **АГИСТЕН АЛОЭВЕРА КРЕМ**

### **Клотримазол (Clotrimazole) 1%**

Вспомогательные и аллергенные ингредиенты препарата - см. в разделе 6.

**Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата.** Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Правильно применяйте препарат.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если симптомы заболевания усиливаются или не улучшаются через 4 недели.

### **1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?**

Для лечения инфекционных поражений кожи, вызванных дерматофитами или штаммами Кандида (*Candida*).

Агистен Алоэвера Крем предназначен для лечения грибковых поражений кожи и раздражений кожи в паховой области. Препарат лечит широкий спектр грибковых штаммов, которые могут поражать различные участки организма: стопы и пальцы ног, подмышечную впадину, паховую область, кожные складки и другие участки кожи.

**Фармакологическая группа:** Противогрибковое средство из группы имидазолов.

### **2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

#### **☒ Не применяйте препарат:**

- Если у Вас или у Вашего ребенка повышенная чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту, к цетостеариловому спирту или к одному из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.
- Для лечения инфекции кожи головы или ногтей.

### **Особые предупреждения, касающиеся применения данного препарата**

Как и другие кремы, Агистен Алоэвера Крем может снизить эффективность контрацептивных средств, изготовленных из резины, таких, как презерватив или диафрагма. Поэтому если препарат предназначен для применения в области гениталий, используйте альтернативные средства контрацепции в течение хотя бы пяти дней после применения данного препарата.

Не применяйте данный препарат часто или продолжительный период времени без консультации врача.

Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. В случае контакта с глазами или ртом тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.

### **☒ До начала лечения препаратом Агистен Алоэвера Крем сообщите врачу, если:**

- Вы не уверены, что Вы (или Ваш младенец, в случае пеленочной сыпи) страдаете грибковой инфекцией.
- У пациента повышенная чувствительность к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам.

### **☒ Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.**

### **☒ Беременность и кормление грудью**

Если Вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или медицинским персоналом перед применением препарата.

В случае, если Вы уже сообщили врачу/медицинскому персоналу, тщательно следуйте их инструкциям.

### **☒ Важная информация о некоторых ингредиентах препарата**

Агистен Алоэвера Крем содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местное раздражение кожи (например: сыпь, зуд или покраснение).

### **3. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ?**

Уточните у врача или фармацевта, если Вы в чём-либо не уверены.

Если препарат был выписан для Вас врачом, следуйте его указаниям.

Если Вы приобрели препарат без рецепта, тщательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Принятая дозировка обычно: лечение два раза в день (утром и вечером) пораженного участка.

Способ применения:

Нанесите крем на чистую и сухую кожу и вотрите его в кожу легкими массажными движениями.

Обычно бывает достаточно небольшого количества крема длиной в полсантиметра для покрытия участка величиной с ладонь.

Продолжительность лечения зависит от типа инфекции. В целом, средняя продолжительность лечения различных грибковых инфекций кожи составляет 2-3 недели, но возможно, что для лечения потребуются 4 недели.

Во избежание рецидива грибковой инфекции (особенно ног) продолжите лечение еще примерно две недели после исчезновения всех признаков заболевания.

Симптомы кожной инфекции, такие, как зуд или болезненность, должны улучшиться через несколько дней лечения. В то же время такие признаки, как покраснение и шелушение кожи могут исчезнуть через более продолжительное время. Если симптомы продолжаются, посоветуйтесь с врачом.

### **Не превышайте рекомендуемую дозу.**

### **Только для наружного применения.**

### **Не вводите препарат в рот и не глотайте его.**

Не закрывайте обрабатываемый участок бинтом и/или пластырем, если только нет точного указания врача.

Если по ошибке кто-либо проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

**Если Вы забыли применить препарат** в положенное время, примените его как можно скорее и продолжите лечение, как обычно.

### **Как способствовать успешному лечению?**

- Несмотря на то, что пораженный участок чешется, старайтесь избегать расчесывания. Расчесывание нанесет вред поверхности кожи и таким образом приведет к еще большему распространению инфекции.
- Содержите пораженный участок в чистоте.
- Влажность способствует размножению грибов, поэтому необходимо содержать пораженный участок сухим, но избегайте излишнего натирания.
- Мойте пораженный участок и высушивайте его перед каждым нанесением препарата. В промежутках между процедурами можно пользоваться тальковой пудрой или противогрибковой пудрой для подсушивания. Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом для получения рекомендации определенного средства.
- Всегда мойте руки после обработки инфицированного участка, во избежание распространения инфекции.
- Не используйте общие с другими людьми полотенца, коврик в ванной и тому подобное, чтобы не инфицировать их.
- При лечении ног - важно их тщательно мыть и насухо вытирать, в особенности, участки между пальцами. Желательно пользоваться носками из хлопка. Избегайте носков из шерсти или синтетических материалов. Желательно менять носки несколько раз в день (в зависимости от интенсивности потоотделения). Тщательно стирайте носки, нейлоновые носки и колготки в горячей воде, чтобы удалить всю отшелушившуюся кожу или споры грибов. По возможности меняйте Вашу обувь ежедневно. В подходящие сезоны рекомендуется носить сандалии без носков.

Не принимайте препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу каждый раз перед применением препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### **4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

Как и при лечении любым другим лекарством, применение Агистен Алоэвера Крема может вызывать побочные явления у части пациентов.

Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Как и любое другое лекарство, препарат может вызывать аллергию у некоторых людей. Если у Вас или у Вашего ребенка есть аллергия, реакция появится сразу же после начала лечения. Если у Вас или у Вашего ребенка возникнет аллергическая реакция, прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Признаки аллергической реакции могут включать:

сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, лица, горла или языка, слабость, тошноту, головокружение или обморок.

Кроме того, прекратите лечение и обратитесь к врачу, если после применения препарата возникают:

раздражение или повышенная чувствительность, зуд, волдыри, жжение, дискомфорт, припухлость, покраснение, шелушение кожи.

В дополнение, могут возникнуть симптомы ощущения жара и покалывания на обрабатываемом участке. Обычно эти явления проходят в течение короткого времени, после адаптации к препарату.

Если у Вас или у Вашего ребенка возникает одно из вышеперечисленных побочных явлений, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

### **Отчет о побочных явлениях:**

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или зайдя по ссылке:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

Кроме того, Вы можете сообщить в компанию Перриго по следующему адресу:

[www.perrigo-pharma.co.il](http://www.perrigo-pharma.co.il)

### **5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?**

- Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Храните в прохладном месте, при температуре ниже 25°C.
- После первого открывания можно пользоваться в течение 6 месяцев.

### **6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

• В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl esters wax, sorbitan monostearate, polysorbate 60, benzyl alcohol, aloe vera powder decolorized, purified water.

• Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:

Алюминиевый тюбик, содержит 20 граммов крема белого цвета.

• Производитель и владелец лицензии: Перриго Израиль Фармацевтика Лтд., п/я 16, Иерусхам.

• Данная инструкция проверена и утверждена Министерством Здравоохранения в Мае 2015 года.

• Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 4317.22461