

עלון לצרכן לפי תקנות הרופאים (נתשרים)

התשרי 1986

התרופה השוקת על פי מרשם רופא בלבד

דפלטס 200 מ"ג טבליות בצפיפ אמינו
טבליות בצפיפ אנטיר, כל טבליה מכילה:

סודיום ואלפראסט 200 מ"ג

חומרם בלתי פעילים ואלרגיים בתרופה - ראה טעף 6.

אזהרה
לידיים אלתמות שוטלו ואלפראסט במהלך ההריון נמצאים לידיים מוגבר הפרפרות התפתחותית קשות (כ-30% עד 40% מהמקרים) ולגמית מולדים (בערך 11% מהמקרים).

אם אינה אישה בהריון או אם הנר בהריון, הרופא ירשם לך ואלפראסט רק אם טיפולים אחרים אינם מאמינים על גישם בניג הפוריות והשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול בתרופה זו. אין להפסיק את השימוש בתרופה ללא היועצת מוקדמת ברופא המטפל. במידה ולפרט השימוש באמצעי מניעה, נכנסת להריון לא מתוכנן, לפרט באופן מיידי לרופא המטפל על מנת לדון באפשרויות לטיפול חלופי במידת האפשר.

בנוסף לעלון, התרופה דפלטס קיים כרטיס מידע בטיחות
ממלפולי, כרטיס מידע בטיחותי והבטיחותי במהלך טיפול בטיחותי חשוב, שעליך לרדת, לפני הבחלת הטיפול
ובמהלך הטיפול בדפלטס.
יש לעיין בחלקים המידע הבטיחותי המסופק ועליון לצרכן סטרום הטיפול בתרופה. יש לשמור את כרטיס המידע הבטיחותי למעשה לעיון קופא במידת הצורך.

קצב בעיית אל העלון עד סופו ברטר שתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע המציע על התרופה. אם יש לך שאלות

נספות, פנה אל הרופא או אל הרוקה.

תרופה זו נרשמה עבורך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אילו אם נראה להם כי מחלתם דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים שמשקלם נמוך מ-17 ק"ג.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה נועדה לפרוסים, ניתנת לטיפול בסוגים מסוימים של

צמחור הפרטיטי: (אפילפסיה).

גנדי פרנסים: החומר הפועל שייך לקבוצת החומרים

2. למה ישמוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה טעף 6 - מידע נוסף).
- הנך רגיש לתרופה אחרת מסופדיום ואלפראסט (דיאלפראט, פרומיד).
- הנך סובל ממחלת לב (כגון דלקת כבד חמורה או כריתית, או אתר סובל מפרופריה לבדית).
- הנך או מישהו ממשפחתך סבל או סובל ממחלת כבד חמורה, במיוחד אצל נרמזה ע"י שימוש בתרופת. הנך נוסל מאלוקולין.
- הנך סובל מרופה סטי John's סט (טיפול בדראון).
- הנך סובל מהפרעות שיתונודריאלית, כתוצאה ממוטציה בגן POLG, למשל מחסנתום הטיילנורר Alpers; ובידיים ומחלת לגלי שניתים שלבגהם יש חשד להפרעת הלחיות המטבולית (genetic meabolic degenerative disease).
- הנך סובל מהפרעות מוטטיות בגן POLG, למשל מחסנתום הלחיות למוטציה שבת (ארואה).

התרופה זו עלולה לגרום להפרעה בספיריט דם ולידומים,

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין לתת את התרופה לילדים, נערות, גישם בגיל הפוריות ונשים בהריון, אלא אם טיפולים חלופיים נמצאו בלתי מאמינים.
- גישם בגיל הפוריות המטופלות בתרופה צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעילים, במקרה הרשעה שנטולת את האמצעי מוכנתת ביוזם, שלא להישע ברופא המטפל לגבי אפשרות לעבור לטיפול חלופי.**

תרופה זו עלולה לגרום להפרעה בספיריט דם ולידומים, ובמקרים נדירים מאוד, לגרום למחלות כבד (דלקת כבד) או בלבבל (ליקנת בלבבל), שעלולות להיות מולדות ולסכן חיים.

הרופא שלך יפנה אותך לביצוע בדיקות דם להערכת תקודי כבד, בייוחד ב-6 חודשים ראשונים של הטיפול.
עליך להיוועץ ברופא מיד אם הפועה התופעות הבאות: עייפות חתאומית, חוסר תיאון, חשישות, נגמנם, נפיחות ברגליים, צהובות, בחילות, כאב בטן, צהבת (גישים צהובות הקאות חוזרות, בחילות, כאב בטן, צהבת (גישים צהובות או על צהוב).

חזרה של התקפים אפילפטיים, למרות שהנך נטול את התרופה. וכו'.

לפני הטיפול בדפלטס, ספר לרופאך אם:

- הנך סובל מליקוי בתפקוד הכבד.
- הנך סובל מליקוי במערכת הדם
- הנך סובל ממחלת כליות (לא ספיקת כליות)
- הנך סובל מצמבת אדמתית(SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS).
- הנך סובל מהפרעה מטבולית, ביחוד הפרעה תורשתית הקשורה לחוסר ברגאמינים כמו Urea cycle disorder ששלולה לגרום לעליית רמות האמוניה בדם.
- יש במשפחה שלך היסטוריה של אפילפסיה, פגיעה התפתחותית, בעיות נירולוגיות, מיגרנות קשות.
- הנך סובל מחסר באנדזם carnitine
- הנך סובל מ-CPT II type II

קיים סוג מוגבר לפריוס שריר כשטוטים דפלטס

נירולוגיה או מטבולית או צרות תחושת של אפילפסיה.

לפני ביצוע ניתוח סוגג לטיפול חלופי או טיפול דחוק (אחר) כי דלוח רופא שהנך נטל דפלטס.

יש להיוועץ ברופא באופן מיידי אם יש עלייה בחימום הפרוסים, או אלה חווה סוג שונה של פרנסים.

תרופה זו עלולה לגרום לעלייה במשקל. היוועץ ברופא שלך לגבי שיטות שגירה על משקל קוף.

תרופה זו נרשמה עבורך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אילו אם נראה להם כי מחלתם דומה. תרופה זו אינה מיועדת לילדים שמשקלם נמוך מ-17 ק"ג.

יש להיוועץ ברופא באופן מיידי אם יש עלייה בחימום הפרוסים, או אלה חווה סוג שונה של פרנסים.

תרופה זו עלולה לגרום לעלייה במשקל. היוועץ ברופא שלך לגבי שיטות שגירה על משקל קוף.

תרופה זו נרשמה עבורך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אילו אם נראה להם כי מחלתם דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים שמשקלם נמוך מ-17 ק"ג.

יש להיוועץ ברופא באופן מיידי אם יש עלייה בחימום הפרוסים, או אלה חווה סוג שונה של פרנסים.

הרופא יפנה אותך לפני תחילת הטיפול וגם במהלכו לביצוע בדיקות דם שכללו ספיריט דם ובדיקת תקודי קרישה.

נגמנה אלרגית חריפה הכוללת תסמינים כגון חום, הגדלת בלוטות לימפה ומעורבות של מערכת גוף נוספות, עם או בלי פריחה עורית (מכונה DRESS).

אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ונטופי הזונה, ספר על כך לרופא או לרוקה.

אין ליטול דפלטס, אלא מנטל את התרופות הבאות:

• מפולוקויין - תרופה לטיפול במרידה.

• St John's wort - צמח מרפא לטיפול בדיאון.

עליך לדעת כי התרופא שלך לא אתה נטל למורטיג'יל (תרופה נספסת לטיפול באטיבלפסיה) או תרופות מקבוצת הפנגנים (קבוצה של אנטיביוטיקות לטיפול בדיהומים היידקיים, כגון מרופנס, אימיפנס, פינפנס).

בייחוד בילדים מתחת לגיל 3, יש להימנע משימוש בתרופות המכילות אספירין במשך הטיפול בתרופה.

יש לידע את הרופא או הרוקה אם אתה לוקה את התרופות הבאות:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית.

תרופות להרגעה ולשינה כמו בנדוזיאפזיס.

תרופות לטיפול בפרקיוזן.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופא יפנה אותך לפני תחילת הטיפול וגם במהלכו לביצוע בדיקות דם שכללו ספיריט דם ובדיקת תקודי קרישה.

נגמנה אלרגית חריפה הכוללת תסמינים כגון חום, הגדלת בלוטות לימפה ומעורבות של מערכת גוף נוספות, עם או בלי פריחה עורית (מכונה DRESS).

אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ונטופי הזונה, ספר על כך לרופא או לרוקה.

אין ליטול דפלטס, אלא מנטל את התרופות הבאות:

• מפולוקויין - תרופה לטיפול במרידה.

• St John's wort - צמח מרפא לטיפול בדיאון.

עליך לדעת כי התרופא שלך לא אתה נטל למורטיג'יל (תרופה נספסת לטיפול באטיבלפסיה) או תרופות מקבוצת הפנגנים (קבוצה של אנטיביוטיקות לטיפול בדיהומים היידקיים, כגון מרופנס, אימיפנס, פינפנס).

בייחוד בילדים מתחת לגיל 3, יש להימנע משימוש בתרופות המכילות אספירין במשך הטיפול בתרופה.

יש לידע את הרופא או הרוקה אם אתה לוקה את התרופות הבאות:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית.

תרופות להרגעה ולשינה כמו בנדוזיאפזיס.

תרופות לטיפול בפרקיוזן.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פנוברביטל, פניטואין, סופספניטואין, קרמפמיץ פרימידיון, פלבמטא, סופרינט,

רופינמיד.

אנטיביוטיקות כגון: אדטראנום, רפאמיפיץ, איריתרומיציץ.

נגדי קרישה תלוי יטימין כגון וורפריץ.

תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

מונטאמיאוקסיד.

תרופות נגד שיעול והצטננות.

נקודות חשובות:

• היוועץ ברופא מיד אם את בהריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון.

• אם תפסיקי את נטילת הוואלפראט עד שהרופא יורה לך לנשות זאת.

וודאי שרקאת והבנת את המידע למטופלת שניתן לך ע"י הרופא. במידה יש לך שאלות היוועץ ברופא או ברוקה.

הקהה
אם אתה לוקה בטיפול ברופא, אלא אם כן הומלץ לטפול ע"י הרופא. יש להיוועץ ברופא או ברוקה לפני תחילת טיפול כבד בלרופא.

נהיה ישימוש בממונות
שימוש בתרופה זו עלול לפגוע בערנות בייחוד אם היא נלקחת שגלובע עם תרופות אחרות כגן אפילפסיה או תרופות הגורמות לנימונות.

אם אתה חווה תופעה זו או במידה והאפילפסיה שלך עדיין לא נשלטה ואתה ממשיך לטפול במפרוסים, אין להגוע או להשתמש בממונות מסוכנות.

באשר לילדים יש להזהרים מרכיבה על אונינים או מרכיבת הכביש ונדומה.

מידע חשוב על חלק מהתרופות שאתה לוקה:

• תרופות נגד דיאון כגון אימיראמיץ, טעכבי

3. כיצד לשתמש בתרופה?

המשך טיפול בואלפראט נשכאת לא מתכנתת הריון וזוהי כי את משתמשת באמצעי מניעה יעילים במהלך כל תקופת הטיפול בתרופה.

אמצעי מניעה יעילים.

היוועץ ברופא אם את בהריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון.

המשך טיפול בואלפראט נשכאת לא מתכנתת הריון

וודאי כי את משתמשת באמצעי מניעה יעילים במהלך כל תקופת הטיפול בתרופה.

אמצעי מניעה יעילים.

היוועץ ברופא אם את בהריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון.

במידה אתה לוקה בטיפול ברופא, אלא אם כן הומלץ לטפול ע"י הרופא.

התרופה טרום ההייעצות עם הרופא המטפל

יש להיוועץ ברופא המטפל טרום הניסה להריון במידת האפשר, על מנת להקטין את הסיכון לתינוקך. הרופא שלך עשוי להחליט להקטין את המינון של ואלפראט או להעביר לטיפול אחרט לפני שאת מסגה להרות.

אם נכנסת להריון, עליך להיות בדיקות רפואי צמוד גם של מצבך הרפואי וגם על מנת לבקור את התפתחות העובר. היוועץ ברופא שלך בנוגע לנטילת חומצה פולית, שכאת מנסה להיכנס להריון. נטילת חומצה פולית לפני ריון יכולה ליטול את הסיכון לפגמים במערכת עמוד השדרה והפולית בשלב מוקדם, אשר קיים כבד הריונות. מניעת פגמים מולדים בתרופה זו חומצת פולית אצל הנטולות ואלפראט לא הוכחה על הים.

נקודות חשובות:

• עם תפסיקי להשתמש באמצעי מניעה לפני שאת מתייצבת עם הרופא, מסכמת אתו די תוכיכת הסיכון לטיפול שנתאפשר לשלוט על האפילפסיה ולהקטין את הסיכון לעובר.

• היוועץ ברופא אם את בהריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון.

לריון לא מתוכנן בזמן הטיפול בואלפראט

יש להשתמש בואלפראט ברחם נמצאים בטלוריט גבוה למינים מולדים קשים ולהפרעות התפתחותיות. אין לנטול תרופה אחרת ואת חושבת שאת עשויה להיות בהריון, פני רופא מדי.

היוועץ ברופא שלך בנוגע לנטילת חומצה פולית, שכאת מנסה להיכנס להריון. נטילת חומצה פולית לפני ריון יכולה להקטין את הסיכון לפגמים במערכת עמוד השדרה והפולית בשלב מוקדם, אשר קיים כבד הריונות. מניעת פגמים מולדים בתרופה זו חומצת פולית אצל הנטולות ואלפראט לא הוכחה על הים.

קיימים נתונים מסוימים המראים שלידים שנחשפו לואלפראט ברחם נוטים יותר לפגום תסמינים של הפרעות קשב וריכוז (ADHD).

טרם תתפסיקי את התרופה, יסביר לך הרופא את הסיכונים האפשריים לתינוקך במקרה של חשיפה לואלפראט במהלך ההריון. במידה ותחליטי בהמשך כי ברצונך להיכנס לריון, אין להפסיק ליטול את התרופה, טרם תיעוצות עם הרופא המטפל ובחינת אפשרות להחליפת הטיפול במידת האפשר.

היוועץ ברופא שלך לגבי נטילת חומצה פולית בזמן שאת מנסה להיכנס להריון. נטילת חומצה פולית לפני ריון יכולה להקטין את הסיכון לפגמים במערכת עמוד השדרה והפולית בשלב מוקדם, אשר קיים כבד הריונות. מניעת פגמים מולדים העלולים להיווצר כתוצאה מנטילת ואלפראט בעזרת חומצה פולית לא הוכחה.

אם זו פעם ראשונה שרשמו לך ואלפראט, הרופא יסביר לך את הסיכונים האפשריים לתינוקך במקרה של חשיפה לואלפראט במהלך ההריון.

במידה אתה לוקה בטיפול ברופא, אלא אם כן הומלץ לטפול ע"י הרופא. יש להיוועץ ברופא או ברוקה לפני תחילת טיפול כבד בלרופא.

הנהגות מוצרה - במיוחד אם תרופה זו נלקחת בשילוב עם פנוברביטל או אם מינון תרופה זו העולה באופן פתאומי.

הפועה פונסטוגנית של חבורת ה דימומים, בעיות בקרישת הדם.

הנהגות מוצרה - במיוחד אם תרופה זו נלקחת בשילוב עם פנוברביטל או אם מינון תרופה זו העולה באופן פתאומי.

הפועה פונסטוגנית של חבורת ה דימומים, בעיות בקרישת הדם.

