

نشرة للمستهلك وفقاً لأنظمة الصيدالة (مستحضرات) لعام 1986
يتم تسويق الدواء بوصفة طبيب فقط

كوسويت قطرات عيون

يحتوي كل مل على:

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Dorzolamide (as hydrochloride) | 20 mg/mL | 20 ملغ/مل | دورزولاميد (كهيدروكلوريد) |
| Timolol (as maleate) | 5 mg/mL | 5 ملغ/مل | تيمولول (كماليات) |

للاطلاع على قائمة المواد غير الفعالة انظر البند 6.1 "محتويات كوسويت". وانظر أيضاً البند 2.6، "معلومات هامة عن بعض مكونات كوسويت".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل تناول الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن كوسويت. وإذا كانت لديك أسئلة إضافية، فاطرحها على الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- سُجّل هذا الدواء لعلاجك. لا تعطه للآخرين لأنه قد يضرهم حتى إن بدا لك أن حالتهم الطبية متشابهة مع حالتك.
- هذا الدواء غير معد للاستعمال عند الأولاد والأطفال الرضع.

1. لأي غرض تم إعداد كوسويت؟

يُستعمل كوسويت للتقليل من الضغط العالي داخل العين وعلاج الماء الأزرق (الجلوكوما).

المجموعة العلاجية: يحتوي كوسويت على مكونين فعالين:

دورزولاميد، الذي ينتمي إلى مجموعة الأدوية المسماة "مثبطات إنزيم أنهيدراز الكربونيك".
تيمولول، الذي ينتمي لمجموعة الأدوية المسماة "حاصرات بيتا".
يقلل هذان الدواءان من الضغط داخل العين بطرق مختلفة.

2. قبل استعمال كوسويت

2.1 يُمنع استعمال كوسويت إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لدورزولاميد هيدروكلوريد أو تيمولول مليات أو لأي من المكونات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (للاطلاع على قائمة المواد غير الفعالة، انظر البند 6.1).
- كنت تعاني أو عانيت سابقاً من مشاكل في التنفس، مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن الانسدادي الحاد (مرض رئوي حاد قد يسبب الأزيز أو الصعوبة في التنفس و/أو السعال المتواصل).
- كان لديك نبض بطيء أو قصور قلبي أو اضطرابات في النظم القلبي (نبض غير منتظم).
- كان لديك مرض كلوي حاد أو مشاكل في الكليتين أو تاريخ طبي يشمل تشكل الحصى في الكليتين.
- كانت لديك حموضة مفرطة في الدم نتيجة لارتفاع نسبة الكلوريد في الدم (حماض يسببه فرط كلوريد الدم).

وإن لم تكن متأكدًا من الحاجة إلى استعمال هذا الدواء فتوجه إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

2.2 تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال كوسويت

- قبل العلاج بواسطة كوسويت، أخبر طبيبك بجميع المشاكل الطبية أو المشاكل في العينين التي تعاني منها حالياً أو التي عانيت منها سابقاً:
- مرض قلبي تاجي (قد تشمل الأعراض الألم أو الضغط في الصدر أو ضيق التنفس أو الاختناق)، القصور القلبي وانخفاض ضغط الدم.
 - خلل في وظيفة الجهاز التنفسي مثل المرض الرئوي الانسدادي المزمن الطفيف إلى المتوسط.
 - مرض تباطؤ تدفق الدم (مثل مرض رينو أو متلازمة رينو).
 - السكري لأن تيمولول قد يحجب علامات وأعراض انخفاض مستوى السكر في الدم.
 - فرط نشاط الغدة الدرقية لأن تيمولول قد يحجب العلامات والأعراض الناتجة من هذه الحالة.
 - يجب استشارة الطبيب إن كنت تعاني أو قد عانيت سابقاً من أي مشكلة في وظيفة الكبد.

أخبر الطبيب باستعمالك لـ **كوسويت** قبل خضوعك لعملية جراحية لأن تيمولول قد يغير تأثير أدوية معينة تُستعمل خلال التخدير. وعلاوة على ذلك، أخبر طبيبك بأي حساسية أو ردود فعل تحسسية، بما فيها الشرى وانتفاخ الوجه أو الشفتين أو اللسان و/أو الحلق، من شأنها أن تسبب صعوبة في التنفس أو البلع.

أخبر طبيبك إن عانيت من الضعف العضلي أو إن شُخص لديك مرض الوهن العضلي الوبيل، الذي تشمل أعراضه الضعف العضلي الشديد.

إن تطور لديك تهيج ما في العين أو مشاكل جديدة في العينين، مثل احمرار العين أو انتفاخ الجفنين، فتوجه إلى طبيبك في الحال.

إن كنت تشتهه بأن **كوسويت** يسبب لك رد فعل تحسسيًا أو حساسية مفرطة (ومثالًا على ذلك الطفح الجلدي أو رد الفعل الجلدي الحاد أو احمرار العين المثير للحكة)، فتوقف عن استعمال هذا الدواء وتوجه إلى طبيبك في الحال.

أخبر طبيبك إن تطور لديك تلوث في العين أو أصبت في العين، أو حُدد لك موعد للخضوع لعملية جراحية في العين، أو إذا تطور لديك رد فعل ذو أعراض جديدة أو إن تفاقمت الأعراض القائمة.

عند تقطير **كوسويت** داخل العين يمكنه أن يؤثر على الجسم بكامله.

إن كنت ترتدي العدسات اللاصقة اللينة فيتوجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء (انظر أيضًا البند 2.6 "معلومات هامة عن بعض مكونات **كوسويت**"). يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل استعمال **كوسويت**. ويمكن ارتداء العدسات مرة ثانية بعد 15 دقيقة من استعمال قطرات العين.

2.3 تناول أدوية أخرى

إن كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المتوفرة بدون وصفة طبيب والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك.

قد يؤثر **كوسويت** أو قد يتأثر من أدوية أخرى تستعملها، بما فيها أنواع أخرى من قطرات العيون المعدة لعلاج الماء الأزرق. أخبر طبيبك إن كنت تستعمل أو تخطط لاستعمال الأدوية لتخفيض ضغط الدم أو الأدوية لعلاج القلب أو الأدوية لعلاج السكري. أخبر طبيبك أو الصيدلي إن كنت تستعمل أو قد استعملت مؤخرًا أو قد تستعمل أي أدوية أخرى. هذا الأمر مهم على وجه التحديد إن كنت:

- تستعمل دواءً لتخفيض ضغط الدم أو لعلاج مرض قلبي (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات بيتا أو ديجوكسين).
- تستعمل أدوية لعلاج اضطرابات النظم القلبي أو عدم انتظام النظم القلبي (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات بيتا أو ديجوكسين).
- تستعمل نوعًا آخر من قطرات العيون يحتوي على حاصرات بيتا.
- تتناول مادة مثبطة لأنهيدراز الكربونيك مثل أسيتازولاميد.
- تتناول مادة مثبطة للأوكسيداز الأحادي الأمين (MAOI) (تُستعمل بعضها لعلاج الاكتئاب).
- تتناول دواءً من مجموعة محاكيات اللاودي ربما سُجل لمساعدتك في التبول. وتُستعمل الأدوية من مجموعة محاكيات اللاودي في بعض الأحيان لتنظيم حركة المعى السوية أيضًا.
- تتناول الأدوية المخدرة مثل المورفين، المستعمل لتسكين الألم المتوسط إلى الحاد.
- تتناول أدوية لعلاج السكري.
- تتناول مضادي الاكتئاب المعروفين أيضًا بفلوكسيتين وباروكسيتين.
- تتناول أدوية السلفا.
- تتناول الكينيدين (تُستعمل لعلاج حالات قلبية معينة وبعض أنواع الملاريا).
- تتناول أدوية تسبب انخفاض مستويات الكاتيكولامينات.
- تتناول الكلونيدين.
- إبينيفرين بالحقن.

2.4 الحمل والإرضاع

يجب استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الاستعمال خلال الحمل

يُمنع استعمال **كوسويت** إن كنت حاملاً إلا إذا اعتقد طبيبك أن تناوله ضروري.

الاستعمال خلال فترة الإرضاع

يُمنع استعمال **كوسويت** إن كنتِ مرضعاً دون استشارة الطبيب. قد ينتقل تيمولول إلى الحليب الذي تُنتجيه.

استشيري الطبيب قبل استعمال أي دواء خلال فترة الإرضاع.

2.5 قيادة السيارة واستعمال الماكينات

لم تُجر أي دراسات لفحص التأثيرات على القدرة على قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات. يمكن لبعض الأعراض الجانبية المرتبطة بـ **كوسويت**، مثل ضبابية الرؤية، أن تؤثر على قدرتك على قيادة السيارة و/أو تشغيل الماكينات. يُمنع قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات إلى أن ينحسن شعورك أو تستطيع الرؤية بوضوح.

2.6 معلومات هامة عن بعض مكونات كوسويت

يحتوي كوسويت على كلوريد البنزلكونيوم. إن كنت ترتدي العدسات اللاصقة اللينة فيجب عليك استشارة طبيبك قبل استعمال كوسويت (لأن مادة كلوريد البنزلكونيوم قد تؤدي إلى تغير لون العدسات اللاصقة) (انظر أيضاً البند 6.1 "ما الذي يحتوي عليه كوسويت؟").

2.7 الاستعمال عند الأولاد

هناك تجربة محدودة فيما يخص استعمال كوسويت عند الأطفال الرضع والأولاد. هذا الدواء غير معد للاستعمال عند الأولاد والأطفال الرضع.

2.8 الاستعمال عند المسنين

في الدراسات التي أجريت لاختبار كوسويت، كانت تأثيرات هذا الدواء عند المتعالجين المسنين متشابهة مع تأثيراته عند المتعالجين الأقل سناً.

2.9 الاستعمال عند المتعالجين الذين لديهم خلل في وظيفة الكبد

أخبر طبيبك إن كنت تعاني أو قد عانيت سابقاً من أي مشكلة في وظيفة الكبد.

3. كيف تستعمل كوسويت؟

استعمل كوسويت دائماً وفق إرشادات الطبيب. يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إن لم تكن متأكدًا. وسيحدد الطبيب فقط الجرعة وطريقة العلاج. الجرعة المتبعة عادة هي: قطرة واحدة داخل العين/العينين لعلاجها/علاجها صباحًا ومساءً. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. يُمنع بلع الدواء! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

إن كنت تستعمل هذا الدواء بالتزامن مع قطرات عيون أخرى فيجب استعمال القطرات بفارق 10 دقائق على الأقل. يُمنع تغيير جرعة الدواء دون استشارة الطبيب.

لا تدع طرف القنينة يلامس العين أو المناطق المحيطة بالعين وذلك لأن انتقال الجراثيم إليه قد يتسبب في تلوث العين وتضررها بشكل خطير، الحالة التي قد تؤدي إلى فقدان الرؤية. وتحسبًا لانتقال الجراثيم إلى القنينة يجب غسل اليدين قبل استعمال هذا الدواء ومنع طرف القنينة من ملامسة أي أسطح. وإن كنت تشتهي بأن الدواء بحوزتك يحتوي على الجراثيم أو إن أصبت بتلوث في العين فاتصال بطبيبك على الفور للاستفسار عن مواصلة استعمال هذه القنينة.

تعليمات الاستعمال:


1. قبل استعمال المستحضر لأول مرة تأكد من أن شريط الأمان في الجهة الأمامية من القنينة ليس مكسورًا. ويُعتبر وجود فارق بين القنينة والغطاء أمرًا عاديًا إن لم يتم فتح القنينة بعد.

→ سهمان يشيران إلى اتجاه الفتح

→ شريط الأمان



2. اغسل يديك أولاً ثم اسحب شريط الأمان وأزله لكسر الختم.




3. لفتح القنينة أدر الغطاء باتجاه السهمين المطبوعين على الجزء العلوي من الغطاء. يُمنع سحب الغطاء من القنينة مباشرة باتجاه الأعلى. ذلك لأن سحب الغطاء مباشرة للأعلى سيخل بوظيفة القنينة.



4. يجب إمالة الرأس للوراء وسحب الجفن السفلي قليلاً باتجاه الأسفل لتشكيل جيب بين الجفن والعين..




5. قلب القنينة واضغط بلطف بالإبهام أو السبابة على "المنطقة القابلة للضغط بالإصبع" (انظر الصورة) إلى أن تسقط قطرة واحدة داخل العين وذلك تبعاً لإرشادات الطبيب.



تجنب ملامسة العين أو الجفن بطرف القنينة.

6. بعد استعمال كوسويت اضغط بالسيابة على زاوية العين بجانب الأنف أو أغلق الجفنين لمدة دقيقتين. يساعد ذلك على منع تغلغل الدواء في الجسم، مما يساعد على منع الأعراض الجانبية.



7. إن واجهت صعوبة في تقطير القطرات لأول مرة بعد فتح القنينة، فأغلق القنينة بالغطاء بإحكام (لا تضغط أكثر مما يجب) ثم أزل الغطاء عن طريق إدارته بالاتجاه المعاكس وفق السهمين المطبوعين على الجزء العلوي من الغطاء.

8. يجب إعادة تنفيذ الخطوتين 4 و 5 في العين الأخرى إن اقتضت إرشادات الطبيب ذلك.

9. يجب إغلاق القنينة عن طريق وضع الغطاء وإدارته بإحكام إلى أن يلامس القنينة. ويجب أن يوازي السهم الذي يظهر على الجهة اليسرى من الغطاء السهم الذي يظهر على الجهة اليسرى من ملصق القنينة للتحقق من الإغلاق المحكم. ولا تضغط أكثر مما يجب كيلا تضر القنينة والغطاء.

10. طرف القنينة معد لتقطير قطرة واحدة ولذلك يُمنع توسيع الثقب في طرف القنينة.

11. بعد أن تستعمل كل الجرعات ستبقى كمية ضئيلة من كوسويت في القنينة؛ لا حاجة إلى الاهتمام بذلك لأن القنينة تحتوي على كمية زائدة من الدواء عمداً. وستحصل على الكمية الكاملة من كوسويت التي وصفها طبيبك لك. ويُمنع محاولة تقطير الكمية الزائدة من المستحضر.

إن استعملت كمية أكبر مما يجب من كوسويت
إن وضعت عدداً أكبر مما يجب من القطرات في العين أو بلعت بعض الكمية الموجودة في القنينة فقد تشعر بأعراض معينة تشمل الدوار والصعوبة في التنفس أو تباطؤ النظم القلبي. اتصل بطبيبك في الحال.
إن استعملت كمية مفرطة أو إن بلع طفل بالخطأ كمية من الدواء فيجب التوجه على الفور إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء.

إن نسيت استعمال كوسويت
من المهم تناول هذا الدواء وفقاً لما وصفه طبيبك لك.
وإن قوّت جرعة فاستعملها بأسرع ما يمكن. وإذا كانت ساعة الجرعة التالية قريبة فيجب عليك تفويت الجرعة المنسية والتقييد مرة ثانية بجدول ساعات الاستعمال الاعتيادي.
يُمنع استعمال جرعة مزدوجة تعويضاً عن الجرعة المنسية.
يتوجب عليك إكمال العلاج الذي أوصاك به الطبيب.
حتى إن تحسنت حالتك الصحية فُيُمنع التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة طبيبك.

إن توقفت عن استعمال كوسويت
إن أردت التوقف عن استعمال هذا الدواء فتحدث مع طبيبك أولاً.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟

1. تحسباً للتلوث احرص على إبعاد طرف القنينة عن أي أسطح (بما في ذلك العين ذاتها). يجب الاحتفاظ بالقنينة وهي مغلقة بإحكام.
2. قد تكون قنينة التقطير غير ملبنة بالكامل وذلك بصدد التمكين من السيطرة على التقطير بشكل أفضل.
3. كيفية استعمال قطرات العين: انظر البند "تعليمات الاستعمال".
4. بعد استعمال الدواء اغسل يديك جيداً لتنظيفهما من بقايا الدواء.
5. ولمنع انتشار التلوث يُمنع استعمال قنينة الدواء لعلاج أكثر من شخص واحد.

يُمنع استعمال الأدوية أو تناولها في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء ما. يجب وضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة لها.

وإذا كانت لديك أسئلة إضافية عن استعمال الدواء، فاطرحها على الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال كوسويت إلى أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

توقف عن استعمال كوسويت وتوجه إلى جهة طبية لتلقي العلاج على الفور إن ظهر لديك أي من الأعراض التالية:
ردود فعل تحسسية عامة، بما فيها التورم تحت الجلد في مناطق مثل الوجه والأطراف، الحالة التي من شأنها أن تؤدي إلى انسداد المسالك التنفسية وأن تتسبب في صعوبة في البلع أو التنفس، وكذلك الشرى أو الطفح الجلدي المثير للحكة، الطفح الجلدي الموضعي أو المنتشر، الحكة، ورد الفعل التحسسي الفجائي الحاد المهدد للحياة.

يُحدد شيوخ الأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أدناه وفق التصنيف المتبع التالي:
شائعة جدًا (تؤثر على أكثر من مستعمل واحد من أصل 10)
شائعة (تؤثر على مستعمل واحد إلى 10 مستعملين من أصل 100)
غير شائعة (تؤثر على مستعمل واحد إلى 10 مستعملين من أصل 1,000)
نادرة (تؤثر على مستعمل واحد إلى 10 مستعملين من أصل 10,000)
غير معروفة (لا يمكن تقييم شيوخ الأعراض بالاعتماد على المعلومات المتاحة)

قد تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية عند استعمال كوسويت أو أي من مكوناته في الدراسات السريرية أو في إطار الاستعمال بعد التسويق:

الأعراض الجانبية الشائعة جدًا:

الشعور بحرقة ولسعة في العين، اضطرابات في حاسة الذوق.

الأعراض الجانبية الشائعة:

احمرار داخل وحول العين (العينين)، إنتاج دموع أو الشعور بحكة في العين (العينين)، تضرر القرنية (تضرر الطبقة الأمامية من العين)، تورم و/أو تهيج داخل وحول العين (العينين)، الشعور بوجود جسم غريب داخل العين، انخفاض الإحساس في القرنية (عدم الإحساس بالأجسام التي تدخل العين أو بالألم)، ألم في العين، جفاف العينين، ضبابية الرؤية، الصداع، التهاب الجيوب الأنفية (الشعور بالضغط في الأنف أو احتقان الأنف)، الغثيان، الضعف/التعب والإرهاق.

الأعراض الجانبية غير الشائعة:

الدوار، الاكتئاب، التهاب الفرجية، اضطرابات في الرؤية تشمل تغيرات في طريقة انكسار أشعة الضوء (في بعض الحالات يحدث ذلك نتيجة لإيقاف العلاج بمقبضات الحدقة)، تباطؤ النبض، الإغماء، صعوبة في التنفس (ضيق التنفس)، عسر الهضم وتشكل الحصى في الكليتين (الحالة التي تتمثل عادة بالشعور بألم فجائي شديد وتشنجات أسفل الظهر و/أو في جانبي الجسم، في الأربية أو في منطقة البطن).

الأعراض الجانبية النادرة:

الذئبة الحمامية الشاملة (مرض مناعي قد تسبب التهابًا في الأعضاء الداخلية)، الشعور بتتميل أو عدم الإحساس في اليدين أو القدمين، الأرق، الكوابيس، فقدان الذاكرة، ارتفاع نسبة علامات وأعراض الوهن العضلي الوبيل (ضعف عضلي شديد)، نقص الرغبة الجنسية، السكتة الدماغية، قصر النظر المؤقت الذي قد يختفي بعد إيقاف العلاج، انفصال الطبقة تحت الشبكية التي تحتوي على أوعية دموية نتيجة لجراحة الترشيح، الحالة التي قد تسبب اضطرابات في الرؤية، هبوط الجفنين (الحالة التي تجعل العين تبدو نصف مغلقة دائمًا)، رؤية مزدوجة، تشكل غشاء على الجفن، انتفاخ القرنية (ترافقه أعراض واضطرابات الرؤية)، انخفاض الضغط داخل العين، الطنين، انخفاض ضغط الدم، تغيرات في النظم القلبي أو في سرعة النبض، القصور القلبي (مرض قلبي يرافقه ضيق التنفس وانتفاخ القدمين والساقين نتيجة لاحتباس السوائل)، الودمة (احتباس السوائل)، نقص التروية الدماغية (قلة التروية الدموية في الدماغ)، أوجاع في الصدر، الخفقان (تسارع و/أو عدم انتظام دقات القلب)، النوبة القلبية، متلازمة رينو، التورم أو الشعور بالبرد في اليدين والقدمين وقلّة التروية الدموية في الذراعين والساقين، تشنجات في الساقين و/أو ألم في الساق خلال المشي (العرج)، ضيق التنفس، خلل في وظيفة الرئتين (الشعور بالاختناق)، السيلان الأنفي أو احتقان الأنف، نزيف دموي من الأنف، انقباض المسالك التنفسية في الرئتين، الحالة المسببة لل صعوبة في التنفس، السعال، التهيج في الحلق، جفاف الفم، الإسهال، التهاب في الجلد نتيجة لملامسته، تساقط الشعر، طفح جلدي باللون الأبيض الفضي (طفح يبدو مثل الصدفية)، تقوس القضيبي (الحالة التي قد تسبب انحناء القضيبي)، ردود الفعل التحسسية مثل الطفح الجلدي، الشرى، الحكة، وفي حالات نادرة قد يحدث تورم في الشفتين والعينين والفم، أزيز أو ردود فعل جلدية حادة (متلازمة ستيفنس جونسون، تقشر الانسجة المتوتة البشرية التسممي).

مثل أدوية أخرى لعلاج العينين، يتم امتصاص تيمولول في الدم. وقد تؤدي هذه الحالة إلى ظهور أعراض جانبية متشابهة مع تلك المرتبطة بحاصرات بيتا الفموية. وتُعتبر الأعراض الجانبية المرتبطة بالاستعمال الموضعي في العينين أقل شيوعاً مثلًا من الأعراض المرتبطة بالأدوية المعطاة عبر الفم أو بالحقن. وتشمل الأعراض الجانبية الإضافية المدرجة ردود الفعل التي شوهدت عند استعمال الأدوية من مجموعة حاصرات بيتا لعلاج المشاكل في العينين.

الأعراض الجانبية التي مدى شيوعها غير معروف:
مستويات منخفضة من السكر في الدم، قصور قلبي، اضطراب من نوع معين في النظم القلبي، أو جوع في البطن، تقيؤ، آلام العضلات غير المرتبطة بالنشاط البدني ومشاكل في الأداء الجنسي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة طبيبك.

يمكن تبليغ الأعراض الجانبية إلى وزارة الصحة عن طريق الضغط على الرابط "التبليغ عن الأعراض الجانبية في أعقاب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجهك إلى استمارة متصلة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. كيف يجب تخزين كوسويت؟

- تجنب التسمم! يجب الاحتفاظ بهذا الدواء وأي دواء آخر في مكان آمن بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال كوسويت بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم من الشهر المذكور.
- **ظروف التخزين:** يجب تخزين المنتج بدرجة حرارة تقل عن 30 درجة مئوية. يجب حمايته من الضوء. وبعد فتحه لأول مرة، يجب استعماله خلال 4 أسابيع.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لن تُستعمل مرة ثانية. ستساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

6.1 ما الذي يحتوي عليه كوسويت؟

- المواد الفعالة هي: دورزولاميد (كهيدروكلوريد) 20 ملغ/مل وتيمولول (كماليات) 5 ملغ/مل.
- إلى جانب المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على المكونات غير الفعالة التالية:
Mannitol, hydroxyethylcellulose, sodium citrate dihydrate, sodium hydroxide, benzalkonium chloride, water for injection.
- تحتوي قطرات العين كوسويت على كلوريد البنزوكونيوم كمادة حافظة (انظر أيضًا البند 2.6، "معلومات هامة عن بعض مكونات كوسويت").

6.2 كيف يبدو كوسويت وما هو محتوى العبوة؟

كوسويت عبارة عن محلول لزج بعض الشيء، صافٍ، عديم اللون أو عديم اللون تقريبًا. حجم العبوة: 5 مل من المحلول في قنينة بلاستيكية. وُضع على ملصق القنينة شريط أمان يضمن أن يتم فتح القنينة لأول مرة من قبل المتعالج (tamper evidence).

صاحب التسجيل وعنوانه:

مختبرات رفا.م.ض.، ص.ب. 405، أورشليم القدس 9100301

الجهة المصنعة:

ميرك شارب اند دوم، شيبيرييه، فرنسا.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة

141.55.29511.01

قامت وزارة الصحة بفحص هذه النشرة والمصادقة عليها في يونيو 2016.

لغرض تسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.