

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ז - 1986  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

## גלאוסון טיפוס עיניים

הרכב:

לטנופרוסט 50 מק"ג/מ"ל  
לטנופרוסט 50 mcg/ml  
לרשימת החומרים והבנתו פעילים, אנו רשמיים 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. התרופה זו מיועדת לטיפול במבוגרים מעל גיל 18 שנים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

**פעילות רפואית:**

להורדת לחץ תוך עיני בחולים הסובלים מברקית (גלאוקומה) מטיפוס הזוויתי הפתוחה ומלחץ תוך עיני מוגבר.

**קבוצה תרופית:**

אנלוג פרוסטגלנדין F2.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) ללטנופרוסט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6: "מידע נוסף").
- את בהריון או מתכננת להיכנס להריון.
- את מיניקה.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

**לפני הטיפול בגלאוסון, ספר לרופא אם:**

- הן קרומי לעבור או עברת לאחרונה ניתוח בעיניים (כולל ניתוח קטרקט).
  - הן סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד העיניים (כגון כאב עיניים, גירוי או דלקת, ראייה מטושטשת, זיהום (כגון הרפס), גלאוקומה צרעת זווית חמורה, פגיעה בעדשות העיניים וכו').
  - הן סובל או סבלת בעבר מעיניים יבשות.
  - הן סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב.
  - הן סובל או סבלת בעבר ממחלת הכבד, הכליה.
  - הן סובל מאסטמה חריפה, או מאסטמה אשר אינה מבוקרת.
  - הן משתמש בעדשות מגע. הן יכול להשתמש בגלאוסון, אך יש לעקוב אחר ההוראות בסעיף 3.
- בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לעקוב אחר פגיעה בנקודת הקשב.

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: אצטאזולאמיד - משתנים, כחשירים כולינגיים (פוליקרפין), חוסמי בטא (טימולול), דיפברין ואפיפרין - אגוניסטים אדרנרגיים, פרוסטגלנדינים, אנלוגים וגזרות לפרוסטגלנדין.

**אין להשתמש בתרופה אם הן בהריון.** יש לפנות לרופא מיד אם הן בהריון, מתכננת הריון או חושבת שאת בהריון. אין להשתמש בתרופה אם הן מיניקה.

**נהיגה ושימוש במכונית -** השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטשטוש ראייה לפרק זמן קצר. במידה וזה קורה, יש להמנע מנהיגה או מהפעלת מכונית מוסכמת כל עוד ראייתך מטושטשת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה -** התרופה זו מכילה חומר משמר בשם בנדלוקוניום כלוריד. חומר זה עלול לגרום לגירוי או לפגיעה בקרנית (פני השטח של העין). החומר עלול להיספג על ידי עדשות מגע ולגרום לשינוי בצבע של עדשות מגע רכות. לכן, יש להימנע מלשמש את התכשיר עם עדשות מגע רכות.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי ההוראות הרופא.

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא טיפה אחת פעם ביום, רצוי בערב.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

רחץ היטב את ידיך. הטה ראשך לאחור או שכב על מיטה ובעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר ספסוף את התרופה. לחץ עם האצבע על פינת העין הקרובה לאף למשך כדקה תוך כדי העיסוי העין. אל תעפעף. למניעת זיהום

התמיסה ההפך שפיית הקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור את הקבוק היטב. אין להשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הקבוק הראשונה. בטיפול משולב עם טיפות עיניים אחרות יש לחכות 5 דקות בין הטיפולים.

אם הן משתמש בעדשות מגע, יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ- 15 דקות מהזלפת התרופה לעין.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** (שמת יותר מדי טיפות בתוך העין) דבר עלול לגרום לגירוי מקומי בעין (המתבטא בהאדמת העין והפרשת דמעות). התופעה אמורה לחלוף, אך אם הן מוטרת יש לפנות לרופא. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת לטויל תרופה זו** בזמן הדרוש, יש לטויל את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין לטויל שתי מנות ביחד על מנת לפצות על המנה שנשכחה!

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין לטויל תרופות בחושיך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הן זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגלאוסון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות:**

- שינוי הדרגתי של צבע העיניים על ידי עליה בפיגמנט החום בקשתית העין. במטופלים שצבע עיניהם מעורב (כחול-חום, אפור-חום, צהוב-חום או ירוק-חום) יש יותר סבירות לראות את השינוי בצבע מאשר במטופלים שצבע עיניהם אחיד (כחול, אפור, ירוק או חום). שינוי הצבע עלולים להתפתח לאחר שבנים. למרות שברוך כלל ניתן לראותם כעבור 8 - כ חודשי טיפול. השינוי בצבע עלול להיות תמזי ועלול להיות בולט במידה והנך משתמש בגלאוסון רק בעין אחת. ככל הנראה שינוי הצבע אינו גורם לבעיות לשהן. צבע העין אינו ממשיך להשתנות במידה והנך מפסיק את הטיפול בתרופה.
- אודם בעין.
- גירוי בעין (תחושת צריבה, הרגשת "חול" בעין, גרד, עקצוץ, הרגשת "גוף זר" בעין).
- שינוי הדרגתי בריסים של העין המטופלת ושערות עדינות סביב העין המטופלת (נצפה בעיקר במטופלים ממוצא יפני). השינויים כוללים שינוי בצבע (התכהות), אורך, עובי ומספר הריסים.
- גירוי או פגיעה בפני השטח של העין, דלקת בעפעף, כאב בעין.

**תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות:**

- בצקת בעפעף, יובש בעין, דלקת או גירוי של הקרנית (פני השטח של העין). טשטוש ראייה, קוניוזיטיס (דלקת בלחמית העין).
- פריחה בעור.

**תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות:**

- דלקת בקשתית העין, נפיחות של רשתית העין, תסמינים של נפיחות או של שרית/פגיעה בפני השטח של העין, נפיחות סביב העין, צמיחת הריסים בכיוון לא תקין או שורה נוספת של ריסים, הפוספובי (גרישות לאור).
- התכהות עור העפעף או שינויים בו.
- אסטמה או החרפה באסטמה קיימת וקוצר נשימה.

**תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות מאוד:**

- החמרה של תעוקת חזה (אנגינה) במטופלים עם מחלות לב; כאב בחזה; שקיעת עיניים (העמקת הריץ העפעף).

**תופעות לוואי ששייכות אינה ידועה:**

- ציטוט בקשתית, כאבי ראש, סחרחורת, דפיקות לב, כאבי שרירים, כאבי פרקים, התפתחות זיהום בעין הנגרם על ידי וירוס הרפס Simplex Herpes (HSV), נדל, חום.
- מקרים נדירים מאוד** חלק מהמטופלים עם נזק חמור לקרנית העין פיתחו כתמים עכורים בקשתית עקב שקיעת הסיידן במהלך הטיפול.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה/ תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- יש לאחסן במקרר בטמפרטורה של 2°-8°C, מוגן מאור. לאחר הפתיחה ניתן לשמור בטמפרטורת החדר (מתחת ל- 25°C) למשך עד 4 שבועות. יש לזרוק את השארית.

### 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Disodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, Benzalkonium chloride, Sodium chloride, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**גלאוסון** ארוזה בתוך בקבוקון אשר מוכנס לתוך אריזת קרטון. בכל בקבוקון של **גלאוסון** יש 2.5 מ"ל של תמיסה. התמיסה היא צלולה וחסרת צבע.

שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א, 6121301.

שם היצרן וכתובתו: ויטאמדי בע"מ, בנימינה.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מרץ 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 139 75 31597 00

לשם הפטנט וההקלת הקריאה, עלון זה נוסח בעברית. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.