

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد في اليوم. من المفضل تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها. يجب بلع الدواء بشكله الكامل مع الماء. ممنوع السحق/الشرط/المضغ، ذلك لأن القرص مطلي.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع الطفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك. الأعراض المحتملة في حال تناول جرعة دوائية مفرطة هي: صداع، جفاف في الفم، دوام، تشوش الرؤية، الميل إلى النوم، هذيان، إختلاجات، صعوبة في التنفس، تسارع دقات القلب، إحتباس البول، توسع الحدقتين.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سوليفيناسين قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهم من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية: angioedema (رد فعل تحسسي للجلد الذي يتجلى بوذمات في الطبقات العميقة للجلد حيث يترافق بصعوبات في الطرق التنفسية).

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا ظهرت الأعراض التالية:

رد فعل تحسسي يتجلى بطفح جلدي، حكة، حوصلات في الجلد، إنتفاخ في الوجه، في اللسان، في العنق و/أو في الأطراف، ضيق تنفس.

يجب مراجعة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

إمسك يستمر أكثر من ٣ أيام، ألم شديد في البطن.

أعراض جانبية إضافية

• **تظهر في أوقات متقاربة جداً**

جفاف الفم

• **تظهر في أوقات متقاربة**

إمسك، غثيان، أعراض في الجهاز الهضمي (مثل: الشعور بالإمتلاء، آلام في البطن، تجشؤات، حرقان، عدم الراحة في المعدة) تشوش الرؤية

• **تظهر في أوقات متباعدة**

إلتهاب في المسالك البولية و/أو في المثانة

نعاس وإرهاق

تغيرات في حاسة المذاق

جفاف في العينين، في الجلد و/أو في الأنف

صعوبة في التبول

إرتداد (عودة محتوى الأمعاء إلى المريء)، جفاف في الحجرية

معبروت ٤٠٢٢٠٠٠

منتجات طبية إسرائيلية

معبروت، م.ض.

وذمة في الأطراف السفلية

• **تظهر في أوقات نادرة**

ألم شديد في البطن، إندساد الأمعاء، إمساك حاد

إحتباس البول

صداع ودوار

تقيؤ

حكة، طفح

• **تظهر في أوقات نادرة جداً**

هذيان، إرتباك

طفح تحسسي

• **أعراض جانبية شيعها غير معروف**

تغيرات في التخطيط الكهربي للقلب، نظم قلب غير منتظم

تسارع دقات القلب

قلة الشهية للطعام، نسبة مرتفعة للپوتاسيوم في الدم التي

قد تؤدي إلى نظم قلب غير سليم

زيادة في الضغط الداخلي للعين

تغيرات في وظيفة الكبد و/أو الكلى

ضعف عضلي

إضطراب في الأوتار الصوتية

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) **كيفية تخزين الدواء؟**

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

• يجب التخزين في العبوة الأصلية.

٦) **معلومات إضافية**

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Lactose anhydrous, maize starch, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol, D&C yellow No. 10, FD&C red No. 3, FD&C red No. 2 aluminium lakes.

كل قرص من سوليفيناسين - تريما ٥ ملغ يحتوي تقريباً على ٦١ ملغ لكتوز.

كل قرص من سوليفيناسين - تريما ١٠ ملغ يحتوي تقريباً على ١٢٢ ملغ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

كل عبوة تحتوي على ٣٠ قرصاً مستدير بلون أصفر باهت.

صاحب الإمتياز: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معبروت م.ض.، معبروت ٤٠٢٢٠٠٠ إسرائيل.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تموز ٢٠١٤

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٥ mg : ١٥٢-٢٢-٣٢٨٧٢-٠٠٠

١٠ mg : ١٥٢-٢٢-٣٢٨٦٩-٠٠٠

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تريما