

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدالة (مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

حددت هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وفحص محتواها وصادقت في ٢٠٠٧/١

سينتوميسين ٥٪ مرهم للعينين

التركيب : Chloramphenicol 5%

المواد الغير فعالة: Vaseline yellow, Lanoline Anhydrous

المجموعة العلاجية: مضاد بكتيري من مجموعة الكلورامفينيكول.

تأثيرات الدواء الطبية: معالجة تلوثات العين السطحية ، بما في ذلك لحمية العين والقرنية والتي تسببها عضويات مجهرية حساسة للكلورامفينيكول .

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر ؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لاحد مركباته أو لعقاقير أخرى تحتوي الكلورامفينيكول .

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً :

عندما تكونين حاملاً أو مرضعة .

اذا كنت تعاني/ن او اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة جهاز الدم .
خلل وظيفي في نخاع العظام .

تحذيرات: يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء .

التفاعلات بين الأدوية: اذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر ، فيجب اعلام الطبيب المعالج ، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير .

الأعراض الجانبية: إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كتشوش الرؤية والاحساس بحرقة في العينين.

الأعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً: انخفاض في عدد كريات الدم ويتجلى ذلك بالشحوب ، سخونة ، آلام في الحلق ، تهيج ، طفح أو التهاب موضعي (لم تكن قبل استعمال المستحضر). (نادراً) : توقف /ي عن العلاج وراجع /ي الطبيب . اعراض جانبية تظهر لأول مرة بانتهاء العلاج : سخونة ، آلام في الحلق . يجب مراجعة الطبيب حالاً .

أما اذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو اذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء ، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً .

المقادير الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.

لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها .

يجب مراجعة الطبيب ثانية اذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال اسبوع .
انتبه/ي :

هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط .

ارشادات الاستعمال:

اغسل/ي يديك جيداً. ابعد/ي الجفن السفلي عن العين قليلاً بمساعدة الاصبع لتكوين فجوة. ضع/ي في الفجوة الحاصلة شريطاً رقيقاً من المرهم بعد إخراجها من الماسورة (نحو ١ سم عادة) وادخل/ي المرهم لداخل الفجوة التي تكونت. اغلق/ي عينيك بعدئذ لفترة دقيقة . دقيقتين .

هذا ولمنع تلوث المرهم يجب الحرص على عدم تماس فوهة الماسورة بأجسام غريبة بما في ذلك الإصبع او العين . نشف/ي فوهة الماسورة بعد الانتهاء من الاستعمال بواسطة منديل من الورق النظيف ، ثم اغلق/ي بإحكام .

كيف تستطيع/ين ان تساهم/ي في نجاح العلاج ؟

يجب اكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب .

لا تتوقف/ي عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية .

تجنب/ي التسمم : يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً

عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ، وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم .

اذا افرطت في استعمال المقادير الدوائية او اذا يلع الطفل/ة خطأً من هذا الدواء ، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء .

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب .

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك ، وقد يسبب الضرر لمريض آخر .

لا تعط/ي من الدواء الى اقاربك ، جيرانك او معارفك .

لا تتناول/ي الدواء في الظلام: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من

المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء . ضع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك .

التخزين: يُحفظ في مكان جاف وتحت درجة حرارة ٢٥C درجة مئوية.

يُمنع الاستعمال لفترة تزيد عن ٢٨ يوماً بعد فتح العبوة للمرة الاولى.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط. حتى ولو ظلت في عبوتها الاصلية

وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية

المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي

الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة .

رقم سجل الدواء : ٢٣٤١٢٠٨٥٠٠٠

المنتج : ريكح للصناعة الدوائية ش.م.م. شارع هاميلان ٣٠ ، حولون .