

טופיסלן משחה

חומרים פעילים:

Flumethasone Pivalate 0.02% (פלומטסון פיולאט 0.02%)
Salicylic acid 3% (חומצה סליצילית 3%)

לחומרים בלי פעילים בתכשיר - ראה טעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

או כתר לידה. יש להימנע מחבישה אוטמת של האזור הנגוע (חיתולים לתינוק מהווים חבישה אוטמת).
נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. התרופה אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

אין להשתמש על שטחי עור נרחבים, פצעים פתוחים או מזהמים, עור מודלק, שומה או כתר לידה. יש להימנע מחבישה אוטמת של האזור הנגוע (חיתולים לתינוק מהווים חבישה אוטמת).
זחירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ובמתבגרים. השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלווה במעקב רפואי.
אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

לשימוש מקומי דלקתי במקרי דלקת עור של דרמטוזות המגיבות לקורטיקוסטרואידים, במיוחד במקרים של התקרנות יתר (הפיקרטוזיס).

קבוצה תרופית: Flumethasone Pivalate הנו קורטיקוסטרואיד.
Salicylic acid הנו קרטוליטי.

2. לפני שימוש בתרופה

✘ אין להשתמש בתרופה אם:

- יודעה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה, לאספירין, סליצילטים ותכשירים נוגדי דלקת אחרים שאינם סטרואידים (NSAIDs).
- הנך סובל מזהום ויראלי (כגון: הרפס או אבעבועות רוח), פטריות או שחפת העור.
- אין להשתמש בתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

זהירות מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם הנך רגיש למזון או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- אין להשתמש בתכשיר למטרות שונה מזו שלשמה הוא נרשם.
- אין להשתמש על שטחי עור נרחבים, פצעים פתוחים או מזהמים, עור מודלק, שומה או כתר לידה.
- במידת הצורך יש להשתמש בכמות המינימלית הנדרשת על עור הפנים, במפשעה ובבית השחי.
- אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם העיניים. במקרה של מגע יש לשטוף היטב עם מים במשך 15 דקות באופן מידי.
- זהירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ובמתבגרים. השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלווה במעקב רפואי עקב סיכון מוגבר לספיגת התכשיר לזרם הדם.
- כאשר משתמשים בתכשיר תקופה ממושכת: יש לדווח לרופא אם הנך סובל מגלאוקומה, קטקט או מחלות כליה.
- יש להימנע מחבישה אוטמת של האזור הנגוע (חיתולים לתינוק מהווים חבישה אוטמת).
אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא.

לפני הטיפול בטופיסלן, ספר לרופא אם:

- הינך בהריון או מיניקה.
 - הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד כלי הדם ההיקפיים, הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת החיסון, מוסכרת (בשימוש ממושך).
- אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
- תרופות לטיפול מקומי באקנה, תרופות המכילות אלקהול או כל תכשיר אחר העשוי לגרום ליובוש ו/או קילוף העור.

הריון והנקה:

אם הינך בהריון או מיניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

ל תינוקות וילדים:

התרופה אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

אין לטפל בתינוקות ובילדים יותר משבועיים ללא הוראה מפורשת מהרופא. במידה ולא הותווה על ידי הרופא יש להימנע מחבישה אוטמת של האזור הנגוע (חיתולים לתינוק מהווים חבישה אוטמת).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח לגבי אופן השימוש בתרופה.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא: 2-4 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש למרוח בידיים נקיות כמות משחה שתכסה את האזור הנגוע. יש לעסות קלות על מנת להחדיר את המשחה לעור. יש לשטוף ידיים היטב לאחר השימוש (אלא אם כן האזור המטופל הוא הידיים).

לא לבלוע! לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים או עם רקמות ריריות (כגון: באף ו/או בפה).

אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכתח ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים או הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטופיסלן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות:

- גירוי, פריחה, זיהום מקומי או דלקת מקומית (שלא היו לפני השימוש בתכשיר).
- תסמינים העשויים להעיד על הרעלה מחומצה סליצילית (עקב שימוש ממושך על שטחים נרחבים), כגון: בחילה/קאות, שלשול, סחרחורת, עייפות, טינטון, אובדן שמיעה וכו'.

תופעות לוואי נוספות:

יש לפנות לרופא אם התופעות הבאות מתמשכות: אדמומיות, הרגשת חום/כאב מקומי, עקצוץ, גרד, קילוף העור, יובש של העור.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כדור תרופה אחרת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/שפופרת. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום קריר, מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Polyethylene, liquid paraffin, propylene glycol, sorbitan mono-oleate, propyl hydroxybenzoate.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

שפופרת המכילה 15 גרם משחה בצבע לבן.

• **יצרן ובעל הרישום:** תרימה, תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 18.02.2013.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 023.58.21362.00.

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשיני המינים.

מעברות 4023000
תוצרי רפואה ישראלים
מעברות בע"מ



106798110

