

# أكامول فوكوس

## حبسولات

التركيب:

تحتوي كل حبسولة على:

Acetylsalicylic acid	250 mg
Paracetamol	250 mg
Caffeine anhydrous	65 mg

للمزيد من المعلومات غير الفعالة في المستحضر، انظر الفقرة ٦ - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أي أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطي هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص للكبار والأطفال من عمر ١٢ سنة وما فوق.

يتوجب عليك تناول الدواء على الشكل الصحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

هذا الدواء غير مخصص عادة للمرأهقين والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من ٣ أيام أو إذا لم يطرأ تحسن على الآلام خلال ٥ أيام رغم إستعمال الدواء.

(١) الأغراض المخصوصة للدواء؟

مسكن للألم في حالات مثل: الميجرينا، الصداع، التهاب الجيوب الأنفية، الركак، ألم العضلات، آلام الطمث، آلام الأسنان، الآلام الروماتيزمية الخفيفة والألام المترافقه بسخونة.

الفصيلة العلاجية:

مسكن للألم في حالات مختلفة بما في ذلك تخفيف السخونة.

(٢) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال هذا الدواء:

عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة.

إذا وجدت حساسية لأحد مركباته أو لمستحضرات أخرى مضادة للالتهاب لاستيروئيدية.

إذا كنت تعاني من قرحة معدية نازفة، أنزفة، هيموفيليا (الناعور)، النقرس، مشاكل في المعدة (قرحة هضمية نشطة) أو من ربو بالمشاركة مع زوائد في الأنف.

لدى أطفال ومرأهقين حتى عمر ٢٠ سنة وذلك في أمراض تترافق بسخونة مثل: إنفلوانزا أو جدري الماء (خشية حدوث متلازمة ريري -Reye's syndrome-).

إذا عانيت ذات مرة من الأعراض التالية بعد تناول مسكن للألم أو دواء خافض للسخونة: شرى (طفح وذمي)، انتفاخ الوجه، ربو، صدمة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

لا يجوز تناول مستحضرات تحتوي باراسيتامول إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات حاوية على باراسيتامول، وذلك كي لا تحدث لديك ثانية أعراض جلدية خطيرة.

إذا كنت أنت أو طفلك حساسين لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

يحتوي المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:

يعطى بجرعات أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.

عندما يتم شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.

لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة بدون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الآلام أو أدوية للزكام بدون إستشارة طبيب أو صيدلي وذلك لمنع حدوث فرط الحرارة الدوائية أو التسمم بالباراسيتامول.

لا يجوز تناول أدوية إضافية من «عائلة الأكامول» و/أو مستحضرات إضافية تحتوي باراسيتامول.

يجب الإمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية (وذلك ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

يحتوي هذا المستحضر على الأسپيرين والذي بالمشابه لمستحضرات أخرى تتسم إلى فصيلة مضادات الالتهاب لاستيروئيدية (NSAIDs)، قد يزيد الخطورة حدوث نزف في المعدة بالأخص في الحالات التالية: لدى أشخاص يتناولون بنفس الوقت أدوية لتقييم الدم، ستيروئيدات، وأدوية أخرى، عند الإستعمال المطول بالمستحضر وعدم استهلاك الكحول.

يجب الحذر من استهلاك الكافيين أثناء العلاج.

قد يعرقل المستحضر من نتائج فحص السكر في الدم.

لا يجوز تناول هذا الدواء ٧ أيام قبل آية عملية جراحية.

☒ يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

مرض كبدى أو خلل في وظائف الكبد

خلل في وظائف الكلية

الإدمان على الكحول (alcoholism)

يرقان

خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل إضطرابات في النظم، ارتفاع ضغط الدم)

الجهاز التنفسى (مثل ربو)

زوائد أنفية

الجهاز الهضمى (مثل قرحة)

جهاز الدم (مثل التخثر وما شابه)

صداع على أساس يومي، صداع مختلف أو أشد من المعتاد، أو إذا كان الصداع ناتجاً عن إصابة، سعال أو إنحساء

إذا تجاوزت عمر ٥٠ سنة وكانت تقاسى من صداع للمرة الأولى و/أو إذا كان الصداع متزاماً بمتغيرات، سخونة و/أو تصلب العنق.

☒ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية وفيتامينات، أحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول دواء أو إذا أنهيت العلاج لأنّ دواء من المجموعات التالية:

أدوية مضادة للتخثر الدم مثل وارفارين أو كلوبيديجرين (باربيتورات)

أدوية للصرع - فينيتوئين، كاربامازيبين

المستحضرات المضادة للالتهاب لاستيروئيدية (المعالجة الغثيان، التقيؤ والمشاكل

المهمضية الأخرى)

كلورأمفينيكول (مضاد حيوي)

پروبينسيد (العلاج النقرس)

كوليستيرامين (لتخفيف فائض شحوم الدم)

ميتوترىكسات

أدوية ضد السكري

زيديوثوردين (لإلز)

أدوية أخرى ذات تأثير مسكن للألم ومضاد للالتهاب

كورتيكosteroidات

- أدوية لتخفيف ضغط الدم (مثل مثبطات ACE مثل مثبطات SSRI)
- مضادات الإكتئاب أو القلق (مثل فصيلة SSRI)
- مضادات الحموضة
- أدوية لعلاج الربو (مثل تيوفيللين)
- المدرات البولية (مثل فوروسيميد)
- لا يجوز تناول هذا الدواء سوية مع مستحضرات أخرى تحوي باراسيتامول

### ☒ إستعمال باراسيتامول وإستهلاك الكحول

لا يجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بباراسيتامول بسبب زيادة الخطورة لحدوث ضرر للكبد.

### ☒ الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة. انظر الفقرة ٢.

### ☒ الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء غير مخصص عادة للمرأهقين والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

### ☒ كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. المقدار الدوائي الإعتيادي في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: للباراسيتامول ما فوق عمر ١٢ سنة: حبسولتين كل ٦ ساعات.

لا يجوز تناول أكثر من ٨ حبسولات بـ ٢٤ ساعة. لا يجوز تناول الدواء لأكثر من ٤٨ ساعة في حالة الميجرينا.

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص عادة للمرأهقين والأطفال دون عمر ١٢ سنة. إذا استمرت السخونة لأكثر من ٣ أيام أو إذا لم يطرأ تحسن على الآلام خلال ٥ أيام، يجب مراجعة الطبيب.

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من ٣ أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال ٥ أيام رغم إستعمال الدواء.

إرشادات الإستعمال

لا يجوز المرض! يجب بلع الدواء مع كأس ماء مليئة.

يجب تناول الدواء بعد وجبة طعام.

لا يجوز الإستقاء ١٥ - ٣٠ دقيقة بعد تناول الدواء.

لا يجوز شطط أو سحق الدواء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب حتى ولو كان شعورك جيداً. فإن العلاج الفوري هو ضروري، بسبب الخطورة لتطور ضرر خطير للقلب.

الأعراض الجانبية يمكن أن تكون غثيان وقيء، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام بطانية، إنفاس، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن ومن الجائز أنها لا تعكس خطورةضرر الحادث للكبد.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقاييس الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

### ☒ الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أكامول فوكوس قد يسبب أعراضًا جانبية مثل تهييجات أو دوار، عند بعض المستعملين. لا تتدشن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن لا تعياني أي منها.

#### أعراض جانبية شديدة

##### يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب حالاً

• في حال ظهور ردود فعل تحسسية شديدة مثل طفح وحكة، إحرار، إنفاس، الشفتين، اللسان، الحنجرة و/أو الأطراف التي قد تسبب صعوبات في التنفس أو في البلع.

• يمكن لباراسيتامول أن يؤدي في حالات نادرة، لظهور أمراض جلدية شديدة التي علاماتها يمكن أن تكون: أحمرار، طفح، حويصلات، أذى جلدي واسع.

قد تظهر أعراض جانبية جلدية شديدة حتى ولو تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي باراسيتامول.

• في حال ظهور أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري.

• في حال ظهور علامات لبراز دموي أو أسود، إرهاق أو ضعف شديد، ألم شديد في المعدة، دوار، إغماء، تقيؤات دموية شديدة أو تشبه حبيبات القهوة.

• في حال ظهور علامات لرجفان، قلة الهدوء، قلق، طنين في الأذنين، مشاكل في السمع، تغيرات في نظم القلب، إختلالات، فقدان الشهية للطعام، تعرق زائد، بول داكن، تغيرات في التبول، اصفرار العينين و/أو الجلد.

أعراض جانبية أخرى غثيان، تهيج المعدة، ألم في البطن، حرقان، ألم خفيف في البطن، عصبية، أرق.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

### ☒ كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين في مكان جاف، دون ٢٥ درجة مئوية.

بالإمكان الإستعمال حتى ٦ أشهر من فتح الوعاء للمرة الأولى، ولكن على

الإبقاء ماص الرطوبة داخل الوعاء وإغلاق الوعاء جيداً بعد كل استعمال. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

### ☒ معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا:

Microcrystalline cellulose, stearic acid, crospovidone, silicon dioxide, pre-gelatinized starch, povidone, hydroxypropyl methylcellulose, FD&C red #40, FD&C yellow #6, polyethylene glycol 400, titanium dioxide, polysorbate 80, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

حبسولات (حبة بشكل كبسولة) لونها أحمر محدبة الجانبين، سوية مع ماص للرطوبة، داخل وعاء بلاستيكي أبيض.

### ☒ المنتج وصاحب الإمتياز:

تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب.، ٢١٩٠، بيتح - تكفا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فُحص ورُخص في ٢٠١٣/٩/٣٠.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

١٢١ - ٣٠٩٩٥ - ٢٥ - ٠٠

١٢١ - ٣٠٩٩٥ - ١١

١