

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(ותכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אלרין® לתינוקות תמייסת מי מלח טיפול אף/טרסיס מזוד לאף

הרכב:

נתרן כלורי v/a 0.74% Sodium Chloride 0.74% v/a

רשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת ווסף, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם אתה זוקק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באמצעות הסימפטומים חמיריים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה:

התרופה מיועדת להקלת בגודש האף, במיוחד אצל תינוקות.

2. לפני השימוש בתרופה

☒ מתי אין להשתמש בתרופה זו:

אתה או הילד שלך רגש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה.

☐ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באLERIN® לתינוקות תמייסת מי מלח, ספר לרופא אם:

- אתה או הילד שלך סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד הכבד, הלבב ו/או כלי הדם, יתר לחץ דם.
- אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהו.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיעזר ברופא.
- אין להשתמש בתרופה זו כshallˋ שניי במצב התמייסה או כשהיא הופכת לעכורה.

☐ אם אתה לוקח או אם תקח לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

☐ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: התכשיר מכיל בנזלקונים כלורייד אשר עלול לגרום לגידירות האף.

☐ הרוין והנקה: אפשר להשתמש בתרופה בהרוין או אם את מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

טיפול: 2 טיפות בכל נחיר עד 4 פעמיים ביום.
טרסיס: 1-2 לחיצות בכל נחיר 3-4 פעמיים ביום.

אם לא חל שיפור במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא. אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש בתכשיר:

שים לב! לא לבלווע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

טיפול אף:

יש להסיר את מכסה הבקבוק. קנח את אף הילד בעדינות. הטה ראש הילד לאחר או השכב אותו על מיטה. טפף את הטיפול לכל נחיר ונחיר תוך כדי חסימת הנחיר השני באצבע. במידת האפשר מומלץ לשאוף שאיפות קצרות תוך כדי לחיצות מהירות וחזקות על הבקבוק.

טרסיס לאף: מספר הלחיצות יהיה בהתאם למינון המומלץ. יש להמתין 3-5 דקות ולאחר מכן שוב את האף בעדינות. שטוף פית המרסס במים חמימים תוך הקפדה שלא יכנסו מים לתוך הבקבוק. נגב במפית ניר נקייה וסגור היטב.

למניעת הפצת זיהום אין להשתמש באותו בקבוק ליותר מילד אחד.

אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן, אין ליטולמנה כפולה, אלא ליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל ולהיעזר ברופא. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפחות על מנה שנשכח.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זוקק להוין.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באLERIN® לתינוקות תמייסת מי מלח עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימה תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

בנוסף לפועלות הרצiosa של התרופה בזמן השימוש בה עלות להופיע השפעות לוואי כגון: גירוי או צריבה זמניים באף.

אחת התופעות הבאות:

כיצד נראהת התרופה ומה תוכן הארץיה: התרופה מופיעה כטרסיס או כתיפות.

היצרן ובעל הרישום וכותבתו:

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 0193, פתח תקווה

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד

הבריאות: 132-50-31095

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ב- 31.5.2015.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נושא בלשון זכר.

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

34A167434-02