

بيتاهاستين تيغ ١٦ ملغم

أقراص

المادة الفعالة وكميتها:

بمحض كل قرص: بيتاهاستين ديهيدرو كلوريد ١٦ ملغم
(Betahistine dihydrochloride 16 mg)

للثانية المواد غير الفعالة، الرجاء انظر الفقرة ٦.

إنقرأ الشارة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك

استشارة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

ونصف هذا الدواء لعلاج مردك. لا تطهيله للآخرين، فهو قد يؤذيهم

حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمردك.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين دون عمر ١٨ سنة.

١) لاي غرض مخصص الدواء؟

* الدواء مخصص لعلاج متلازمة مانير (Meniere's syndrome) التي تتجلى بدوخة،طنين في الأذنين (tinnitus) ولعلاج أعراض الترقم المحيطي.

* يعمل الدواء من خلال تحسين جريان الدم في الأذن الداخلية.

الامر الذي يقلل من تراكم الضغط.

الفصيلة العلاجية: قرین الهاستامين

٢) قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال المستحضر إذا:

* إذا كنت مسالساً لل المادة الفعالة أو لكل واحد من مركبات الدواء

(انظر التفصيل في الفقرة ٦).

* إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع نتيجة ورم في الغدة الكظرية

(ورم خلايا الكروماتين القاتمة - pheochromocytoma).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

* إذا كنت حساساً لاي طعام أو لاي دواء، عليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.

* لدى مرضى الربو يتطلب إجراء مراقبة طبية أثناء العلاج

ببيتاهاستين.

* يحتوى المستحضر لاكتوز وقد يسبب الحساسية لدى أشخاص لديهم حساسية للاكتوز.

٣) قبل العلاج ببيتاهاستين تيقع ١٦ ملغم احق للطبيب إذا:

• إذا كنت حالماً، تخططين للحمل أو مرضة.

• إذا كنت تعاني أو عانت في الماضي من خلل في وظيفة جهاز التنفس (مثل الربو) أو جهاز الهضم (مثل قرحة).

• إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إشك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية:

* أدوية مضادة للهيستامين - قد تقلل هذه الأدوية من تاثير بيتاهاستين تيقع، كذلك، قد يقلل بيتاهاستين تيقع من تاثير الأدوية المضادة للهيستامين.

* مثبطة موتامين - أو كوسيدار (MAOIs) - لعلاج الاكتئاب أو الباركيتوسون - قد تزيد هذه الأدوية من تاثير بيتاهاستين تيقع.

• استعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء مع أو بدون وجبة طعام.

• استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

يمكن شرب النبيذ أو المشروبات الروحية في فترة العلاج بالدواء.

• الحمل والإرضاع:

لا يجوز تناول الدواء إذا كنت حامل، إلا إذا قرر الطبيب بأن هذا ضروري

قطعًا. يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز الإرضاع خلال استعمال الدواء، إلا إذا أوحى الطبيب بشيء

مغاير. من غير المعروف فيما إذا كان يمكن الدواء إلى حليب الأم.

• السياقة واستعمال الماكولات:

لا يتوقع أن يمس تناول هذا الدواء بالقدرة على القيادة أو تشغيل ماكولات. على الرغم من ذلك، يجب التذكر، أن الأمراض التي من أجلها يتم تناول بيتاهاستين قد تسبب الدوخة أو الغثيان، والتي قد تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الماكولات.

• معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء ١٤٠ ملغم اكتوز.

• كيفية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

عليك الاستیضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة، كما حدد من قبل الطبيب

المعالج.

من الجائز أن يستترق الأمر وقتاً حتى تشعر بتاثير الأقراص.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الإعتنادية عادة هي:

قرص واحد ثلاث مرات في اليوم.

الهضم مثل تقيؤات، ألم بطن وانتفاخ في البطن.
إن تناول الدواء مع الوجبة يمكن أن يقلل الأعراض الجانبية التي تتعلق بجهاز الهضم.
إذا ثقافت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

قد يقلل الطبيب الجرعة لنصف قرص ثلاث مرات في اليوم.
لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.
هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأة دون عمر ١٨ سنة.
لا يجوز المضي، يجب بل الاقرار مع ماء.
يمكن شطر القرص من خلال خط الشطر.

فحوصات ومتابعة

يتوجب القيام بمتابعة طبية لدى مرضاً الربو أثناء العلاج به بيتاھيستين.

إذا ثناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر

إذا ثناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى المستشفى وأحضر عليه الدواء محل.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

اعراض جانبية ممكنة لفرط الجرعة - غثيان، نعاس أو ألام في البطن.

إذا ثنيست تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة، خذ الجرعة التالية في الوقت المعتمد واستشر الطبيب.

يجب المراقبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا تتناول أدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول استخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن استعمال بيتاھيستين تيقن ١٦ ملغم قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز إلا تعاني أيا منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا:

إذا كنت تعاني من ردود فعل اليرجية مثل:

* انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو العنق، التي قد تسبب صعوبات في التنفس.

* طفح جلدي أحمر، جلد ملتهب وحاش.

اعراض جانبية إضافية:

تظهر في أوقات متقاربة (تتوتر على أقل من ١٠ من بين ١٠ معالجين):
غثيان، صعوبات في الهضم، صداع.

تشير بوتيرة غير معروفة: حكة، طفح، اضطرابات مختلة في جهاز

- ٥) كيفية تخزين الدواء؟
• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً منتناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/ أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
 - يجب التخزين في مكان جاف، دون ٢٥ درجة مئوية.
يجب حفظ الدواء في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.
 - لا يجوز رمي الأدوية في النفايات. إسال الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الاستعمال. هذه الوسائل سوف تساعد في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا:
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose,
Crosovidone, Stearic acid, Colloidal silica anhydrous,
Povidone K90.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
شكل القرص: قرص مدور، بلون أبيض حتى شبه أبيض، يظهر على أحد جانبيه B16 ومن الجانب الآخر خط شطر.
تحتوي العلبة ٢٠ قرصاً.
- صاحب الإمتياز وعنوانه: أبيك للتسويق م.ض، ص.ب، ٨٧٧٧
تنانيا.
- المنتج وعنوانه: ديسفار إنترناشيونال بي.في، هنجلو،
هولندا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
١٥٠ ٢٤ ٣٣٧٥٨ ..
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها قمح ورّخص
في توزيع ٢٠١٢.
- من أجل سهولة وتهوير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.