

**أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة**
**ومحتواها فحص ورُخص من قبلها**

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة**

**(مستحضرات) - ١٩٨٦**

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ

**كبسولات**

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل كبسولة على:

دولوكسيتين ٣٠ ملغ (as HCl) Duloxetine 30 mg

## دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ

**كبسولات**

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل كبسولة على:

دولوكسيتين ٦٠ ملغ (as HCl) Duloxetine 60 mg

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦.

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأطفال. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

### ١) لأي غرض مخصص الدواء؟

• الدواء مخصص لمعالجة الإكتئاب، معالجة ألم الاعتلال العصبي المرتبط بالإعتلال العصبي السكري المحيطي، معالجة القلق العام، معالجة الألم العضلي الليفي ومعالجة الألم العضلي المزمن إذا لم يكن بالإمكان إعطاء علاج آخر أو فشل علاج سابق.

**الفصيلة العلاجية:** من مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين والنورإبينفرين (SNRIs).

### ٢) قبل إستعمال الدواء:

<div><div><div><span><b>X</b></span> لا يجوز إستعمال المستحضر إذا:</div></div></div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>• كنت حساسا ل دولوكسيتين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦).</li><li>• كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبد أو من مرض كلوي شديد.</li><li>• كنت تتناول أدوية أخرى تحوي دولوكسيتين.</li><li>• لا يجوز إستعمال هذا الدواء بالتزامن أو خلال ١٤ يوماً بعد إعطاء أدوية لعلاج الإكتئاب من نوع مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs).</li><li>• لا يجوز البدء بتناول أدوية لعلاج الإكتئاب من نوع MAOIs، إذا لم تضي ٥ أيام على الأقل منذ التوقف عن العلاج بدولوكسيتين DR تيفع.</li><li>• لا يجوز إستعمال هذا الدواء بالتزامن مع فلووفوكسامين لمعالجة الإكتئاب؛ مضادات حيوية من نوع الكوينولونات مثل سيبروفلوكساسين أو أونوكساسين؛ تيوريدازين.</li><li>• لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت تعاني من جلوكوما غير مسيطر عليها من نوع ضيقة الزاوية.</li></ul></div>

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:**

• هذا الدواء غير مخصص للإستعمال عادة لدى أطفال ومراهقين دون عمر ١٨. على الرغم من ذلك، يمكن لطبيبك أن يصف لك هذا الدواء، حتى ولو كنت دون عمر ١٨ سنة، عندما يعتقد أن هذا المصلحتك. إذا وصف لك الطبيب هذا الدواء وكنت ترغب بالتحدث مع - راجع الطبيب ثانية. عليك أن تعرف أنه لدى معالجين دون عمر ١٨ سنة هناك خطورة زائدة لظهور أعراض جانبية مثل: إنتحار، أفكار إنتحارية وعدائية (خاصة عدوانية، غضب ومقاومة) وذلك عند تناول دواء من هذا النوع. كما أنه، لا توجد معطيات حول التأثيرات طويلة المدى بالنسبة لسلامة الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين من حيث النمو والتطور، المرافقة، التصرف الإدراكي والتطور السلوكي.

• إن الإكتئاب والإضطرابات النفسية الخطيرة الإضافية تعرف بأنها من العوامل الأكثر خطورة للإنتحار. لدى بعض الأطفال، المراهقين والكبار الفتية (دون عمر ٢٥ سنة) والذين تناولوا أدوية مضادة للإكتئاب، لوحظت زيادة في الأفكار والتصرفات الإنتحارية، خاصة عند بداية العلاج. يوصى على المعالجين وأفراد عائلتهم أن يراقبوا ويتابعوا والتغيرات في المزاج والسلوك مثل: زيادة الإكتئاب أو القلق و/أو ظهور أفكار إنتحارية، قلة الراحة، عدوانية أو إضطرابات في النوم، خاصة عند بداية العلاج أو عند تغيير المقدار الدوائي. إذا طرأت مثل هذه التغيرات يجب التوجه إلى الطبيب حالا. **يجب الحرص الزائد على هذه التوصية لدى المعالجين الفتية من أعمار ١٨ - ٢٤ سنة.**

• **لا يجوز التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجيء بدون إستشارة الطبيب.**

### 1) قبل العلاج بدولوكسيتين DR تيفع إحك لطبيبك إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من هوس أو من إضطراب عاطفي ثنائي القطب و/أو من إختلاجات.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب و/أو إرتفاع ضغط الدم - لدى هؤلاء المرضى يوصى بمراقبة ضغط الدم قبل بدء العلاج وخالاه: العينين (مثل جلوكوما - إرتفاع الضغط داخل العين)؛ الكبد أو إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول- إن الإستهلاك الزائد للكحول بالتزامن لتناول دولوكسيتين قد يسبب الضرر للكبد؛ الكلية/ المسالك البولية.
- لديك سابقة لانزفة (ميول لتطوير كدمات).
- كنت معرضاً لتناول الأدوية حدوث إنخفاض نسب الصوديوم (مثلاً: إذا كنت تتناول المدرات البولية، خاصة إذا كنت مسناً).
- كنت تتعالج بأدوية أخرى التي قد تسبب الضرر للكبد أو إذا كنت تتناول دواء آخر لعلاج الإكتئاب.
- كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل أو مرضعة.
- كنت تتناول نبات الهيبيريكوم (St. John’s Wort).

### 1) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى تحوي دولوكسيتين - يجب الإمتناع عن تناولها بالتزامن مع دولوكسيتين DR تيفع.
- أدوية تسبب الميل للنوم/النعاس، بما في ذلك: أدوية مهدئة (مثل: بنزوديازيبينات)، مسكنات الألم القوية، مضادات الذهان (مثل: سيميبريدسون)، فينوباربيتال ومضادات الهيستامين.
- فينوتيازينات.
- سيميثيدين.
- أدوية ترفع نسبة السيروتونين: أدوية من فصيلة تريبتان (لعلاج الشقيقة)، ترامادول، تريبثوفان (حمض أميني يوجد في الأطعمة، محاليل التسريب الغذائية والإضافات الغذائية)، أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مضادات الإكتئاب: أدوية من نوع SSRI (مثل: پاروكستين، فلوأوكسيتين، فلووفوكسامين)، أدوية من نوع SNRIs (مثل: فينلافكسين)، أدوية من نوع مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) (مثل: موكلوبيميد ولينزوليد)، مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة (مثل: نورترېپتيلين، إيمتريبتيلين، إيميبرامين، ديسيبرامين، كلوميبرامين)، بتيدين، نبات الهيبيريكوم (St. John’s Wort). هذه الأدوية تزيد من خطورة حدوث أعراض جانبية، من ضمنها متلازمة السيروتونين (أنظر الفقرة ٤ - الأعراض الجانبية).
- المدرات البولية، قليكائينيد، پروپايفينون (لعلاج إضطرابات نظم القلب)، كوينيدين، ليتيوم.
- مضادات تخثر الدم (مثل: أرفارفين).
- مضادات الإنتهاب اللاستيرويدية (SNAIDS) مثل: أسبريرين (الذي يحوي حمض أسيتيل ساليسيليك).

يجب إبلاغ الطبيب عن كل دواء إضافي تتناوله.

### 1) إستعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول الدواء بدون علاقة لأوقات الوجبات، أي مع أو بدون طعام.

### 1) إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز إستهلاك الكحول بكمية كبيرة بالتزامن لتناول دولوكسيتين DR تيفع نظرا لأن هذا الأمر قد يلحق الضرر بالكبد.

### 1) الحمل والإرضاع:

إذا كنت في فترة الحمل، أو تخططين للحمل، يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء. يجب إستعمال هذا الدواء فقط بعد أن قرر الطبيب بأن الفائدة تزيد عن الخطورة. يجب التأكد من أن المولدة و/أو طبيبك يعلمان بأنك تتناولين دولوكسيتين DR تيفع. عند تناول أدوية مشابهة ل (SSRIs) أثناء الحمل، فهي قد تزيد من خطورة حدوث حالة طبية خطيرة لدى المولود تسمى فرط ضغط الدم الرئوي المستمر للمولود (PPHN)، التي تسبب للرضع ضغط النفس بشكل أسرع وتحول لون جلده للأزرق. هذه الأعراض تظهر على الأغلب خلال ٢٤ ساعة الأولى التي تلي ولادة الرضيع. إذا حدث هذا الأمر لرضيعك يجب التوجه حالا إلى المولدة و/أو لطبيبك.

في حال إستعمالك لهذا الدواء قريبا لموعد الولادة، فمن الجائز أن تحدث لرضيعك أعراض جانبية عند ولادته. تبدأ الأعراض عادة عند الولادة أو خلال عدة أيام التي تليها. من الجائز أن تشمل هذه الأعراض: إرتخاء العضلات، رجفان، نعاس، إبطاء غير طبيعي، مشاكل في التنفس وتشنجات. إذا حدثت إحدى هذه الأعراض الجانبية لرضيعك عند ولادته، أو إذا كنت قلقة بالنسبة لصحة الرضيع، إستشيري الطبيب/ المولدة.

بلغي الطبيب إذا كنت مرضعة وإستشيريهِ حول إستعمال الدواء. إن إستعمال هذا الدواء أثناء فترة الرضاعة غير موصى به.

### 1) السيقاة وإستعمال الماكنات:

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من اليقظة ولذلك يلزم الحذر أثناء سيقاة المركبات، تشغيل ماكنات خطرة وبأي نشاط يتطلب اليقظة. يفضل الإمتناع عن القيام بتلك النشاطات حتى يتضح تأثير الدواء عليك.

### 1) معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- بالنسبة ل دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ:

يحتوي دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ على سكر (حتى ١٠١ ملغ سكروز).

يحتوي دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ نحو ٠,٠٤ ملغ صوديوم.

يحتوي دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ نحو ١٠,٦٢ ملغ كبتوز مونيوكسيلات.

- بالنسبة ل دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ:

يحتوي دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ على سكر (حتى ٢٠٢ ملغ سكروز).

يحتوي دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ نحو ٠,٠٨ ملغ صوديوم.

يحتوي دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ نحو ٢١,٢٤ ملغ كبتوز مونيوكسيلات.

## ٣) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

**المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:**

لمعالجة الإكتئاب أو ألم الاعتلال العصبي المتعلق بالإعتلال العصبي السكري المحيطي:

٦٠ ملغ مرة في اليوم، لكن يصف الطبيب الجرعة الملائمة بالنسبة لك.

لمعالجة القلق العام:

يبدأ الدوائي الإبتدائي هو ٣٠ ملغ مرة في اليوم وبعد فترة معينة فإن غالبية المرضى يتلقون ٦٠ ملغ مرة في اليوم، ولكن يصف الطبيب الجرعة الملائمة بالنسبة لك. بالإمكان تغيير الجرعة حتى ١٢٠ ملغ لليوم، وذلك حسب إستجابتك للدواء.

**لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.**

يجب بلع الدواء بالكامل مع القليل من مشروب. لا يجوز مضغ أو سحق محتوى الكبسولة.

إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر فعليك الإتصال حالا بالطبيب أو بالصيدلي الخاص بك. أعراض فرط الجرعة يمكن أن تشمل النعاس، السبات، متلازمة السيروتونين (رد فعل نادر، أنظر الفقرة ٤ - الأعراض الجانبية)، تشنجات، تقيؤ وتسرع نظم القلب. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالا إلى الطبيب أو للمستشفى، وأحضر معك علبة الدواء.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

### يتبع

تتمّة

**إذا نسبت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول جرعة حال تذكرك.** إذا حان موعد تناول الجرعة القادمة، فسيتم الجرعة المنسية وتتناول جرعة واحدة فقط.

لا يجوز تناول جرعتين معاً للتعويض عن الجرعة المنسية! في يوم معين، لا يجوز تناول جرعة من دولوكسيتين DR تيفع أكبر من الجرعة اليومية التي وصفت من أجلك. يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب. على الأغلب، يظهر تأثير العلاج الدوائي بدولوكسيتين DR تيفع بعد ٢-٤ أسابيع على العلاج. إنك لم يطرأ تحسن على حالتك بعد هذا الزمن قم بإطلاع طبيبك بذلك.

من الجائز أن يستمر الطبيب بوصف هذا الدواء لك حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، وذلك لتجنب عودة الإكتئاب أو القلق.

من الجائز أن يظهر تأثير العلاج الدوائي في ألم الاعتلال العصبي المتعلق بالإعتلال العصبي السكري بعد عدة أسابيع. إنك لم يطرأ تحسن على حالتك بعد شهرين قم بإطلاع طبيبك بذلك.

لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إذا كان الطبيب يعتقد بأنه لا حاجة بعد بمواصلة تناول الدواء، فيجب تخفيض المقدار الدوائي بشكل تدريجي خلال أسبوعين على الأقل قبل التوقف عن تناول الدواء. لقد ظهرت أعراض جانبية لدى بعض المرضى الذين توقفوا عن إستعمال الدواء بشكل مفاجئ مثل: دوار، الشعور بوخز/نخز أو الشعور بما يشبه صدمة كهربائية (خاصة في الرأس)، إضطرابات في النوم (أحلام ملموسة، كوابيس، عدم القدرة على النوم)، إرهاق، نعاس، قلة راحة/عصبية، الشعور بقلق، غثيان أو تقيؤ، رجفان، صداع، ألم في العضلات، الشعور بسخظ، إسهال، تعرق زائد أو فيرتيغو (ترنح). هذه الأعراض هي ليست خطيرة وتزول على الأغلب بعد عدة أيام، ولكن إذا كنت تشعر بأن الأعراض الجانبية تزعبك، إستشِر الطبيب.

- لا تتناول الأدوية في العتمّة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال دولوكسيتين DR تيفع قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. هذه الأعراض هي خفيفة حتى معتدلة وتزول عادة بعد عدة أسابيع.

**تظهر في أوقات متقاربة جداً (من الجائز أن تؤثر على أكثر من ١ من بين ١٠ معالجين):**

- صداع، الميل للنوم

- غثيان

- جفاف الفم

**تظهر في أوقات متقاربة (من الجائز أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠ معالجين):**

- قلة الشهية للطعام

- صعوبة النوم، عصبية، تناقص الرغبة الجنسية، قلق، صعوبة أو فشل في تحقيق نشوة جنسية، أحلام غير عادية

- دوار، الشعور بإرتخاء، رجفان، الشعور بتململ، الشعور بوخز/نخز في الجلد
- تشوش الرؤية، طنين في الأذنين
- ضربات قلب قوية
- إرتفاع ضغط الدم، تورد وهبات من الحر
- تتأوب

- إمساك، إسهال، ألم في البطن، تقيؤات، حرقان أو إضطرابات في الجهاز الهضمي
- تعرق زائد، طفح
- ألم في العضلات، تقلصات عضلية
- ألم أثناء التبول، زيادة وتيرة التبول
- مشاكل في تحقيق إنتصاب القضيب، تغيرات في قذف السائل المنوي
- سقوطات (خاصة لدى المسنين)، إرهاق
- تناقص الوزن. لقد حصل إنخفاض معين في الوزن لدى أطفال ومراهقين دون عمر ١٨ سنة المعالجين بالدواء بسبب الإكتئاب، وذلك عند بداية تناول الدواء. لقد تساوى الوزن بعد ٦ أشهر علاجية لوزن الأطفال والمراهقين الذين بأعمارهم.
- غازات

**تظهر في أوقات متباعدة (من الجائز أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠٠ معالجين):**

- إلتهاب الحنجرة الذي قد يؤدي إلى بحة في الصوت
- أفكار إنتحارية، صعوبة النوم، تكزز الأسنان، الشعور بتوابع في الخلاء، قلة الحوافز
- تشنجات عضلية لا إرادية، الشعور بقلة راحة أو عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف في مكان واحد، الشعور بعصبية، صعوبة في التركيز، تغيرات في حاسة المذاق، صعوبة السيطرة على الحركات، تدني جودة النوم
- توسع الحدقتين، مشاكل في الرؤية
- الشعور بدوار أو ترنح (فيرتيغو)، ألم في الأذن
- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة
- إغماء، دوار، إغماء أو دوار أثناء النهوض، برودة الأصابع
- إنزعاج في الحنجرة (throat tightness)، رعاف
- التقيؤ دموي أو براز أسود، إلتهاب المعدة، تجشؤ، صعوبة في البلع
- إلتهاب الكبد الذي قد يسبب ألم في البطن وإصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين - راجع الطبيب حالا!
- تعرق ليلى، شرى، تعرق بارد، حساسية لضوء الشمس، ميل زائد لحدوث كدمات
- تورد العضلات، تشنجات عضلية
- صعوبة أو عدم القدرة على التبول، صعوبة في بدء التبول، الحاجة للتبول أثناء الليل، الحاجة للتبول أكثر من المعتاد، تناقص جريان البول
- نزف مهبطي غير عادي، طمخ مختلف عن المعتاد (نزف شديد أو خفيف، مؤلم، غير منتظم أو متواصل)، ألم في الحصى أو في كيس الحصى
- ألم في الصدر، الشعور ببرودة، الشعور بعطش، قشعريرة، الشعور بسخونة، مشي غير عادي
- زيادة في الوزن
- ارتفاع نسب في الدم ل: إنزيمات الكبد، اليوتاسيوم، كرياتين فوسفوكيناز، السكر، الكوليسترول، راجع الطبيب حالا!

**تظهر في أوقات نادرة (من الجائز أن تؤثر على حتى ١ من بين ١٠٠٠ معالجين):**

- رد فعل تحسسي خطير الذي يسبب صعوبة في التنفس أو دوار يترافق بإنفتاح اللسان أو الشفتين
- تناقص نشاط الغدة الدرقية الذي قد يسبب الإرهاق أو زيادة الوزن
- جفاف، إنخفاض نسب الصوديوم في الدم (خاصة لدى الإعراض يمكن أن تشمل: دوار، ضعف، إرتباك، نعاس/إرهاق، غثيان، تقيؤات، إغماءات، تقلصات، سقوطات، صداع، صعوبة في التركيز، مشاكل في الذاكرة، هذيان، سبات، توقف للتنفس) - راجع الطبيب حالا! إفراز شاذ للهورمون المضاد للإدرار (SIADH)
- سلوك إنتحاري، هوس، هذيان، عدوانية وغضب
- متلازمة السيروتونين - رد فعل قد يسبب تغيرات في الحالة النفسية (عصبية، هذيان، سبات)، عدم إستقرار ذاتي (نبض سريع، ضغط دم غير ثابت، دوار، تعرق زائد، تورد، إرتفاع حرارة الجسم)، مشاكل عضلية عصبية (رجفان، تصلب، تشنجات في العضلات، زيادة المنعكسات، قلة الإستيقاظ) و/أو أعراض في الجهاز الهضمي (غثيان، تقيؤ، إسهال) وكذلك الشعور بفرح مفرط، نعاس، ثقاقل المشي، الشعور بالثأمة، تعرق - راجع الطبيب حالا!
- إرتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما)
- إلتهاب الفم، براز مع دم بلون أحمر، رائحة كريهة من الفم
- قصور كبدى، إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العين، (يرقان) - راجع الطبيب حالا!
- متلازمة ستيفن جونسون (مرض خطير يترافق بحويصلات في الجلد، في الفم، في العينين وفي الأعضاء التناسلية)، رد فعل تحسسي خطير يسبب إنتفاح الوجه أو الحنجرة - راجع الطبيب حالا!
- تقلص عضلات الفك
- رائحة غير عادية للبول
- أعراض سن اليأس، إنتاج شاذ لحليب الأم

**أعراض جانبية إضافية تمت ملاحظتها:**

- آلام في الظهر، رشح، إلتهاب الطرق التنفسية العليا، إنفلوانزا، سعال، ألم في البلعوم، تناقص حاد في ضغط الدم عند الإنتقال من وضعية الإستلقاء إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الوقوف (خاصة عند بداية العلاج أو بعد رفع المقدار الدوائي)
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا ثقافتك إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب حلالاً.

### ٥) كيفية تخزين الدواء؟

- **تجنّب التسمّم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى الميول الأظھر من نفى الشهر. في حال الشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- يجب التخزين في مكان جاف، بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.
- لا يجوز تخزين أدوية مختلفة بنفس العبوة.

### ٦) معلومات إضافية:

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ:

Sugar spheres (up to 183 mg sucrose), Gelatin, Talc extra fine, Hypromellose phthalate, Hypromellose 3cP, Lactose monohydrate (21.24 mg), Sucrose (19 mg), Talc, Povidone, Triethyl citrate, Hypromellose (Pharmacoat 603), Hypromellose (Pharmacoat 606), Titanium dioxide, Colloidal silicon dioxide, Sodium lauryl sulfate (0.08 mg sodium), Brilliant blue FCF – FD&C blue 1, FD&C green 3, D&C yellow 10, Imprinting ink black.

دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ:

Sugar spheres (up to 91.5 mg sucrose), Gelatin, Talc extra fine, Hypromellose phthalate, Hypromellose 3cP, Lactose monohydrate (10.62 mg), Sucrose (9.5 mg), Talc, Povidone, Triethyl citrate, Hypromellose (Pharmacoat 603), Triethyl citrate, Hypromellose (Pharmacoat 606), Colloidal silicon dioxide, Sodium lauryl sulfate (0.04 mg sodium), Brilliant blue FCF – FD&C blue 1, Imprinting ink black.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوئ العلبه:

تحتوي الكبسولات على حبيبات دولوكسيتين هيدروكلوريد المطلية بطلاء معوي يحميها من حموضة عصائر المعدة ويمنع تفككها في المعدة.

كبسولات ال ٦٠ ملغ هي بالوان أخضر فاتح وأزرق فاتح وأبيض مطبوع عليها الرمz «TEVA» والرمz «7544»، الرمز «TEVA» بما يتناسب.

كبسولات ال ٣٠ ملغ هي بالوان أزرق فاتح وأبيض مطبوع عليها الرمz «TEVA» والرمz «7543»، بما يتناسب. تحتوي عبءة دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ وكذلك عبءة دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ على ٣٠ كبسولة.

- صاحب الإمتياز وعنوانه: تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ص، ص.ب ٣١٩٠، بيتح - تكفا.

**رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

دولوكسيتين DR تيفع ٣٠ ملغ:

٠٠١/٠١/٢٠٠٠-٢٣٨٠-٥٩-١٥١

دولوكسيتين DR تيفع ٦٠ ملغ:

٠٠١/٠١/٢٠٠٠-٣٣٧٧٨-٦٠-١٥١

- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في آذار ٢٠١٤.

من أجل سهولة وتهوون القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.