

פורטס עלון זה נקבע ע"י משדר הבריאות

ותוכנו נבדק ואושר על ידו

עלון לצרכן לפי תקנת הרוקחים

[תכשירים] התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג כמוסות

החומר הפעיל וכמותו:

כל כמוסה מכילה:

דולוקסטין 30 מ"ג Duloxetine 30 mg (as HCl)

דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג כמוסות

החומר הפעיל וכמותו:

כל כמוסה מכילה:

דולוקסטין 60 מ"ג Duloxetine 60 mg (as HCl)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

• התרופה מיועדת לטיפול בדיכאון, טיפול בכאב נירופטי הקשור לנוירופתיה סוכרתית היקפית, טיפול בחרדה כללית, טיפול בפברומיאלגיה וטיפול בכאב שרירים כרוני במידה ולא ניתן לתת טיפול אחר או שטיפול קודם נכשל.

קבוצה תרופטית:

מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין ונוראפינפרין (SNRIs).

2. לפני שימוש בתרופה:

לא אין להשתמש בתכשיר אם:

- הנך רגיש לדולוקסטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- הנך סובל מליקוי בתפקוד הכבד או ממחלת כלית חמורה.
- הנך נוטל תרופות אחרות המכילות דולוקסטין.
- אין להשתמש בתרופה זו בו-זמנית או תוך 14 יום לאחר מתן תרופות לטיפול בדיכאון מסוג מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs).
- אין להתחיל נטילת תרופות לטיפול בדיכאון מסוג MAOIs, אם לא עברו לפחות 5 ימים מזמן הפסקת הטיפול בדולוקסטין DR טבע®.
- אין להשתמש בתרופה זו בו-זמנית עם פלובקסאמן לטיפול בדיכאון; אנטיביוטיקות מסוג קווינולונים כגון ציפרופלוקסאצין או אנוקסאצין; תיורדאזין.
- אין להשתמש בתרופה זו אם הנך סובל מגלאוקומה מסוג זויזת צרה שאינה נשלטת.

אזהרות וחידות שניתנות לשימוש בתרופה:

• תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18. למרות זאת, הרופא שלך יכול לרשום לך תרופה זו, גם אם הנך מתחת לגיל 18, כאשר הוא חושב שזה לטובתך. אם הרופא רשם לך תרופה זו ואתה מעונין לשוחח איתו - פנה חזרה לרופא. עלִיך לעתה כי בקרב מטופלים מתחת לגיל 18 יש סיכון מוגבר להופעה של תופעות לוואי כגון: התאבדות, מחשבות אובדניות ועיונות (בעיקר אגרסיביות, כעס והתנגדות) בלקחת תרופה מסוג זה כמו כן, אין נתונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט הבטיחות ביחס לגדילה והתפתחות התגרות, התנהגות קוגניטיבית והתפתחות התנהגותית בילדים ובמתבגרים.

• דיכאון והפרעות פסיכיאטריות חמורות נוספות ידועים כגורמי הסיכון הגבוהים ביותר לאובדנות. בחלק מהילדים, המתבגרים והבוגרים הצעירים (מתחת לגיל 25 שנים) אשר לקחו תרופות נגד דיכאון, נצפתה עלייה במחשבות ובמעשים אובדניים, בעיקר בתחילת הטיפול.

מומלץ כי המטופלים ו בני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים במצב הרוח ובהתנהגות כגון: הגברת הדיכאון או החרדה ו/או הופעה של מחשבות אובדניות, חוסר מנוחה, תופעות או הפרעות בשינה, במיוחד בתחילת הטיפול או כאשר המינון משתנה. במידה וחלו שינויים כגון אלה, יש לפנות מיידית לרופא. **יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגילאי 18–24.**

• **אין להפסיק את נטילת התרופה באופן פתאומי בלי להיוועץ ברופא.**

Ⓜ לפני הטיפול בדולוקסטין DR טבע® ספר לרופא אם:

• אתה סובל או סבלת בעבר ממגיה או מהפרעה אפקטיבית דו-קוטבית ו/או פרכוסים.

- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או לחץ דם גבוה - בחולים אלו מומלץ לעקוב אחר לחץ הדם לפני תחילת הטיפול ובמהלכו; העיניים (כגון גלאוקומה - לחץ תוך עיני מוגבר); הכבד או באם הנך צורך כמויות גבוהות של אלכוהול - צריכת אלכוהול גבוהה במקביל לנטילת דולוקסטין עלולה להזיק לכבד; הכליה/מערכת השתן.
- יש לך היסטוריה של דימומים (נטיה לפתח תבורות).

• אתה בסיכון של רמות נתרן נמוכות (לדוגמא: אם אתה נוטל משתנים, במיוחד אם אתה קשיש).

• אתה מטופל בתרופה אחרת העלולה לגרום לפגיעה בכבד או שאתה נוטל תרופה אחרת לטיפול בדיכאון.

• את בהריון או מתכוונת להיכנס להריון או מינקת.

• אתה נוטל את צמח ההיפריקום (St. John's Wort).

Ⓜ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את

הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות אחרות המכילות דולוקסטין - יש להימנע מנטילת בו-זמנית עם דולוקסטין DR טבע®.
- תרופות הנוגעות לישנוניות/נרמנות, כולל: תרופות להרעה (כגון: בנזודיאזפינס, תרופות לשיכון כאבים חזקים, תרופות אנטיפסיכוטיות (כגון: ריספרידון), פנוברביטל ואנטיהיסטמינים.
- פנטאימינים.
- סימטדין.

• תרופות המעלות את רמת הסרוטונין: תרופות ממשפחת הסריפטינים (לטיפול במיגרנה), טרמדול, טריפטופאן (חומצה אמינית המופיעה במזונות, תמיסת עזרי להגנה ותוספי מזון, תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית, תרופות לטיפול בדיכאון; תרופות מסוג SSRIs (כגון: פארוקסטין, פלואוקסטין, פלובוקסאמין), תרופות מסוג SNRIs (כגון: גלאפקסין), תרופות מסוג מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs) (כגון: מוקלובמיד ולמולד), נוגדי דיכאון טריציקלים (כגון: נורטריפטילין, אמטרפטילין, אימיפראמין, דיפראמין, סלומיפראמין, פתדין, צמח ההיפריקום (St. John's Wort). תרופות אלו מגבירות את הסיכון לתופעות לוואי, ביניהן סינדרום סרוטונין (ראה סעיף 4 - תופעות לוואי).

• משתנים, פלקאניד, פרופפנון (לטיפול בהפרעות קצב), קווינידין, ליתיום.

• תרופות נגד קרישת דם (כגון: וורפרין).

• תרופות מגדות דלקת שאינן סטרואידליות (NSAIDs) כגון: אספירין (המכיל חומצה אצטילסליצילית).

יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שהנך נוטל.

Ⓜ שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול את התרופה ללא קשר לזמני הארוחה, כלומר עם או ללא מזון.

Ⓜ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לצרוך אלכוהול בכמות גדולה במקביל לנטילת דולוקסטין DR טבע® כיוון שזה עלול להזיק לכבד.

Ⓜ הריון והנקה:

אם הנך בהריון או מתכננת הריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. יש להשתמש בתרופה זו רק לאחר שרופא המליץ כי התועלת עולה על הסיכון. יש לוודא כי ההפיליות ו/או התופעות שלך ידועים מאת נטילת דולוקסטין DR טבע®. כאשר תרופות דומות (SSRIs) נלקחות בזמן ההריון, הן עלולות להעלות את הסיכון למצב רפואי חמור בתינוקות הקרוי יתר לחץ דם יראתי מתמשך מהר יותר ובלבד עורול להיות כחלחל. לתינוק נלשום מהר יותר וצבע עורול להיות כחלחל. תסמינים אלו מופיעים לרוב כ-24 השעות האחרונות שלאחר לידת התינוק. במידה וזה קורה לתינוקר יש לפנות למיילדת ו/או לרופא שלך מיד.

אם הנך משתמשת בתרופה זו בסמוך למועד הלידה, יתכן שלתינוקר יהיו תופעות לוואי כשיוולד. התופעות מתחילות בתוך ככל בלדיה או במהלך מספר הימים שלאחריה. יתכן שהתופעות הללו יכללו: רפיון שרירים, רעידות, עצבנות, האכלה לא תקינה, בעיות בנשימה ועיוותות. אם לתינוקר יש אחת מתופעות לוואי אלו כאשר נוול, או שאת מודאגת לגבי בריאות התינוק, היוועצי ברופא/במיילדת.

ספרי לרופא אם הנך מניקה והתייעצי עמו לגבי השימוש בתרופה. השימוש בתרופה זו בזמן ההנקה אינו מומלץ.

Ⓜ נהיגה ושימוש במכונית:

השימוש בתרופה זו עלול לפגוע בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בלפעול במכונית ומסוכנות וחבל פעילות המיחייבת ערנות. רצוי להימנע מפעילויות אלה עד שתתברר השפעת התרופה עליך.

Ⓜ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

• **לגבי דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג:**

דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג מכיל סוכר (עד 101 מ"ג סוכרוז).

דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג מכיל כ- 0.04 מ"ג סודיום.

דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג מכיל כ- 10.62 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

• **לגבי דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג:**

דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג מכיל סוכר (עד 202 מ"ג סוכרוז).

דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג מכיל כ- 0.08 מ"ג סודיום.

דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג מכיל כ- 21.24 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

• תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

לטיפול בדיכאון או בכאב נירופטי הקשור לנוירופתיה סוכרתית היקפית:

60 מ"ג פעם ביום, אך הרופא ירשום את המנה המתאימה עבורך.

לטיפול בחרדה כללית:

המינון התחלתי יהיו 30 מ"ג פעם ביום ולאחר זמן מסוים רוב החולים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום, אך הרופא ירשום את המנה המתאימה עבורך. בהתבסס על תגובתך לתרופה, ניתן יהיה לשנות את המנה עד ל-120 מ"ג ליום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבלוע את התרופה בשלמותה עם מעט שתיה. אין ללעוס או לכתוש את תכולת הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלִיך להתקשר מיד לרופא או לרוקח שלך. התסמינים של מינון יתר יכולים לגרום לחרדה, רגשות יציבים, סינדרום סרוטונין (תלומב נזילה, שאנוניות, תרדמת, סינדרום סרוטונין ונטייה נזירה, רגישות, פירוק - תופעות לוואי), עיוותות, הקאה וקצב לב מהיר.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אם שחכת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מיד כשזכרכת. אם כבר הגיע מועד נטילת המנה הבאה, וותר על המנה שששכחה וקח רק מנה אחת. אין ליטול שתי מנות יחד על מנת לפצות על מנה שנשכחת! אין ליטול מנה גדולה יותר מהמנה הימנית של דולוקסטין DR טבע® שנרשמה עבורך, ביום מסוים. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

לרוב, השפעות הטיפול התרופתי בדולוקסטין DR טבע® ניכרת לאחר 4-2 שבועות של טיפול. אם לא חל שיפור במצבך לאחר זמן זה עדכן את הרופא שלך. גם אם חל שיפור במצב בריאותך יתכן שהרופא ימשיך לרשום לך תרופה זו כדי למנוע את חזרת הדיכאון או החרדה.

יתכן שהשפעת הטיפול התרופתי בכאב נירופטי הקשור לנוירופתיה סוכרתית תהיה ניכרת לאחר כמה שבועות. אם לא חל שיפור במצבך לאחר חודשיים עדכן את הרופא שלך.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח. במקרה שהרופא חושב כי אין עוד צורך שתמשיך בנטילת התרופה, יש להוריד את המינון בהדרגה לפחות במשך שבועיים לפני הפסקת נטילת התרופה. בקרב חלק מהחולים שהפסיקו את השימוש בתרופה באופן פתאומי הופיעו תופעות לוואי כגון: סחרחורת, תחושת עקצוץ/דקירה או תחושה של מעין שוק חשמלי (בעיקר בראש), הפרעות בשינה (חלומות מוחשיים, סיוטים, חוסר יכולת לישון), עייפות, ישנוניות, חוסר מנוחה/עצבנות, תחושת חרדה, בחילה או הקאה, רעד, כאבי ראש, כאב שרירים, תחושת רוגז, שלשול, הזעת יתר או ורטיגו. סימפטומים אלו אינם חמורים ולרוב נעלמים לאחר מספר ימים, אולם אם אתה מרגיש שתופעות הלוואי מסריזות אותך, התייעץ עם הרופא.

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בדולוקסטין DR טבע® עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות אלו הן קלות עד מתונות ובדרך כלל נעלמות לאחר מספר שבועות.

מופיעות לעיתים קרובות מאוד (יתכן שישפיעו על יותר מ- 1 מתוך 10 מטופלים):

- כאב ראש, ישנוניות
- בחילה
- קישב בפה

מופיעות לעיתים קרובות (יתכן שישפיעו על עד 1 מתוך 10 מטופלים):

- חוסר תיאבון
- קושי להירדם, עצבנות, ירידה בחשק המיני, חרדה, קושי או כישלון לחוות ארגזאומה, חלומות לא רגילים
- סחרחורת, הרגשת נרפות, רעד, תחושת נימול, תחושת עקצוץ/דקירה בעור
- טשטוש ראייה, צלצול באוזניים
- דפיקות לב חזקות
- יתר לחץ דם, הסמקה וגלי חום
- פיהוקים
- עצירות, שלשול, כאב בטן, הקאות, צרבת או הפרעות במערכת העיכול
- הזעת יתר, פריחה
- כאב שרירים, התכווצות שרירים
- כאב במהלך מתן שתן, הטלת שתן בתדירות גבוהה
- בעיות בהשגת זיקפה, שינויים בפליטת זרע
- נפילות (במיוחד בקרב קשישים), עייפות
- ירידה במשקל. בקרב ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 המטופלים בתרופה בשל דיכאון חלה ירידה מסוימת במשקל עם התחלת נטילת התרופה. המשקל השתווה למשקל הילדים והמתבגרים שבגילים ומינם לאחר 6 חודשי טיפול.
- גזים

מופיעות לעיתים רחוקות (יתכן שישפיעו על עד 1 מתוך 100 מטופלים):

- דלקת גרון הגורמת לקול צרוד
- מחשבות אובדניות, קושי להירדם, חריקת שיניים, הרגשת חוסר התמצאות במרחב, חוסר מוטיבציה ועיוותות לא רצונית של השרירים, הרגשת חוסר מנוחה או אי-יכולת לשבת או לעמוד במקום אחד, הרגשת עצבנות, קושי להתרכז, שינויים בחוש הטעם, קושי לשלוט על תנועות, איכות שינה ירודה
- אישנונים מוגדלים, בעיות בראייה
- הרגשת מתנזרות או ורטיגו, כאב באוזן
- דפיקות לב מהירות או לא סדירות
- עילפון, סחרחורת, התעלפות או סחרחורת בעת קימה, אצבעות קרות
- חוסר מוחות בגרון (throat tightness), דימום מהאף
- הקאת דם או צואה שחורה, דלקת קיבה, גיהוק, קושי בבלעה
- דלקת כבד העלולה לגרום לכאב בטן ולהצהבת העור והלובן בעיניים - פנה לרופא מיד!
- הזעות לילה, חולת, הזעות קרות, גישות לאור השמש, נטייה מוגברת לחבלות
- שרירים מתנזרים, עיוותות בשרירים
- קושי או אי יכולת לתת שתן, קושי בתחילת מתן שתן, צורך לתת שתן במהלך הלילה, צורך לתת שתן בכמות גדולה מהרגיל, ירידה בזרימת השתן
- דימום וגעלי בלתי רגיל, וסת שונה מהרגיל (דימום כבד או קל, כואב, בלתי סדיר או ממושך), כאב באשך או בשק האשכים
- כאב בחזה, הרגשת קור, הרגשת צמא, צמרמורת, הרגשת חום, הליכה לא רגילה
- עלייה במשקל
- עלייה ברמות בדם של: אנזימי הכבד, אשלגן, קריאטיין פוספוקינאז, סוכר, כולסטרול - פנה לרופא מיד!

מופיעות לעיתים נדירות (יתכן שישפיעו על עד 1 מתוך 1,000 מטופלים):

- תגובה אלרגית חמורה הגורמת לקושי בנשימה או סחרחורת המלווה בכפיחות של הלשון או השפתיים
- ירידה בפעילות בלוטת התריס העלולה לגרום לעייפות או לעלייה במשקל
- התייבשות, רמות נתרן נמוכות בדם (בעיקר בקשישים, התסמינים יכולים לכלול: סחרחורת, חולשה, בלבול, ישנוניות/עייפות, בחילות, הקאות, התעלפות, תסמונות נפרליות, כאב ראש, קושי ריכוז, בעיות זיכרון, הזיות, תדירות, חום נשימה) - פנה לרופא מיד! הפרשה לא תקינה של הורמון המוגע מתן שתן (SIADH)
- התנהגות אובדנית, מגיה, הזיות, תוקפנות וכעס
- סינדרום סרוטונין - תגובה שיכולה לגרום לשינויים במצב הנפשי (עצבנות, הזיות, תרדמת), חוסר יציבות אוטונומית (דופק מהיר, לחץ דם בלתי יציב, סחרחורת, הזעת יתר, הסמקה, עלייה בחום הגוף), בעיות נירומוסקלריות (רעד, נוקשות, עיוותות בשרירים, רפלקסים מוגברים, חוסר קואורדינציה) ו/או סימפטומים ממערכת העיכול (כגון: בחילה, הקאה, שלשול) וכן הרגשת אושר עילאי, נמנום, גמלוניות, הרגשת שכרות, הזעה - פנה מיד לרופא!
- עלייה בלחץ התוך עיני (גלאוקומה)
- דלקת בפה, צואה עם דם בצבע אדום, ריח רע מהפה
- אי-ספיקת כבד, הצהבת העור או הלובן בעיניים (צהבת) - פנה מיד לרופא!
- סינדרום סטיבנס-גונג'סון (מחלה חמורה המלווה בשלפוחיות בעור, בפה, בעיניים ובאיברי המין), תגובה אלרגית חמורה הגורמת להתנפחות הפנים או הגרון - פנה מיד לרופא!
- התכווצות של שריר הלסת
- ריח שתן לא שגרתי
- סימפטומים של גיל המעבר, יצור חריג של חלב אם

תופעות לוואי נוספות שנצפו:

כאבי גב, הצטננות, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, שפעת, שיעול, כאב בלוע, ירידה חדה של לחץ הדם בעת מעבר משכיבה לישיבה או מישיבה לעמידה (בעיקר בהתחלת הטיפול או לאחר העלאת המינון)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לראח את התרופה?

מנע לעלסה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה חודש. בכל מקרה של ספק עליון להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

• אחסן במקום יבש, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

• אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

• **נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**

דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג:
Sugar spheres (up to 183 mg sucrose), Gelatin, Talc extra fine, Hypromellose phthalate, Hypromellose 3cP, Lactose monohydrate (21.24 mg), Sucrose (19 mg), Talc, Povidone, Triethyl citrate, Hypromellose (Pharmacoat 603), Hypromellose (Pharmacoat 606), Titanium dioxide, Colloidal silicon dioxide, Sodium lauryl sulfate (0.08 mg sodium), Brilliant blue FCF – FD&C blue 1, FD&C green 3, D&C yellow 10, Imprinting ink black.

דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג:

Sugar spheres (up to 91.5 mg sucrose), Gelatin, Talc extra fine, Hypromellose phthalate, Hypromellose 3cP, Lactose monohydrate (10.62 mg), Sucrose (9.5 mg), Talc, Povidone, Triethyl citrate, Hypromellose (Pharmacoat 603), Titanium dioxide, Hypromellose (Pharmacoat 606), Colloidal silicon dioxide, Sodium lauryl sulfate (0.04 mg sodium), Brilliant blue FCF – FD&C blue 1, Imprinting ink black.

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

הכמוסות מכילות גרמולות של דולוקסטין הידרוכלוריד המצופות בצפיצי אנורטי המגן עליהן מפני החומציות של מצי הקיבה ומונע את פירוקן בקיבה.

כמוסת ה- 60 מ"ג היא בצבעים ירוק בהיר וכחול בהיר ועליה מודפס הקוד "7544" והקוד "TEVA" בהתאמה.

כמוסת ה- 30 מ"ג היא בצבעים כחול בהיר ולבן ועליה מודפס הקוד "TEVA" והקוד "7543" בהתאמה.

האריזה עבור דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג וכן הכמוסות.

• **בעל הרישום וכתובתו:** טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 3190, פתח-תקוה.

• **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

דולוקסטין DR טבע® 30 מ"ג: 02/001/159.33802.00/01/19

דולוקסטין DR טבע® 60 מ"ג: 02/001/151.60.33778.00/01/02

• עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות במרץ 2014.

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בשלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

