

ميمانتين تيقع

أقراص

التركيب:

كل قرص يحتوي:

ميمانتين هيدروكلوريد ١٠ ملغ

(Memantine Hydrochloride)

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر أنظر الفقرة ٦ - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة مرض ألزهايمر المتوسط حتى الشديد.

الفصيلة العلاجية:

مضاد للمستقبل NMDA (N-methyl-D-aspartate)

(٢) قبل إستعمال الدواء

❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر إلى قائمة المواد غير الفعالة في الفقرة ٦)
- كنت تعاني من خلل وظيفي حاد في الكليتين
- لا يجوز تناول هذا الدواء سوية مع الأدوية:
 - أمانتادين
 - كيتامين
 - ديكستروميثورفان
 - أدوية أخرى من فصيلة مضادات NMDA
- كنت في فترة الحمل أو الرضاعة

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

❗ قبل العلاج بـ ميمانتين، إحك للطبيب إذا:

كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

❗ لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة:
 - القلب أو الأوعية الدموية (نوبة قلبية، قصور في القلب، ضغط دم مرتفع)
 - خلل خطير في وظيفة الكبد

• كان لديك مرض الصرع، سابقة لصرع، سابقة لإختلاجات أو إذا كانت لديك عوامل خطورة لحدوث صرع

في الحالات المذكورة أعلاه، يتابع الطبيب بحذر العلاج بالدواء ويفحص فعاليته بشكل دائم.

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكلية، يحتاج الطبيب إلى متابعة وظيفة كليتيك بحذر، وإلى ملائمة الجرعة الدوائية إذا تطلب الأمر ذلك.

• أجريت تغييرات جذرية في التغذية مثل: الإنتقال إلى غذاء نباتي، إستهلاك كميات كبيرة من مضادات الحموضة.

❗ إذا دخلت المستشفى للعلاج، من المهم إبلاغ الطبيب في المستشفى بأنك تتناول ميمانتين.

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

أمانتادين، كيتامين، ديكستروميثورفان - لا يجوز تناول هذه الأدوية مع ميمانتين (أنظر إلى فقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").

• أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل: الأدوية المهدئة، المنومة، أدوية لعلاج مرض باركنسون، أدوية لعلاج مرض الصرع والإختلاجات).

• أدوية مهدئة للأعصاب (لعلاج الإضطرابات النفسية)

• مقلدات دوپامين مثل L-DOPA، بروموكريبتين

• باربيتورات (أدوية للتهدئة أو المنومة)

• هيدروكلوروتيازيد

• سيميبتدين

• رانيتيدين

• بروكائيناميد

• كوينيدين

• كينين

• نيكوتين

• دانترولن، باكوفن (للتشنجات)

• أدوية مضادة للتخثر (anticoagulants)

• أدوية مضادة لإفراز الكولين (عادة أدوية مضادة لفرط الحركة أو لتقلصات الأمعاء)

إذا دخلت المستشفى للعلاج، من المهم إبلاغ الطبيب في المستشفى بأنك تتناول ميمانتين.

❗ إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

❗ الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

❗ الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال والمراهقين دون عمر ١٨ سنة.

❗ السياقة وإستعمال الماكينات

سيوضح لك الطبيب فيما إذا كانت حالتك الطبية تمكنك من السياقة أو تشغيل الماكينات بأمان. إن إستعمال هذا الدواء قد يؤثر على سرعة رد الفعل لذلك يجب إتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتشغيل ماكينات خطرة.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على اللكتوز الذي قد يسبب الأليرجيا للأشخاص الحساسين له.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددها من قبل الطبيب فقط.

يتبع

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:**الجرعة الإعتيادية:**

الكبار والمسنين - ٢٠ ملغ في اليوم.

الجرعة الإبتدائية:

من أجل تقليص خطورة ظهور الأعراض الجانبية، يجب زيادة الجرعة الدوائية بالتدرج، وفقاً للخطة التالية:

الأسبوع الأول ٥ ملغ في اليوم (نصف قرص)
 الأسبوع الثاني ١٠ ملغ في اليوم (قرص واحد)
 الأسبوع الثالث ١٥ ملغ في اليوم (قرص ونصف)

الأسبوع الرابع وصاعداً ٢٠ ملغ في اليوم (قرصان)

الجرعة الدوائية الإبتدائية هي:

نصف قرص في اليوم خلال الأسبوع الأول.

في الأسبوع الثاني قرص واحد في اليوم.

في الأسبوع الثالث قرص ونصف في اليوم.

إعتباراً من الأسبوع الرابع وصاعداً، قرصان في اليوم.

الجرعة الدوائية للمرضى ذوي أداء وظيفي متوسط في الكليتين وفقاً لتوصية الطبيب. كذلك يجب إجراء فحوصات المتابعة للأداء الوظيفي للكلى.**لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.****طريقة إستعمال الدواء:**

• يجب بلع قرص الدواء مع القليل من الماء.

• بالإمكان شطر القرص إلى نصفين في الشق المعلم.

• يجب تناول الدواء كل يوم في نفس الساعة.

فحوصات ومتابعة

أثناء فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوصات وظائف الكلى.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع الطفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً علبة الدواء معك.**إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، إنتظر وتناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.** لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين معاً.**يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.**

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميمانتين قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية تظهر في أوقات متقاربة:

صداع، نعاس، إمساك، قيم مرتفعة للأداء الوظيفي للكبد، دوار، مشاكل في التوازن، ضيق في التنفس، إرتفاع في ضغط الدم، حساسية مفرطة للدواء.

أعراض جانبية تظهر في أوقات متباعدة:

إرهاق، تلوثات فطرية، إرتباك، هذيان، تقيؤات، إضطرابات في المشي، قصور في القلب، خثرات دموية في الأوردة.

أعراض جانبية نادرة / نادرة جداً:

إختلاجات

أعراض جانبية شيعوها غير معروف:

ردود فعل ذهانية، إلتهاب البنكرياس، إلتهاب الكبد.

مرض ألزهايمر مقترن بإكتئاب، أفكار إنتحارية وإنتحار. هذه الأعراض تم التبليغ عنها لدى المرضى الذين تم علاجهم ب ميمانتين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.**(٥) كيفية تخزين الدواء؟**

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

• يجب التخزين في مكان جاف، دون ٢٥ درجة مئوية.

(٦) معلومات إضافية**يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:**

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Colloidal silica anhydrous, Povidone, Titanium dioxide, Hypromellose, Polyethylene glycol, Polysorbate 80.

كل قرص يحتوي ١٤٠ ملغ لكتوز، وكذلك على ١,٧١-١,١٧ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

العلبة تحتوي على أقراص بيضاء على شكل كبسولة:

في جانب واحد من القرص هنالك شق معلم للشطر، وفي الجانب الآخر من القرص هنالك شق معلم للشطر، بينما، في الجانب الأيسر من الشق مطبوع الحرف "M"، ومن الجانب الأيمن من الشق الرقم "10".

المنتج وصاحب الإمتياز:

تتبع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. ٣١٩٠، بيتح - تكفا ٤٩١٣١

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في حزيران ٢٠١٤.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١١/٠٠-٣١٥٥١-٤١-١٤٠

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.