

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - ١٩٨٦**

يُسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

متروجيل أقراص

المادة الفعالة وكميته:

يحتوي كل قرص على:

ميترونيدازول ٢٥ ملг (Metronidazole)

للقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦.

إنقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج التلوثات الناجمة عن الأميبات، الوحيدات المشعرة، جراثيم لاهوائية أو جراثيم حساسة للميترونيدازول.

يحتوي الدواء على مادة فعالة تسمى ميترونيدازول تنتمي إلى مجموعة أدوية تسمى مضادات حيوية.

تعمل المادة من خلال قتل الجراثيم والطفيليات التي تتسبب بحدوث تلوث في جسمك.

في حالات معينة، هناك حاجة لإعطاء علاج دوائي بشكل متزامن للزوج/ة، حتى لو لم تظهر لديه/ا أعراض.

عندما يعطي الدواء لعلاج الوحيدات المشعرة، يوصى بأن يستعمل الزوج وacky مطاطي عند إقامة العلاقات الجنسية خلال فترة العلاج - الرجاء إستشارة الطبيب.

الفصيلة العلاجية:
مستحضر مضاد للجراثيم من فصيلة الإيميدازول.

٢) قبل إستعمال الدواء:

☒ لا يجوز إستعمال المستحضر إذا:

• لا تستعمل الدواء إذا كنت في الثلث الأول من الحمل.

• لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا وجدت حساسية لميترونيدازول، نيتروإيميدازول (مثل تينيدازول) أو لأحد مركبات الدواء (أنظر الفقرة ٦).

• لا يجوز إستهلاك الكحول خلال العلاج أو في غضون ٤٨ ساعة من نهاية العلاج.

☒ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

☒ قبل العلاج بـ متروجيل إحك للطبيب إذا:

• إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل تناول الدواء

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد

• إذا كنت ت تعالج بديلزة الكلى (أنظر الفقرة ٣) - الأشخاص الذين يخضعون للديلزة

• إذا كنت تعاني من مرض في جهاز الأعصاب

☒ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول أو تنوى تناول:

• أدوية مضادة لتخثر الدم (وارفارين)

• ديسولفيرا (للفطام من الإدمان على الكحول)

• سيميتيدين (للحكة)

• فلواور والأراسيل (أدوية مضادة للسرطان)

• فينيتوئين أو فينوباربيتال (أدوية مضادة للصرع)

• ليتيوم (للأمراض النفسية)

• سيكلوسپورين (لمنع رفض غرزات)

• بوسولفان للوكيميا (لسرطان خلايا الدم)

☒ إستعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام أو فور إنتهاءها مباشرة.

☒ إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بالدواء ولمدة ٤٨ ساعة بعد نهاية العلاج.

شرب الكحول خلال تناول متروجيل قد يسبب أعراض جانبية مزعجة مثل غثيان، تقيؤ، آلام في البطن، هبات من الحر، نظم قلب سريع أو غير منتظم وصداع.

☒ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الماكولات:

قد يسبب تناول متروجيل الميل إلى النوم، دوار، إرتباك، ظهور هذيان (رؤبة أو سماع أشياء غير موجودة)، تقلصات أو مشاكل مؤقتة في الرؤبة (مثل تشوش الرؤبة أو إزدواجية الرؤبة).

إذا ظهرت الأعراض الجانبية هذه فلا يجوز القيادة أو تشغيل ماكولات أو أجهزة.

☒ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي متروجيل على الصوديوم (أنظر الفقرة ٦).

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك

الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل

الطبيب فقط. من المهم إكمال كامل فترة العلاج. تتعلق

الجرعة الدوائية ومدة العلاج بنوع المرض.

يجب بلع القرص مع الماء، بعد أو مع وجبة الطعام.

الأشخاص الذين يخضعون للديلزة - تخرج الديلزة

متروجيل من الدم. إذا كنت تخضع للديلزة، يجب تناول

متروجيل بعد العلاج بالياليزا.

الأشخاص ذوو مشاكل في الكبد - قد يشير لك الطبيب

بإستعمال جرعة دوائية أقل من المعتمد أو بوتيرة أقل

من المعتمد.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

الفحوص والمتابعة

• خلال العلاج المطول (أكثر من ١٠ أيام) بهذا الدواء، يجب إجراء فحوصات دم.

• إذا كان الدواء يستعمل لعلاج الأميبات في جهاز الهضم، يجب فحص إختفاء التلوث عند نهاية

العلاج من خلال فحوص البراز.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل

بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء يجب تناول جرعة دوائية حال

تذكرك. ولكن إذا حان تقريباً موعد الجرعة الدوائية التالية، فوت الجرعة الدوائية هذه وتناول الجرعة الدوائية

التالية في الوقت المعتمد واستشر الطبيب. لا يجوز

تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة

الدوائية المنسية.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

يجب المواضبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة

الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن في حالتك الصحية.

يتبع

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال متروجيل قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تندھش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب أو إلى المستشفى فوراً إذا:

- إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي يشمل: إنتفاخ في اليدين، في القدمين، في الكاحلين، في الوجه، في الشفتين أو في الحنجرة الذي قد يسبب صعوبات في البلع أو في التنفس. قد يظهر أيضاً طفح حاك.
 - إصابة دماغية (اعتلال دماغي): عرض خطير لكن نادر للغاية. تغير أعراض هذه الظاهرة لكن قد تعاني من سخونة، تبיס الرقبة، صداع، هذيان (رؤيه أو سماع أشياء غير موجودة)، قد تعاني من صعوبة في تحريك الذراعين والقدمين، مشاكل في النطق أو شعور بإرتباك.
- توجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تلاحظ الأعراض الجانبية التالية:
- إصفرار الجلد والعينين. يمكن أن ينتج عن مشاكل في الكبد (يرقان).
 - تلوث غير متوقع، تقرحات في الفم، كدمات، نزف في اللثة أو إرهاق شديد. يمكن أن تنتج عن مشاكل في الدم.
 - ألم شديد في البطن يمكن أن يصل إلى الظهر (قد يدل على التهاب في البنكرياس).

توجه إلى الطبيب أو الصيدلي إذا لاحظت الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة جداً (تحدث لدى أقل من ١ من بين ٠٠٠٠١ شخص):

- تقلصات (نوبة تشنجات).
- مشاكل نفسية مثل شعور بإرتباك وهذيان (رؤيه أو سماع أشياء غير موجودة).
- مشاكل في الرؤيه مثل تشوش الرؤيه أو إزدواج الرؤيه.
- طفح أو إحمرار في الجلد.
- صداع.
- بول بلون داكن.
- شعور بإرهاق أو دوار.
- ألم في العضلات أو في المفاصل.

أعراض جانبية إضافية (شيوعها غير معروف):

- تنميل أو خدر، وخز، ألم أو شعور بالضعف في الذراعين أو القدمين.
- مذاق غير مستحب في الفم، لسان أبيض، غثيان، تقيؤ، ألم في البطن أو إسهال، فقدان الشهية للطعام.
- سخونة.
- إكتئاب.
- ألم في العينين.
- في حالات العلاج المطول، تم التبليغ عن مرض أعصاب محيطي حسي أو نوبات صرع (تقلصات) عابرة.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا استمرت لأكثر من بضعة أيام أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجاه رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو النفايات. إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل سوف تساعد في الحفاظ على البيئة.

قد يسبب هذا الدواء تغيراً في لون البول. لا حاجة للقلق بخصوص هذا التغير.

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Dibasic calcium phosphate dihydrate, sodium starch glycolate, povidone, starch, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, talc, color FD&C yellow No. 6.

يحتوي كل قرص على ٣,٩-١,٩ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص مدور بلون برتقالي فاتح، يوجد على أحد جانبيه خط للشطر والجانب الآخر أملس.

تتوفر علبة ذات ٢٠ قرصاً.

الم المنتج، صاحب الإمتياز وعنوانه:

تيقع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. ٣١٩، بيتح تكفا.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٣٠٠-٢٢٦٧٢-٧٨-٣٢.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها

فحص ورخص في نيسان ٢٠١٤

من أجل سهولة وتهليل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.