

<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><span></span></div>	
نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات طبية) – ١٩٨٦	
يسوق الدواء دون وصفة طبيب	

## ستريبيسيلس® بِلوس

## ٢٤ قرصاً للمص

<b>التركيب:</b>	2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg
<b>كل قرص للمص يحتوي:</b>	Amylmetacresol 0.6 mg
	Lidocaine Hydrochloride 10.0 mg

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للكبار والأطفال فوق عمر ١٢. دون هذا العمر يجب مراجعة الطبيب. عليك إستعمال الدواء بصورة صحيحة. إستشر الصيدلي إذا كنت تحتاج معلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد عدة أيام.

### ١) لأي غرض مخصص الدواء؟

للتخفيف السريع من آلام الحنجرة الشديدة ولتطهير الحنجرة.

**الفصيلة العلاجية:** مُطهِّر.

### ٢) قبل إستعمال الدواء

<b>⚠ لا يجوز إستعمال المستحضر إذا كنت حساساً (البرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.</b>
--

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

- قبل العلاج ب ستريبيسيلس بِلوس إحكي للطبيب إذا كنت حاملاً أو مرضعة.
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة أو لفترة طويلة دون إستشارة الطبيب.

### ⚭ الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال ستريبيسيلس بِلوس.

### ⚭ الدواء والطعام

- يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.
- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية لا تحتاج وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

### ⚭ معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

كل قرص للمص يحتوي ٢ ملغ صوديوم سكارين، الكمية العظمى من صوديوم سكارين في اليوم هي ٥ ملغ لكل كغ من وزن الجسم.

تحتوي أقراص المص على السكر ولا يوصى بإستعمالها لدى مرضى السكري.

### ٣) كيفية إستعمال الدواء

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة للكبار والأطفال فوق عمر ١٢ سنة هو:

قرص واحد للمص كل ٢–٣ ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز إستعمال أكثر من ٨ أقراص مص في ٢٤ ساعة.

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصَّص عادة للأطفال دون عمر ١٢ سنة.

الم شديد في الحنجرة، متواصل أو مترافق بسخونة، صداع، غشيان وتقيؤات، تقتضي إستشارة فورية مع الطبيب.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال عدة أيام يجب التوجه للطبيب.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

### ٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ستريبيسيلس بِلوس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا ظهر طفح أو تهيج موضعي (نادر).** إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

### ٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.

### ٦) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Tartaric Acid, Sodium Saccharin, Levomenthol, Peppermint Oil, Star Anise Oil, Indigo Carmine, Quinoline Yellow, Solids from Liquid Sucrose and Liquid Glucose.

كل قرص للمص يحتوي ٢ ملغ صوديوم سكارين.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: عبوة الكرتون تحتوي ٢٤ قرصاً للمص. الأقراص مستديرة، بلون أزرق فاتح.
- صاحب الإمتياز:** ريكيت بنكيزر (نير ايست) م.ض . شارع هانلچار ٦، هود هشارون ٤٥٢٤٠.
- المنتج:** ريكيت بنكيزر هيلث كير إينترناشيونال م.ض، نوتينجهام، انكلترا.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ: تموز ٢٠١٢.
- رقم سجل السدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٢٨٩٢٨ ٨٦ ١٠٦
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.