

**ستريپسيليس بدون سكر****(توت)****فراولة (المَّمْضِّ)****المواد المغالة:**

كل قرص للمَّمْضِ يحتوي على:

١٢ ملغم .٤٢ دي كلورو بنيزيل الكحول.

١٠ ملغم أميل مينا كرسول.

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg,  
Amylmetacresol 0.6 mg.

المواد غير الفعالة: لذلر بند ٦ - معلومات إضافية

اقرأ الشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسللة إضافية، توجه إلى الصيدلي أو إلى الصيدلي.

ـ الدواء مخصوص للبالغين والأطفال فوق عمر ٦ سنوات. ما دون هذا العمر يجب التوجيه إلى الطبيب. يجب عليك استعمال الدواء بطرفيته صحيحة. قم باشتارة الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تناولت علامات المرض (الأعراض) أو لم يطرأ عليها خسн بعد ٣ أيام.

ـ الماء غير الفعالة: لذلر بند ٦ - معلومات إضافية

اقرأ الشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسللة إضافية، توجه إلى الصيدلي أو إلى الصيدلي.

ـ الدواء مخصوص للبالغين والأطفال فوق عمر ٦ سنوات. ما دون هذا العمر يجب التوجيه إلى الطبيب. يجب عليك استعمال الدواء بطرفيته صحيحة. قم باشتارة الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تناولت علامات المرض (الأعراض) أو لم يطرأ عليها خسن بعد ٣ أيام.

**٤. لا في غرض مخصوص الدواء؟**

ـ يستعمل ستريپسيليس بدون سكر بطعم الفراولة لتخفيف آلام الحلق لدى البالغين والأطفال فوق عمر ٦ سنوات. يحتوي المستحضر على مادتين فالجين ذوي فعالية مطهورة، التي تقتل البكتيريا المرتبطة بتلوكات الحلق. إن ملخص قرص المرض يمكنه المساعدة في تلوكات الحلق. يساعد على ترالله وتلطيفه.

**الفصيلة العلاجية:**

ـ مطهور

**٥. قبل استعمال الدواء****لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

ـ كنت حساساً (لديك حساسية) للمواد الفعالة أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء مثل إيزوميتنتيل وملتيبيون (أنظر القائمة الكاملة للمركبات غير الفعالة في بند ٦).

ـ كنت تعاني من عدم تحمل لسكرات معينة مثل فروكتوز، سوف يحدد طبيبك إذا كنت تعاني من وضع طبي من هذا النوع.

ـ كان المقالج دون عمر ٦ سنوات، وذلك بسبب خطر الاختناق.

**تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:****١. قبل العلاج بستريپسيليس بدون سكر فراولة،****أخبر الطبيب إذا:**

ـ كنت تناولت، أو تناولت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تقدمة.

ـ يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:

ـ ظهر تفاعل أرجنتيني (فرط التحسس)، مثل حكة،

ـ تهيج، طفح جلدي.

ـ إذا تناولت العلامات المرضية (الأعراض) تقليقاً أو لم تتحسن بعد ٣ أيام أو إذا كان هناك ألم حلق شديد، متواصل

ـ أو مصحوب بسخونة، صداع أو غثيان وقيء.

ـ لا يوصى باستعمال هذا المستحضر إذا كنت

ـ تناولت بأنك حامل، إذا كنت حاملاً أو إذا كنت

ـ مرضحة، إذا كنت حاملاً أو مرضحة فيجب استعمال الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الأدوية.

ـ معلومات مهمة عن جزء من مركبات

ـ الدواء:

ـ يحتوي المستحضر على إيزوميتنتيل وملتيبيون،

ـ والتي من الممكن أن يكون لها تأثير ملئن خفيف، في

ـ حالة تناول عدة أقراص للملحق في اليوم.

ـ لا يجوز استعمال المستحضر إذا كان لديك عدم

ـ تحمل للفروكتوز (أنظر بند ٦ لا يجوز استعمال

ـ الدواء إذا).

**٣. كيف تستعمل الدواء؟**

ـ عليك التتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن

ـ متأكدة.

ـ الجرعة الآمنة عادة هي:

ـ في البالغين والأطفال فوق عمر ٦ سنوات: قرص واحد

ـ للملحق ٣-٤ ساعات. لا يجوز استعمال أكثر من

ـ ١٢ قرص للملحق في يوم كامل (٤٤ ساعة).

ـ لا يجوزتجاوز الجرعة الموصى بها.

ـ طريقة الاستعمال: يجب مضغ قرص المض

ـ طبطه، وذلك ليندوب بطيء في الفم. لا يجوز مضغ

ـ أو كسر قرص المض.

ـ إذا تناولت بالخطأ جرعة بعياً على فقد

ـ تشعر بعدم راحة في البطن. لا تستمر باستعمال

ـ المستحضر رقم بتناول الجرعة أو بلع طفل بالخطأ

ـ إذا أفرطت بتناول الجرعة أو بلع طفل بالخطأ

ـ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة

ـ الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء

ـ معلك.

ـ إذا تناولت تناول جرعة في الوقت المطلوب، لا

ـ يجوز تناول جرعة مضاعفة.خذ الجرعة القادمة

ـ في الوقت العادي.

ـ لا يجوز تناول أدوية في الظلام! حفظ من الملحص

ـ والجرعة الدوائية في كل مرة تناولها بها دواء. ضع

ـ النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

ـ إذا كانت لديك أسللة إضافية حول استعمال

ـ الدواء، فما ياستشاره الطبيب أو الصيدلي.

**٤. الأعراض الجانبية:**

ـ كل آتي دواه، قد يسبب استعمال ستريپسيليس بدون سكر فراولة أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تتفق من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المفضل أن لا تتعاطي من واحد منها.

ـ يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:

ـ ظهر تفاعل أرجنتيني (فرط التحسس)، مثل حكة،

ـ تهيج، طفح جلدي.

ـ إذا تناولت أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبية لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

**٥. كمية تخزين الدواء؟**

ـ يجب التسليم في مكان مغلق بعيداً عن متاحف أبيدي الأطفال وألوانه.

ـ تسبب التسليم دون تعليمات صريحة من الطبيب.

ـ لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة.

ـ تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ـ إيجاد درجة حرارة أقل من ٢٤ درجة مئوية.

ـ لا يجوز زمن الأدوية في المراحيض أو في البيانات المنزلية. استشر الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لا ضرورة بها، وذلك حماية البيئة.

**٦. معلومات إضافية**

ـ إضافة إلى المواد الفعالة أيضًا على:

ـ Isomalt, Maltitol Liquid, Tartaric Acid, Flav P, strawberry Flavor 052312B, Sodium Saccharin, Pink Antho P-WS (E163)

ـ كيف يبدو الدواء وما هو محتواه:

ـ قرص مستدير بلون زهري. كل عبوة تحتوي على ٢٤، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٢، ١، ٠.٦ جرام.

ـ قرص يحتوي على ماء، شارع هنفاري، آهود هشارون ٤٥٤٣.

ـ وكثير يكتسب هيلك كبر إيتريشيوبل م.ض.

ـ توقيفهام، إنجلترا.

ـ فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزاراة الصحة بتاريخ تشرين الأول ٢٠١٣.

ـ رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة .. ١١٢، ٤٥، ٣٩٤٧٦.

ـ للتبسيط وتسهيل القراءة، ثبت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من هذا، الدواء مخصوص لكلا الجنسين.