

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סטרפסילס® ללא סוכר

תות
לכסניות למציצה

חומרים פעילים:

כל לכסנית מכילה:
1.2 מ"ג 2,4-דיכלורובניזל אלקהול,
0.6 מ"ג אימילמטקרוסול.

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg,
Amylmetacresol 0.6 mg.

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון זה סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים וילידים מעל גיל 6 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליו להשתמש בתרופה בצורה כזו. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליו לפנות אל הרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מתמריים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

סטרפסילס ללא סוכר בטעם תות משמש להקלה על כאבי גרון אצל מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים. התכשיר מכיל שני חומרים פעילים בעלי פעולה אנטיספטית, הקוטלים חיידקים המעורבים בזיהומי גרון. מציצת הלכסנית מאפשרת לחומרים הפעילים לפעול באזור הכואב וזו לסכך ולהרגיע אותו.

קבוצה תרופוית:

אנטיספטי

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גרש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה כגון איזומלטיטול ומלטיטול (ראה רשימה מלאה של המרכיבים הבלתי פעילים בסעיף 6).
- אתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים כגון פרוקטוז, הרופא שלך יקבע אם הינך סובל ממצב רפואי מסוג זה.
- המטופל מתחת לגיל 6 שנים, כל חשש להנקה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

- לפני הטיפול בסטרפסילס ללא סוכר תות, ספר לרופא אם:**
 - אתה סובל מבעיות אחרות בגרון.
 - אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה.
 - יש ליוועץ מיידית עם הרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מתמריים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים או אם יש כאב גרון חמור, ממושך לאחר חלווה בחום, כאב ראש או בחילה והקאות.

היונה והנהגה:

לא מומלץ להשתמש בתכשיר זה אם את חושבת שאת בהריון, אם את בהריון או אם את מיניקה. אם הינך בהריון או מיניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התכשיר מכיל איזומלטיטול ומלטיטול, אשר עשוייה להיות אחד השפעה משלשלת קלה, אם נטילים מספר לכסניות ביום. אין להשתמש בתכשיר אם יש לך אי - סבילות לפרוקטוז (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון המקובל בדרך כלל הוא: מבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים: לכסניה אחת למציצה כל 3-2 שעות. אין להשתמש ביותר מ-2 לכסניות ביממה (24 שעות). אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש: יש למצוץ הלכסנית לאט, על מנת שתתמוסס לאט בפה. אין ללעוס או לשבור את הלכסנית.

- אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** אתה עשוי לחוש אי נוחות בבטן, אל תמשך להשתמש בתכשיר והיוועץ ברופא או ברוקח. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיני של בית חולים, והבא אריות התרופה איתך.
- אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש,** אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.
- אין ליטול לרופא חבושך!** אנוקטיים חיידקים, והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס ללא סוכר תות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה שרמת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם:

- מופיעה תגובה אלרגית (גישות יתר), כגון גרד, גירוי, פריחה.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. התאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- אין להשליך תרופות לשירותים או לאשפה הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד להשליך

תרופות שאין בהן צורך, על מנת להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Isomalt, Maltitol Liquid, Tartaric Acid, Flav P strawberry Flavor 052312B, Sodium Saccharin, Pink Antho P-W5 (E163)
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** לכסנית עגולה בצבע ורוד. כל אריזה מכילה 6, 12, 16, 20 או 24 לכסניות וייתכן ולא כל גדלי האריזה ישווקו.
- שם בעל הרישום וכתובתו:** רקיט בלקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, הוד השרון 45240.
- שם היצרן וכתובתו:** רקיט בלקיזר ה"ת/רפ. אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אוקטובר 2013.
- מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 00 29476 45 112

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.