

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Препарат продается без рецепта врача

Стрепсисл без сахара Клубника Таблетки для рассасывания

Действующие вещества:

Каждая таблетка для рассасывания включает:

2,4-дихлоробензилового спирта 1.2 мг,

Амилметакресола 0.6 мг.

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg,

Amylmetacresol 0.6 mg.

Список неактивных компонентов:

см. пункт 6 – дополнительная информация.

- Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

- Препарат предназначен для взрослых и детей старше 6 лет. Лицам младше этого возраста необходимо обратиться к врачу. Вам следует использовать препарат надлежащим образом. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков (симптомов) заболевания или отсутствии улучшения через 3 дня обратитесь к врачу.

1. Для чего предназначен препарат?

Стрепсисл без сахара со вкусом клубники используется для облегчения болей в горле у взрослых и детей старше 6 лет. Препарат содержит два действующих вещества, имеющих антисептическое действие, уничтожающих бактерии, которые связаны с инфекциями горла. Применение таблетки для рассасывания позволяет активным веществам действовать в большом месте, а также помогает смыть и успокоить больное место.

Терапевтическая группа:

Антисептик

2. Перед применением препарата

Не следует пользоваться препаратом, если:

- Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к действующим веществам или к одному из других компонентов препарата, такие как изомальтитол и мальтитол (смотрите полный список неактивных компонентов в пункте 6).
- Вы страдаете от нарушения толерантности к некоторым углеводам, таким как фруктоза. Ваш врач установит, если Вы страдаете от заболевания такого типа.
- Пациент младше 6 лет, из-за опасения удушья.

Особенные предостережения, касающиеся использования препарата:

До начала приема Стрепсисл без сахара клубники сообщите врачу, если:

- Вы страдаете от других заболеваний горла.
- Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки.
- Следует немедленно обратиться к врачу, если признаки болезни (симптомы) обостряются или не улучшаются после 3 дней, или если есть острые боли в горле, продолжительная или сопровождающаяся высокой температурой, головной болью или тошнотой и рвотой.

Беременность и лактация:

Не рекомендуется использовать этот препарат, если Вы думаете, что Вы беременны, если Вы беременны или если Вы кормите грудью. Следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед приемом лекарственных препаратов во время беременности или кормления грудью.

Важная информация о некоторых компонентах данного препарата:

Этот препарат содержит изомальтитол и мальтитол, которые могут иметь легкий слабительный эффект при приеме нескольких таблеток для рассасывания в день.

Не используйте препарат, если у Вас есть нарушение толерантности к фруктозе (смотрите пункт "Не следует пользоваться препаратом, если").

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений Вам следует обратиться к врачу или фармацевту.

Допустимая дозировка, как правило:

Взрослые и дети старше 6 лет: одна таблетка для рассасывания каждые 2-3 часа. Не используйте больше 12 таблеток для рассасывания в сутки (24 часа).

Не превышайте рекомендуемую дозировку.

Способ применения: следует медленно сосать таблетку для рассасывания, чтобы она медленно растворилась во рту. Не жевать и не ломать таблетку для рассасывания.

- Если Вы по ошибке допустили передозировку, возможно, Вы ощутите дискомфорт в животе. Прекратите прием препарата и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Если Вы допустили передозировку, или ребенок по ошибке проглотил это лекарство, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку лекарства.
- Если Вы забыли принять данный препарат вовремя, не принимайте двойную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.
- Не принимайте лекарственные препараты в темноте! При каждом приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся приема препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты:

Как и при приеме любого лекарственного препарата, прием Стрепсисл без сахара клубники может привести к побочным эффектам у части потребителей. Не следует опасаться, читая список побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни от одного из них.

Необходимо прекратить прием препарата и срочно обратиться к врачу, если

- Появилась аллергическая реакция (повышенная чувствительность), такая как зуд, раздражение, сыпь.

Если один из побочных эффектов обострился, или Вы страдаете от побочных эффектов, не указанных в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

5. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не высыпайте рвоту, не получив на это четких указаний врача.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Хранить при температуре ниже 25°C.
- Не следует выбрасывать лекарства в канализацию или мусорный бак. Узнайте у фармацевта как уничтожить лекарства, вышедшие из употребления. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. Дополнительная информация

В дополнении к действующему веществу препарат включает:

Isomalt, Maltitol Liquid, Tartaric Acid, Flav P strawberry Flavor 052312B, Sodium Saccharin, Pink Antho P-W/S (E163)

Как выглядят лекарство и что включает упаковка:

Круглая таблетка для рассасывания розового цвета. Каждая упаковка содержит 6, 8, 12, 16, 20 или 24 таблетки для рассасывания (возможно, не все размеры упаковок будут выпущены в продажу).

• Владелец лицензии и его адрес: Рекит Бенкизер (Нир Ист) Лтд., ул. Ха-Нагар 6, Ход ха-Шарон 45240.

• Изготовитель и его адрес: Рекит Бенкизер Хелфер Интернационал Лтд., Ноттингем, Англия.

• Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в октябре 2013.

• Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 112 45 29476 00.