

كلونيريت أقراص

المادة الفعالة:

كل قرص يحتوي على: ٠.٢٥،٠ ملغ كلونيدين هيدروكلوريد (Clonidine hydrochloride).
لقائمة المواد غير الفعالة أنظر البند ٦. أنظر أيضاً "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" في بند ٢.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لك لعلاج مرضك. لا تعطه لاستعمال الآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

١. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء مخصص لمنع الصداع النصفي (الشقيقة) والصداع الناتج عن تقلص أو توسع الأوعية الدموية. كذلك، الدواء مخصص لعلاج احمرار الوجه (flushing) وأعراض أخرى في الأوعية الدموية لدى النساء في سن اليأس.

المجموعة العلاجية:

مُنَبِّه لمستقبلات ألفا-٢ الأدرينالية (α_2) ذات فعالية مركزية ومُنَبِّه لمستقبلات إيميدازولين.

٢. قبل البدء باستعمال الدواء

لا يجوز استخدام الدواء في الحالات التالية:

- إذا كنت حساساً للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الأخرى الموجودة في الدواء (لقائمة المواد غير الفعالة أنظر البند ٦).
- إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب تسبب بطء في نبض القلب.
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على كلونيدين مثل نورموپريسان (وهو دواء علاج ارتفاع ضغط الدم)

تحذيرات خاصة بشأن استخدام الدواء:

- استخدام الدواء قد يسبب جفافاً في العينين، الأمر الذي قد يكون مشكلة لدى المرضى الذين يستعملون العدسات اللاصقة.
- إذا كنت على وشك إجراء عملية جراحية معينة (بما في ذلك عملية بالأسنان) أو أي إجراء يتضمن تخدير، عليك إبلاغ الطبيب وكذلك طبيب التخدير عن تناولك هذا الدواء
- إذا كانت لديك حساسية لطعام معين أو لدواء معين، عليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.

قبل بداية العلاج كلونيريت أخبر طبيبك:

- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض رينو (Raynaud's disease) - مشكلة في تدفق الدم إلى أصابع اليدين والرجلين، أو من مشاكل أخرى في تدفق الدم (وهذا يشمل تدفق الدم إلى الدماغ).
- إذا كنت تعاني أو عانيت سابقاً من خلل في وظيفة القلب و/ أو الأوعية الدموية، الكلى.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اكتئاب، اعتلال أعصاب (Polyneuropathy).
- إذا كنت تعاني من الإمساك.

إذا كنت تتناول أو تناولت، مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية (نشير هنا إلى أن القائمة أدناه تذكر المواد الفعالة في الأدوية. إذا كنت غير متأكد من تعاطيك لواحد من هذه الأدوية، فالرجاء استشارة الطبيب أو الصيدلي):

- أدوية تؤثر على جهاز الأعصاب المركزي أو من الممكن أن تؤدي إلى شعور بالنعاس (مثل الأدوية المهدئة، أدوية النوم، لعلاج الرعاش (الباركنسون)، أو الصرع، أدوية مضادة للحساسية، مواد مخدرة للعمليات الجراحية، مسكنات الآلام الأفيونية).
- أدوية لعلاج الاكتئاب (مثل المضادات ثلاثية الحلقات، مثبطات أكسيداز أحادي الأمين - MAOIs)، أدوية مضادة للذهان (لعلاج مشاكل نفسية مثل انفصام الشخصية).
- حاصرات بيتا (مثل أتينولول)، مدرات البول (مثل فوروسيميد)، ديجوكسين.
- أدوية من مجموعة حاصرات ألفا مثل پرزوسين أو دوكسزوسين (الذي يُستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في القلب أو في غدة البروستات)، أو أدوية لها ذات الصفات التي لحاصرات ألفا (مثل ميرتازيبين لعلاج الاكتئاب).
- أدوية موسعة لأوعية الدم مثل ديازوكسيد، صوديوم نيتروپروسيد.
- أدوية لخفض ضغط الدم.
- مثيلفينيدات.

استخدام الدواء وتناول المشروبات الكحولية: ممنوع شرب النبيذ أو مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بهذا الدواء. قد يسبب الدواء شعوراً بالنعاس وشرب المشروبات الكحولية قد يزيد من تفاقم هذه الظاهرة.

الحمل والإرضاع:

- ممنوع استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب إذا كنت حاملاً.
- لا يوصى باستخدام الدواء خلال الإرضاع (يُفرض الدواء في حليب الأم).

القيادة واستعمال الماكينات: قد يؤثر استعمال هذا الدواء على اليقظة أو قد يؤدي إلى شعور بالدوار أو تشوش الرؤية . إذا شعرت بهذه الاعراض - ممنوع قيادة السيارة، تشغيل ماكينات أو ممارسة أي فعاليات خطيرة تحتاج إلى اليقظة.

استخدام الدواء للأطفال: هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون سن ١٨ سنة، بسبب عدم وجود معطيات بخصوص هذه الفئة العمرية. **معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:**

يحتوي هذا المستحضر على اللاكتوز. إذا كنت حساساً للاكتوز، يجب إبلاغ الطبيب قبل تناول هذا الدواء – أنظر البند ٦.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استخدام الدواء بحسب تعليمات الطبيب. عليك التحقق من الأمر لدى الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً . الطبيب وحده هو من يحدد الجرعة وطريقة العلاج.

يجب استخدام هذا الدواء في أوقات محسوبة كما يحددها الطبيب المعالج

الجرعة المُتَّبَعَة، عادةً، هي: الجرعة الأولية تكون ٢ أقراص معاً، مرتين باليوم. وبحسب الحاجة، من الممكن أن يزيد الطبيب الجرعة بعد مرور أسبوعين إلى ٣ أقراص معاً، مرتين في اليوم.

الطبيب هو الذي يحدد استمرار العلاج بحسب وضعك الصحي. من الممكن أن يمر أسبوعين حتى ٤ أسابيع حتى التأثير الكامل. **لا يجوز تخطي الجرعة الموصى بها.**

يجب بلع الدواء مع كأس ماء.

لا يجوز مضغ أو سحق القرص!

لا يجوز شطر القرص وذلك لعدم وجود خط للشطر.

فحوصات ومتابعة: في فترة العلاج بهذا الدواء يجب أن تراقب ضغط الدم.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى: إذا تناولت جرعة إضافية أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه، فوراً، إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضِر عبلة الدواء معك. علامات تجاوز الجرعة قد تشمل: تقلص بؤبؤ العين، نبض قلب بطيء، انخفاض في ضغط الدم، انخفاض ضغط دم عند النهوض لوضعية جلوس أو وقوف، انخفاض في درجة الحرارة (Hypothermia)، نعاس، غيبوبة، اكتئاب الجهاز التنفسي (نقص التهوية)، توقف التنفس خلال النوم، ارتفاع ضغط الدم (ضغط دم مرتفع)، تقيؤات، جفاف في الفم.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة حالاً عندما تتذكر ذلك، لكن إذا كان موعد تناول الجرعة التالية قريباً، فلا تأخذ الجرعة التي نسيت تناولها. ممنوع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيت تناولها! يجب الاستمرار في تناول الدواء حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء: حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب. وحتى عندها، يجب خفض الجرعة بالتدريج. التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى أعراض فطام (وخاصة إذا كنت تستعمل الدواء بجرعة عالية و/ أو لفترة طويلة)، مثل الشعور بالاضطراب، الأرق، خفقان القلب (palpitation)، ارتفاع سريع في ضغط الدم، عصبية، رجفة، وجع رأس وأعراض في جهاز الهضم مثل الشعور بالغثيان. لذلك، من الضروري تقليل الجرعة تدريجياً بحسب تعليمات الطبيب. يُمنع تناول الدواء في الظلام! تحقق من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. أعراض جانبية

كما هو الأمر بالنسبة لكل دواء، فإن استخدام كلونيريت قد يسبب أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. إذا لم تختف تلك الأعراض الجانبية أو إذا كانت تضايق أو إذا تفاقت، فينبغي استشارة الطبيب. لا تقزع لقراءة قائمة الأعراض الجانبية، فمن الممكن ألا تشير بأي منها.

معظم الأعراض الجانبية تختفي عادة بعد فترة التأقلم للمستحضر

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً، إذا ظهرت أعراض انسداد معوي كاذب الذي يسبب ألم مغص، تقيؤات وإمساك (نادراً).

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من مريض واحد من بين كل عشرة): دوار، تخرر (تشوش الرؤية، نعاس، إرهاق غير عادي)، الشعور بالدوار عند النهوض (نتيجة لانخفاض حاد في ضغط الدم)، جفاف في الفم.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى ١ - ١٠ مريض من بين كل ١٠٠): اكتئاب، اضطراب في النوم، وجع رأس، إمساك، غثيان، تقيؤ، آلام تحت الأذن (من غدة اللعاب)، مشاكل في الانتصاب، إرهاق.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى ١ - ١٠ مريض من بين كل ١٠٠): إدراك خاطئ للواقع، هلوسة، كوابيس، تغيير في الشعور في اليدين والقدمين، نبضات قلب بطيئة، متلازمة رينو (مشاكل في تدفق الدم إلى أصابع اليدين والقدمين)، طفح جلدي، حكة، الشرى، شعور عام سيء.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى ١ - ١٠ مريض من بين كل ١٠٠٠ مريض): تضخم الثديين لدى الرجال، جفاف في العينين، نبضات قلب غير اعتيادية وغير منتظمة، جفاف في الأغشية المخاطية في الأنف، تساقط الشعر، ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

أعراض جانبية لا تعرف مدى شيوعها (أعراض جانبية لم تتحدد نسبة شيوعها بعد): ارتباك، انخفاض في الرغبة الجنسية، مشاكل في الرؤية مثل تشوش في الرؤية، نبضات قلب بطيئة جداً.

في حال شعرت بأي أعراض جانبية غير تلك المذكورة في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام، فعليك مراجعة الطبيب على الفور!

٥. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر.
- شروط التخزين: يجب الخزن في ظل درجة حرارة تحت الـ ٢٥°C.

٦. معلومات إضافية:

بالإضافة للمادة الفعّالة، تحتوي الأقراص على المكونات التالية غير الفعّالة:

Corn starch, starch, lactose, calcium phosphate dibasic, silicon dioxide, povidone K25, magnesium stearate, indigotine blue (E132).

يحتوي كل قرص على ١٨ ملغ، تقريباً، من اللاكتوز.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة؟

أقراص مستديرة وصغيرة بلون أزرق فاتح، في أشرطة تعبئة تشمل ٣٠ قرص.

صاحب التسجيل: مختبرات رفا م.ض.، ص.ب. ٤٠٥، القدس ٩١٠٠٣٠١

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ٠٤٤٥٤٢٢١٨٣

تمّ فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قِبل وزارة الصحة في آذار ٢٠١٥.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.