

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

לוקטופ 0.1%

קָרָם

חומרים פעילים - Desonide 0.1% (דזונייד 0.1%).
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול בדלקות עור, כגון פסוריאזיס, התיילפות (התעבות והתקשות של העור-lichenification), דלקת עור אטופית (atopic dermatitis), דלקת עור שנגרמת ממגע (contact dermatitis), שדורשות טיפול מקומי בקורטיקו סטרואידים.

קבוצה תרפויטית:

גלוקוקורטיקואידים לטיפול מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

X אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אתה סובל מאקנה.
- אתה סובל מרזצאה.
- אתה סובל ממחלות זיהומיות של העור שנגרמות על-ידי נגיפים, (כגון הרפס, שלבקת חוגרת, אבעבועות רוח), על-ידי חיידקים (כגון אימפטיגו), על-ידי פטריות או על-ידי טפילים.

אם יש לך ספק כלשהו, עליך להתייעץ עם הרופא או עם הרוקח.

! אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אל תמרח על רקמות ריריות.
- אם לא ניכר שיפור בתום הטיפול, התייעץ עם הרופא שלך.
- אל תמרח על הפנים אלא אם קיבלת הנחיה מפורשת מהרופא שלך.

יש לפעול על פי ההמלצות שלהלן:

- בשל האפשרות שחלק מן החומר הפעיל יחדור לדם, הימנע ממריחה על שטח גדול או תחת חבישה אטומה.
- הימנע משימוש ממושך על העפעפיים, הפנים או כפלי הגוף.
- דווח לרופא שלך על כל גירוי או זיהום.
- אם מופיעה תגובה הנובעת מרגישות לתרופה, יש להפסיק את הטיפול.

- זehירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים. על הרופא לשקול היטב השימוש בילדים מעבר לשבועיים.
- שימוש בילדים ובמתבגרים חייב להיות מלווה במעקב רפואי.
- יש להקפיד ולהיזהר ממגע התרופה עם העיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף אותן היטב.
- תכשיר רפואי זה מכיל חומצה סורבית או אחד מן המלחים שלה והוא עלול לגרום לתגובות מקומיות בעור (למשל: אקזמה).

אם יש לך ספק כלשהו, אל תהסס להתייעץ עם הרופא או עם הרוקח.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

- אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שהינך בהריון או מתכננת להיכנס להריון, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת תרופות. הרופא שלך יחליט אם את יכולה להשתמש בתכשיר במהלך הריון או הנקה.
- אם הרופא אישר שימוש לאישה מניקה – אין לשים את התכשיר על החזה לפני ההנקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התכשיר מכיל חומצה סורבית (ראה סעיף 2, "זהירות בשימוש").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן השימוש יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מרח שכבה דקה על המקום הנגוע 2 פעמים ביום.
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות (יעלות ובטיחות לא הוכחו).

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש

שימוש מקומי.

מומלץ לפזר כמויות קטנות של הקרם, ולאחר מכן למרוח אותו בעזרת כפפת פלסטיק עד לספיגה מלאה

אם מרחת את הקרם בידיים חשופות, יש לשטוף את הידיים לאחר מכן.

אין לבלוע! לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

השתמש תמיד בקרם לוקטופ 0.1% לפי הנחיות הרופא. שימוש מופרז או ממושך בקורטיקו-סטרואידים לשימוש מקומי עלול להוביל להחמרת תופעות הלוואי ולסכנה שהחומר יחדור למחזור הדם.

דווח לרופא שלך באופן מיידי אם מרחת לוקטופ קרם:

- בכמויות גדולות מאלה שנרשמו לך,
 - למשך זמן רב יותר מכפי שמצוין במרשם שלך.
- אל תפסיק את הטיפול באופן פתאומי. יש להפסיק את הטיפול באופן הדרגתי, תחת פיקוח רפואי.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. מרח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בלוקטופ 0.1% עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

- כאשר משתמשים בתרופה לאורך זמן, העור עלול להפוך לדק ושברירי, כלי דם קטנים עלולים להתרחב, ואתה עלול לפתח סימני מתיחה, אקנה, ואדמומיות, גירוי בעור שסביב הפה שלך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il

או ע"י כניסה לקישור :

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.
- גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-30°C. ניתן להשתמש בלוקטופ 0.1% עד חודש לאחר הפתיחה
- אחסן באריזה המקורית.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד יש להפטר מהתרופה. זה יסייע לשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

White soft paraffin, Cetomacragol emulsifying wax, liquid paraffin, sorbic acid, sodium edetate, propyl gallate, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

גרם לבן חסר ריח, משווק בשפופרת של 30 גרם.

בעל הרישום: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, לח"י 29, בני-ברק

היצרן:

Pieere-Fabre Medicament production, 45 Place Abel Gance, F-45500, Boulogne Cedex, France

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 130-83-30307.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 20 באוקטובר 2015.
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.