

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها

فُحص ورُخص من قبلها في حزيران ٢٠٠٧

أفلوميسين كريم

Prednisolone 0.5%
Gentamicin sulphate 0.16%

التركيب:

المواد غير الفعالة:

Sorbitan mono stearate, polysorbate 60, synt. spermaceti, cetostearyl alcohol, 2-octyldodecanol, benzyl alcohol, purified water.

تأثيرات الدواء الطبية:

يحتوي الدواء على مادتين فعاليتين: جنتاميسين - هي من المضادات الحيوية وذات تأثير واسع المدى ومادة البيريدنوزولون - هي مادة كورتيكosteroidية ذات تأثير مضاد للإلتهاب. إن الدمج ما بين المادتين يمنح المستحضر النجاعة والكافأة لمعالجة التهابات الجلد الموضعية والمختلطة بتلوثات باكتيرية.

متى لا يجوز لك استعمال الدواء؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته. كما لا يجوز استعماله في حالات التلوثات الفيروسية (كالهربس أو جدري الماء)، الفطرية أو سل الجلد.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً في الحالات التالية:

عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.

اذا كنت تعاني/ن أو اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة جهاز المناعة، السكري (في الاستعمال الطويل الأمد)، خلل في السمع.

تحذيرات: يجب ابلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك ل الطعام أو عقاقير قبل استعمال الدواء. لا يجوز استعمال الدواء لهدف مغاير لما وصف له.

لا يجوز استعمال الدواء على مساحات واسعة من الجلد أو على الجروح المفتوحة أو الملوثة. تجنب تطبيق الدواء بالعينين وإن حدث ذلك خطأ يجب غسلهما جيداً مع الماء حالاً. إن استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والراهقين يتطلب اتخاذ الحذر بشكل خاص. كما أن استعمال هذا الدواء لدى هذه الفئة من الأعمار يتطلب المراقبة الطبية.

التفاعلات بين الأدوية: اذا كنت تتعاطى/ن دواءً اضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالشعور بالحرقة، وخزات، تهيج، جفاف الجلد، غزارة الشعر، التهابات جلدية تشبه حب الشباب، إنخفاض في تصبغ الجلد. تختفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء. أما اذا استمرت هذه الأعراض و/أو اذا كانت مزعجة، يجب مراجعة الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً: في حالات زيادة الحساسية للدواء والتي ترافقها تهييجات موضعية، تطور تلوث موضعي، التهاب أو طفح في مكان العلاج أو في حالات تفاقم الوضع (نادرًا): توقف /ي عن العلاج وراجع /ي الطبيب. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

التبلیغ عن اعراض جانبية:

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

بالإضافة، بإمكان تبلیغ شركة پيریچو بواسطة العنوان التالي:
www.perrigo-pharma.co.il

المقادير الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.

المقادير الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: ادهن /ي طبقة رقيقة بلطف من الكريم على المنطقة المصابة ٤ مرات في اليوم. أثناء فترة العلاج يجب تخفيض المقادير الدوائية تدريجياً وذلك حسب توصيات الطبيب. لا تتجاوز /ي المقادير الموصى بها.

يجب مراجعة الطبيب ثانية اذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال أسبوع. يجب معالجة الرضع والأطفال دون ٤ سنين من العمر بهذا الدواء، لفترة لا تزيد عن ٣ أسابيع، خاصة المناطق المغطاة بالحفاضات. يجب الامتناع عن استعمالضمادات المسوددة في المنطقة المصابة إلا اذا وصف الطبيب ذلك (تعتبر الحفاضات البلاستيكية للرضيع ضمادات مسدودة).

انتبه /ي! هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط. يجب الامتناع عن تماس الدواء بالعينين أو الأنسجة المخاطية (الفم والأنف). انظر /ي إلى فقرة "التحذيرات".

تجنب /ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم.
اذا بلع الطفل /ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحبًا /ة عبوة الدواء.

لا تسبب /ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.
لا تعط /ي من الدواء الى أقاربك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول /ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول /ين فيها دواء.
ضع /ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد، دون ٢٥ درجة مئوية.
بإمكان الاستعمال لفترة ٦ أشهر بعد الفتح الأولي.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٤٩٢٨ - ١٢٥٩١

المنتج: پيریچو إسرائيل فارماسيтика م.ض..، ص.ب. ١٦، يروحم.