

אדווקט לחתולים וחמוסים וטרינרי
ADVOCATE FOR CATS and FERRETS VETERINARY

חייב מרשם רופא וטרינר
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

שם התכשיר

אדווקט לחתולים וחמוסים וטרינרי
אדווקט ספוט און לחתולים קטנים וחמוסים.
אדווקט ספוט און לחתולים גדולים.

אדווקט תמיסה לשימוש חיצוני

הרכב:

כל מ"ל מכיל:
100 mg imidacloprid
10 mg moxidectin

חומרים בלתי פעילים: בנזיל אלכוהול, 0.1% בוטיל הידרוקסי טולואן (E321 כנוגד חימצון), פרופילן קרבונט

קבוצה תרפויטית:

אימידקלופריד – נוגד חרקים בעל מבנה הדומה לניקוטין
מוקסידקטין – נוגד טפילים

התוויות:

לחתולים הסובלים מהדבקה, או נמצאים בסיכון להדבקה, של הטפילים הבאים:
לטיפול ומניעה של הדבקה בפרעושים (*Ctenocephalides felis*),
טיפול נגד אקריות אוזניים (*Otodectes cynotis*),
לטיפול בגרד נוטואדרי בחתולים (notoedric mange) הנגרם ע"י הקרדית *Notoderes cati*
מניעה של מחלת תולעת הלב (זחלים בשלב L3 ו-L4 של *Dirofilaria immitis*)
טיפול נגד תולעי מעיים עגולות (שלב L4, בוגרים לפני הבשלה ופרטים בוגרים של התולעים *Toxocara cati*, ו-*Ancylostoma tubaeforme*).
מוצר יכול לשמש כחלק ממערך הטיפול נגד אלרגיה לפרעושים (FAD).

לחמוסים הסובלים מהדבקה, או נמצאים בסיכון להדבקה של הטפילים הבאים:
לטיפול ומניעה של הדבקה בפרעושים (*Ctenocephalides felis*) ולמניעה של מחלת תולעת הלב (זחלים בשלב L3 ו-L4 של *Dirofilaria immitis*).

התוויות נגד

אין להשתמש בגורי חתולים בני פחות מ 9 שבועות.
אין להשתמש במקרה של רגישות לחומרים הפעילים או לחומר כלשהו מהחומרים הבלתי פעילים.

לחמוסים: אין להשתמש ב"אדווקט לחתולים גדולים" (0.8 מ"ל), או "אדווקט לכלבים" מכל גודל שהוא.
לכלבים, יש להשתמש במוצר "אדווקט לכלבים", המכיל 100 מ"ג/מ"ל אימידקלופריד ו-25 מ"ג/מ"ל מוקסידקטין, בגודל המתאים.

תופעות לוואי:

תדירות תופעות הלוואי מוגדרת בהתאם לכללים הבאים:
- שכיחות מאד (very common) (יותר מחיה אחת מ 1 מתוך 10 מפתחת את תופעת הלוואי במהלך הטיפול)
- שכיחות (common) (יותר מחיה אחת אך פחות מ 10 חיות מתוך 100)
- לא שכיחות (uncommon) (יותר מחיה אחת אך פחות מ 10 חיות מתוך 1000)
- נדירות (rare) (יותר מחיה אחת אך פחות מ 10 מתוך 10,000)
- נדירות מאד (very rare) (פחות מחיה אחת מתוך 10,000, כולל דיווחים מבודדים)
שימוש במוצר עלול לגרום לגרד חולף בחתולים. במקרים נדירים עלולים להופיע פרווה שמנונית, אריתמה והקאות. סימנים אלה נעלמים ללא טיפול. במקרים נדירים, עלול המוצר לגרום לתגובה של רגישות יתר מקומית. אם החתול מלקק את נקודת הטיפול לאחר השמת החומר עלולים להופיע, סימנים עצביים (שרובם חולפים), כגון: אטקסיה, רעד של הגוף, סימנים עיניים (אישונים מורחבים, רפלקס אישונים מוחלש, ניסטגמוס), בעיות בנשימה, ריור והקאה עלולים להופיע במקרים נדירים מאד.

לתכשיר טעם מר, אם חיית המחמד מלקקת את מקום הטיפול מיד לאחר השמת החומר, יכול להופיע לעיתים ריוח. זה לא סימן להרעלה והוא נעלם תוך מספר דקות ללא טיפול. השמה נכונה תצמצם את הסיכוי לליקוק של נקודת ההשמה.
לעיתים נדירות מאוד, יכול המוצר לגרום לתחושה, בנקודת ההשמה, שתגרום לשינויים התנהגותיים חולפים, כגון: עייפות, חרדה וחוסר תאבון.
במקרה של בליעת החומר יש לטפל בצורה סימפטומטית על ידי וטרינר/ית. לא ידוע חומר נגד (אנטידוט) ספציפי. שימוש בפחם פעיל עשוי להועיל.
במידה ומבחינים בתופעות לוואי חמורות או אחרות כלשהן יש לדווח לווטרינר/ית

מיועד לשימוש ב: חתולים, חמוסים.

מינון והגשה לחתולים:

לשימוש חיצוני בלבד.
על מנת למנוע ליקוק, יש לשים את החומר בנקודה אחת בלבד, רק באזור העורף, בנקודת החיבור לגולגולת.

תכנית הטיפול

המנה המומלצת הקטנה ביותר היא 10 מ"ג/ק"ג משקל גוף אימידקלופריד ו-1 מ"ג/ק"ג משקל גוף מוקסידקטין, שווה ערך ל- 0.1 מ"ל/ק"ג משקל גוף אדווקט לחתולים.

תכנית הטיפול צריכה להתבסס על אבחון וטרינר אינדיבידואלי ועל המצב האפידמיולוגי המקומי.

מוקסידקטין (מ"ג/ק"ג)	אימידקלופריד (מ"ג/ק"ג)	נפח השפופרת	גודל השפופרת הדרוש	משקל החתול (ק"ג)
לפחות 1	לפחות 10	0.4	אדווקט לחתולים קטנים	עד 4 ק"ג, (כולל)
2 - 1	20 - 10	0.8	אדווקט לחתולים גדולים	מעל 4 ק"ג עד 8 ק"ג (כולל)
צירוף שפופרות בהתאם למשקל החתול				מעל 8 ק"ג

פרעושים – טיפול ומניעה

טיפול אחד מונע נגיעות בפרעושים למשך עד 4 שבועות. גלמים של פרעושים שהיו בסביבה לפני הטיפול עשויים להמשיך לבקוע במשך 6 שבועות או יותר לאחר הטיפול, בהתאם לתנאי האקלים. לכן יתכן שיהיה צורך לשלב יחד עם הטיפול באדווקט גם טיפול הדברה סביבתי. הדבר יכול להביא להפחתה מהירה יותר של אוכלוסיית הפרעושים בבית.

כאשר המוצר משמש כחלק ממערך טיפול באלרגיה לפרעושים יש לשים אותו פעם בחודש בקביעות.

טיפול באקריות אזניים (Otodectes cynotis)

יש לשים מנה אחת. מומלץ לבצע בדיקה וטרינרית 30 יום לאחר הטיפול, שכן לעיתים יש צורך בטיפול שני. אין לשים את החומר ישירות לתוך תעלת האוזן.
לטיפול בגרד נוטואדרי בחתולים (notoedric mange) הנגרם ע"י הקרדית *Notoderes cati* יש לתת מנה אחת.

תולעת הלב – מניעה

חתולים החיים באזורים הנגועים בתולעת הלב או שביקרו באזורים כאלה, עשויים להיות נגועים בתולעי לב בוגרות, לכן **לפני** טיפול באדווקט יש לשקול את ההמלצה המופיעה בסעיף "אזהרות מיוחדות". למניעת מחלת תולעת הלב חובה לשים את המוצר פעם בחודש בקביעות בתקופת השנה בה פעילים היתושים (שהם הפונדקאי המשני שנושא ומעביר את זחלי תולעת הלב). יש לטפל במוצר במשך כל השנה או לפחות חודש אחד לפני החשיפה הצפויה ליתושים. יש להמשיך בטיפול בקביעות, פעם בחודש, עד חודש אחרי החשיפה האחרונה ליתושים. על מנת לבסס שיגרת טיפול מומלץ לשים את החומר בקביעות באותו תאריך בכל חודש. כאשר הטיפול באדווקט בא להחליף טיפול בחומר אחר נגד תולעת הלב, יש לשים את הטיפול הראשון באדווקט תוך חודש מאז הטיפול האחרון בחומר האחר.
באזורים שאינם נגועים בתולעת הלב, לא אמור להיות סיכון לחתולים לחלות בתולעת הלב, לכן ניתן לטפל בהם ללא שיקולים מיוחדים.

טיפול בתולעים עגולות ותולעי וו (hookworms)

באזורים נגועים בתולעת הלב טיפול חודשי עשוי להפחית באופן משמעותי את הסיכון להדבקה חוזרת גם בתולעים עגולות ותולעי וו. באזורים שאינם נגועים בתולעת הלב ניתן להשתמש במוצר כחלק מתכנית טיפול מונע עונתי נגד פרעושים ותולעי מעיים עגולות.

מינון והגשה לחמוסים:

שפופרת אחת של "אדווקט ספוט-און לחתולים קטנים" (0.4 מ"ל) לחמוס. אין לעבור על המנה המומלצת. תכיפות הטיפול צריכה להיקבע על פי מצב ההדבקה המקומי.

פרעושים – טיפול ומניעה


טיפול אחד מונע הדבקה נוספת בפרעושים למשך 3 שבועות. במקרים של לחץ פרעושים כבד, יתכן שיהיה צורך לחזור על הטיפול כעבור שבועיים.

תולעת הלב – מניעה


חמוסים החיים באזורים הנגועים בתולעת הלב או שביקרו באזורים כאלה, עשויים להיות נגועים בתולעי לב בגרות. לכן **לפני** טיפול באדווקט יש לשקול את ההמלצה המופיעה בסעיף "אזהרות מיוחדות". למניעת מחלת תולעת הלב חובה לשים את המוצר פעם בחודש בקביעות בתקופת השנה בה פעילים היתושים (שהם הפונדקאי המשני שנושא ומעביר את זחלי תולעת הלב). אפשר לטפל במוצר במשך כל השנה או לפחות חודש אחד לפני החשיפה הצפויה ליתושים. יש להמשיך בטיפול בקביעות, פעם בחודש, עד חודש אחרי החשיפה האחרונה ליתושים. באזורים שאינם נגועים בתולעת הלב, לא אמור להיות סיכון לחמוסים לחלות בתולעת הלב, לכן ניתן לטפל בהם ללא אמצעי זהירות מיוחדים.

עצות לשימוש נכון

להוציא שפופרת מהאריזה, להחזיק אותה עומדת, לסובב ולמשוך את הפקק כלפי מעלה. להפוך את הפקק ולהדק אותו חזרה לשפופרת. לסובב את הפקק כך שהאטם ישבר ולאחר מכן להסיר את הפקק מהשפופרת, כפי שמודגם בציור.



יש להפריד את הפרווה באזור בסיס הגולגולת, עד לחשיפת העור. יש להניח את קצה השפופרת על העור וללחוץ אותה בחוזקה מספר פעמים, על מנת לרוקן את כל תוכנה ישירות על העור. השמת החומר באזור בסיס הגולגולת תצמצם את האפשרות שבעל החיים ילקק את החומר. יש לשים את החומר רק על עור שאינו פגוע.



אחסון

הרחק מראייתם ומהישג ידם של ילדים. אין לאחסן בטמפרטורה של מעל 25 מעלות צלזיוס. לא להשתמש לאחר תאריך תפוגת התוקף המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון בחודש.

אזהרות מיוחדות

יעילות הטיפול לא נבדקה בחמוסים השוקלים מעל 2 ק"ג, לכן יתכן שיהיה צורך בטיפול בתדירות גבוהה יותר בבעלי חיים אלה.

מגע קצר של בעל החיים המטופל עם מים, פעם או פעמיים בין הטיפולים החודשיים, לא סביר שיפגע באופן משמעותי ביעילות הטיפול, אולם חפיפות תכופות בשמפו או טבילות תכופות של בעל החיים במים לאחר הטיפול עלולים להפחית את יעילות הטיפול.

עמידות של טפילים לכל סוג של תכשיר נוגד טפילים עשויה להתפתח לאחר טיפול תכוף וחוזר בנוגד טפילים מאותו סוג. לפיכך, השימוש בתכשיר זה צריך להתבסס על הערכה של כל מקרה אינדיבידואלי ועל מידע אפידמיולוגי מקומי על הרגישות הנוכחית של זני המטרה על מנת להגביל את האפשרות של עמידות. השימוש בתכשיר צריך להתבסס על אבחנה מאושרת של זיהום מעורב (או סיכון לזיהום, כאשר ההתוויה למניעה) באותו זמן (ראה גם פרקים "התוויות" ו"מינון והגשה").

טיפול בחתולים השוקלים פחות מ- 1 ק"ג, או בחמוסים השוקלים פחות מ- 0.8 ק"ג, צריך להיות מבוסס על שיקולי סיכון-תועלת.

יש מעט ניסיון לגבי השימוש במוצר על בעלי חיים חולים או חלשים, לכן יש להשתמש במוצר על בעלי חיים כאלה רק בהתבסס על שיקולי סיכון-תועלת.

יש לשים לב שתוכן השפופרת לא יבוא במגע עם העיניים או הפה של בעל החיים המטופל ו/או של בעלי חיים אחרים. אין לאפשר לבעלי חיים שזה עתה טופלו ללקק זה את זה. יש למנוע בליעה של החומר על ידי כלבים מהגזעים קולי, כלב רועים אנגלי עתיק (Old English Sheepdog), או גזעים קרובים או כלבים מתערבות של גזעים אלו.

מומלץ כי חתולים וחמוסים החיים באזורים נגועים בתולעת הלב או חתולים/ חמוסים המבקרים באזורים כאלו, יטופלו פעם בחודש בחומר על מנת להגן עליהם ממחלת תולעת הלב. למרות שהדיוק של אבחון של מחלת תולעת הלב מוגבל, מומלץ לנסות לברר את מצב ההדבקה בתולעת הלב של כל חתול או חמוס מעל גיל 6 חודשים, לפני תחילת הטיפול המונע, שכן טיפול בחתול או חמוס שמדבק בתולעים בוגרות עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות ואף למוות. במידה ואובחנה נגיעות בתולעי לב בוגרות יש לטפל על פי הידע המדעי העדכני.

בחתולים מסויימים הזיהום ב *Notoedres cati* עלול להיות חמור. במקרים חמורים אלו יש צורך בטיפול תומך בו זמנית כיוון שייטכן שטיפול בתכשיר זה בלבד לא יספיק למנוע מוות של החיה.

אזהרות למטפל

יש למנוע מגע של החומר עם העור, העיניים או הפה.

אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השמת החומר.

יש לשטוף ידיים היטב לאחר הטיפול.

אין ללטף או לסרק את בעל החיים עד להתייבשות אזורי הטיפול.

במקרה של שפיכה על העור יש לשטוף מיד היטב במים וסבון.

על אנשים עם רגישות ידועה לאחד מהחומרים: בנזיל אלכוהול, אימידקלופריד או מוקסידקטין להשתמש במוצר בזהירות. במקרים נדירים מאוד המוצר יכול לגרום לרגישות עורית או לתגובה עורית חולפת (למשל אלרגיה, גירוי או עקצוצים).

אם חדר בטעות מוצר לעיניים יש לשטוף אותן היטב בכמות גדולה של מים.

אם הגירוי בעור או בעיניים נמשך, או אם נבלע חומר בטעות יש לפנות לסיוע רפואי מיידי ולהראות את העלון או התווית לרופא/ה.

הממס שבאדווקט עלול להכתים חומרים מסויימים כגון עור, בדים, פלסטיק ומשטחים בעלי גימור. יש לאפשר מגע עם חומרים כגון אלה רק לאחר התייבשות החומר.

הריון והנקה:

בטיחות המוצר בזמן הריון והנקה לא נקבעה. מבחני מעבדה שנערכו עם אימידקלופריד או עם מוקסידקטין בחולדות וארנבים לא הראו טרטוגניות (teratogenic) או תופעות רעילות לעובר (foetotoxic) או רעילות לאם (maternotoxic). יש להשתמש על פי הערכת סיכון – תועלת בלבד, ע"י הוטרינר/ית האחראי/ת.

אינטראקציות עם תרופות אחרות:

במהלך השימוש באדווקט אין להשתמש בחומר אחר מקבוצת antiparasitic macrocyclic lactone. לא נצפו אינטראקציות בין אדווקט ותרופות וטרינריות נפוצות אחרות או פרוצדורות רפואיות או ניתוחים.

מינון יתר (תסמינים, טיפול חירום, חומרי נגד):

מנה של עד פי 10 מהמנה המומלצת נסבלה היטב בחתולים ללא עדות לתופעות לוואי. התכשיר ניתן לגורי חתולים במנה עד פי 5 מהמנה המומלצת, כל שבועיים למשך 6 טיפולים, ללא בעיות בטיחות חמורות. תופעות חולפות של התרחבות האישון, ריור, הקאה ונשימה מואצת נצפו. לאחר בליעה בטעות או מתן מינון יתר, סימנים עזביים (רובם חולפים) כגון: חוסר שליטה בשרירים, רעידות, סימנים עיניים (אישונים מורחבים, רפלקס אישוני קטן, ריצוד של העיניים-ניסטגמוס), נשימה לא נורמלית, ריור והקאה עלולים להתרחש במקרים נדירים מאד. התכשיר ניתן לחמוסים במנה עד פי 5 מהמנה המומלצת, כל שבועיים למשך 4 טיפולים, ללא עדות לתופעות לוואי. במקרה של בליעה בטעות, יש לטפל באופן סימפטומטי. לא ידוע על חומר נגד ספציפי. השימוש בפחם פעיל יכול להביא תועלת.

אזהרות בנוגע להשלכת תכשיר שלא השתמשו בו או חומרי פסולת אין לזרוק תרופות למערכת הביוב או לאשפה הביתית. התייעץ עם הוטרינר כיצד להפטר מתרופה שאינה נחוצה יותר, על מנת לעזור לשמור על הסביבה.

מידע נוסף

אימידיקלופריד יעיל נגד זחלי פרעושים ופרעושים בוגרים. זחלי פרעושים בסביבת בעל החיים נקטלים עקב מגע עם בע"ח שמטופל בחומר.

למידע נוסף על החומר יש לפנות ללידור כימיקלים בע"מ.

מספר רישום: 142-39-92432-00

יצרן: Bayer Animal Health GmbH, גרמניה.

בעל הרישום: לידור כימיקלים בע"מ רח' הנביאים ת.ד. 116 רמת השרון 47100

הפצה: ווטמרקט שיווק בע"מ, דרך החורש 23 פארק תעשיות חבל מודיעין