

Abicolin 500 Veterinary

אביקולין 500 וטרינרי

**100 גרם אבקה מסיסה
לשימוש וטרינרי בלבד**

יש להכין תמיסה טרייה לכל 24 שעות טיפול.
אזהרות: אין להזריק! המתן דרך הפה בלבד.
אין להגיש את התכשיר למטילות ביצי מאכל
וביצי רבייה - בהטלה.
זמן המתנה: אין להגיש את התכשיר במשך 4

ימים לפני השחיטה.
אחסנה: מתחת ל- 25°C Store below 25°C
פורסט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

יצרן ובעל הרישום:
אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, ת.ד. 489 בית שמש
מס' רישום: 080-88-92058-01

הרכב: כל 1 גרם מכיל:

Colistin Sulfate 5,000,000 IU

חומר בלתי פעיל: Lactose

התוויות: טיפול בזיהומים במערכת העיכול
הנגרמים ע"י חיידקים גרם שליליים
הרגישים לקוליסטין בתרנגולי הודו.

מינון והגשה:

בהתאם להוראות הרופא הוטרינר.

100 גרם אביקולין (500 מיליון יב"ל

קוליסטין סולפט) לכל 1,000 ליטר מי שתייה

במשך 4-5 ימים רצופים.

להגיש כמקור יחיד למי שתייה בזמן הטיפול.



טלפון: 080-88-92058

טלפקס: 080-88-92058

0804622-03

ר-ס-ס
חייב מרשם רופא
ملزم بوصفة طبيب
Prescription only medicine

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה
על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא
בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה
לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

אוביקו

A Division of **Phibro** ישראל