

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبية

N-كينف، جل

1) اسم الدواء، شكلة وقوته:

اسم الدواء: N-كينف

الشكل: جل.

تركيب المادة الفعالة وتركيزها في وحدة جرعة:

ديكلوفيناك صوديوم 1%
(Diclofenac Sodium 1%)

لقائمة المواد غير الفعالة والمواد مسببة الحساسية في المستحضر - راجع البند 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للذكور (للرجال وللنساء على حد سواء) وللمراهقين ما فوق عمر 12 سنة. دون هذا السن يجب مراجعة الطبيب. عليك إستعمال الدواء بالشكل الصحيح. إبشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 7 أيام.

لأي غرض مخصص الدواء؟ الدواء مخصص لعلاج موضعى للأمراض الروماتيزمية وعلاج موضعي للألم والإلتهاب غير المعدى.

الفصيلة العلاجية: مضادات إلتهاب غير ستيرونيدية (NSAID's).

2) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. المادة الفعالة تظهر في البند 1 والمركبات الإضافية مفصلة في البند 6.

- إذا كنت حاملاً أو مريضاً.

- إذا حدث لديك في الماضي رد فعل تحسسي لدىكلوفيناك أو لأحد مركبات الدواء أو لأدوية أخرى لعلاج الألم، السخونة أو الإلتهاب مثل: حامض أسيتيل ساليساليك أو إيبوبروفن أو أدوية أخرى من فصيلة NSAID's. أعراض رد الفعل التحسسي تتشمل: الربو (ازمة)، ضيق التنفس، صفير أثناء التنفس، طفح جلدي، تورم الوجه أو اللسان، رشح الأنف.

- على جروح مفتوحة أو جلد متهدج. كذلك، يجب تجنب ملامسة العينين والأغشية المخاطية.

- قريباً (مباشرة قبل و/أو بعد) من موعد عملية مجازة الشريان التاجي.

- من النوع أن تستخدم بنفس الوقت أدوية أخرى من فصيلة NSAID's المتناولة عن طريق الفم، أو أدوية تحتوي على ديكلافيناك (أنظر أيضاً فيما بعد بهذا الفصل).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

- لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ

الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

- لا يوصى بإستعمال هذا الدواء على مساحات واسعة من الجلد بدون إستشارة الطبيب.

- خلال فترة العلاج يجب الإمتناع عن تعريض المنطقة المعالجة لضوء الشمس الطبيعي أو التسفع بمصباح UV. لم يتم فحص سلامة الإستخدام في نفس الوقت (على نفس منطقة العلاج) بديكلوفيناك الصوديوم ومستحلب للحماية من أشعة الشمس، مستحضرات التجميل وأدوية أخرى لعلاج الجلد.

- لتجنب ظهور أعراض جانبية يجب إستعمال أصغر كمية ممكنة من الدواء التي تعطي التأثير المرغوب، وإلقصر فترة زمنية ممكنة.

- لا يوصى بإستعمال الدواء في حالة مرض كلوي حاد. إذا استعملت الدواء بالرغم من ذلك، فيجب إجراء مراقبة حثيثة لأداء الكلى.

قبل العلاج بالدواء **بلغ الطبيب**: إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خل في أداء: الكبد، الكلوي، الجهاز الهضمي (قرحة مثلاً)، القلب، إرتفاع ضغط الدم، الربو. إذا كنت تتناول أو إذا قد تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكممات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية:

- حامض أسيتيل-ساليساليك، ساليسيلات أخرى وأدوية مضادة للإلتهاب لا ستيرونيدية أخرى (من فصيلة - NSAID's).

- مضادات حيوية، أدوية لمعالجة الصرع، المدرات البولية، أدوية لمعالجة إرتفاع ضغط الدم من فصيلة مثبطات ACE، لينتوم، ميتوتريكسات، سيكلوسورين.

الحمل والرضاعة: لا تستعمل هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو مريضة.

السيافة واستعمال الماكولات: لا يوجد تأثير على قدرة السيافة وتشغيل الماكولات.

3) كيف ستنستعمل الدواء؟

يجب الإستعمال دائمًا وفقاً للتعليمات. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من كيفية الإستعمال.

الجرعة المتبعة عادة هي: قم بتدليك كمية صغيرة من الدواء داخل الجلد في منطقة الألم وأو التورم 3-4 مرات في اليوم. تتعلق كمية الدواء بحجم المنطقة المصابة. عادة ما تكفي كمية بحجم يتراوح بين حبة الكرز والجوز (4-2 غرام). من الممكن أن تشعر ببرودة طفيفة أثناء تدليك الدواء.

اغسل يديك بعد إستعمال الدواء إلا إذا كانتا المكان المعالج.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال دون عمر 12.

فترقة العلاج تتعلق بالإصابة وبالاستجابة للعلاج. لا يجوز إستعمال هذا الدواء لأكثر من 14 يوماً لإصابات الأنسجة الرخوة أو لأمراض روماتيزمية بالأنسجة الرخوة إلا بتوصية من الطبيب.

إذا لم يطرأ تحسن في حالتك خلال 7 أيام أو إذا حصل تفاقم، يجب مراجعة الطبيب.

يجب الإمتناع عن إستعمال أدوية إضافية لدهن على المنطقة المعالجة بهذا الدواء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

صداع (نادراً): أوقف العلاج وراجع الطبيب.
إذا ظهرت أحدي الاعراض الجانبية او تفاقمت، أو عندما
تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك
استشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة
بواسطة النموذج على الإنترن特 للتبليغ عن اعراض جانبية
الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة:
www.health.gov.il

أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?form-Type=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5) كيف ينبغي تخزين الدواء؟

امن التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان
مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال، وبالتالي
تعذر إصابتهم بالتسمم. لا تسبب النقيؤ بدون تعليمات
صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
(Exp. Date) الظاهر على الأنبوة أو العلبة. يشير
تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين في مكان بارد بدرجة
حرارة أقل من 25 درجة مئوية. لا يجوز التجميد.
بعد الفتح الأولى للأنبوب، بالإمكان إستعمال الدواء لمدة
سنة واحدة (12 شهراً).

6) معلومات إضافية:

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على المواد
غير فعالة التالية:

Purified Water, Propylene Glycol, Diethylene Glycol Monoethyl Ether, Coco-Caprylate/Caprate, Macrogol Cetostearyl Ether, Carbomer, Essence Lavender, Methylhydroxybenzoate, Propylhydroxybenzoate, Strong Ammonia Solution

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: يظهر الدواء
كجل، بلون أبيض ضارب إلى الصفرة (لون العاج). الجل
معيناً في أنابيب معدنية مغلقة مع غطاء لولبة من البلاستيك.
كل أنبوبة معبأة في علبة من الكرتون.

صاحب الإمتياز: تريي أوف ليف فارما محدودة الضمان،
شركة خاصة 513071621، ص.ب. 799، الد
7110604.

المنتج : تريما، منتجات طبية إسرائيلية معبروت م.ض.
كيوبون معبروت بمشاركة بن شمعون فلوريش م.ض،
ترديون.

حددت صيغة هذه النشرة من قبل وزارة الصحة
وقد فحص محتواها ورُخص من قبلها في تاريخ:
6/2016

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة
الصحة: 140.07.31948.00

من أجل التسهيل وتيسير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة
بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص
للجنسين على حد سواء.

لا يجوز وضعه على جلد مصاب أو على جروح مفتوحة،
واحذر إلا يلامس الدواء العينين والأنسجة المخاطية. إذا
حدث هذا الأمر، فيجب غسل العينين بالماء وإبلاغ الطبيب.
يمكن دهن الدواء تحت الضمادة ولكن ليس تحت ضمادة
غير منفذة للهواء.

الفحوص والمتابعة:

عندما يتم دهن الدواء بحسب تعليمات الطبيب، بجرعة
كبيرة أو لفترة زمنية طويلة، فيوصى بإجراء فحوص
مخبرية (دم، بول، وظائف الكبد والكلى) وذلك للتأكد
من أن نتائج الفحوص هي ضمن المجال السليم. يحتمل
ارتفاع إنزيمات الكبد الذي يلزم بوقف العلاج بعد استشارة
الطبيب.

إذا استعملت وجة مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من
الدواء، توجه في الحال إلى غرفة الطوارئ في المستشفى
وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز
دهن جرعة مضاعفة. إدهن الجرعة في أقرب وقت ممكن
والجرعة القادمة في الوقت المعتمد.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! افحص اللاصقة
والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء.
ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر
الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، فإن إستعمال هذا الدواء قد يسبب أعراضًا
جانبية لدى بعض المستعملين. لا تخف من قائمة الأعراض
الجانبية. من الممكن لا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه في الحال إلى الطبيب
أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، إذا تطورت الأعراض
التالية:

- طفح جلدي شديد ترافقه ثاليل وشرى مدة.
- ضيق أو صعوبات في التنفس، ربو (ازمة).
- تورم الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة.

- طفح جلدي نقشري واسع (Exfoliative Dermatitis)، طفح واسع الإنتشار مع حويصلات
وتقشر الجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين
والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس جونسون)،
وشكل أشد للطفح يؤدي لتقشر واسع بالجلد (TEN).

أعراض جانبية إضافية:

تظهر في أوقات متقاربة بنسبة إنتشار تصل حتى 100:1:
(التهاب الجلد، يشمل التهاب الجلد التماسي)،
طفح جلدي، إحمرار الجلد، إكزيما، حكة.
أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة جداً: حساسية زاندة
لضوء الشمس. الأعراض المحتملة هي: حرقة شمسية
ترافقها حكة، تورم وحويصلات.

في حالة شك بحدوث إضطرابات في أداء الكبد التي يمكن
أن تظهر على شكل غثيان، إرتفاع إنزيمات ترانساميناز
(إنزيمات الكبد)، هبوط، نعاس، إسهال، حكة، يرقان
(اصفار الجلد والعينين)، حساسية في الجانب العلوي
الأيمن من البطن وأعراض تشبه الإنفلوانزا أوقف العلاج
وتوجه حالاً إلى الطبيب.

عند الإستعمال على مساحات واسعة من الجلد ولفتره
طويلة، من الجائز أن يحدث إمتصاص إلى جهاز الدم.
في هذه الحالة قد تظهر أعراض جانبية التي تميز الدواء
عندما يتم تناوله عبر الفم: غثيان وإضطرابات في الجهاز
الهضمي، طفح جلدي، إضطرابات في أداء الكبد، دوار،