

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها

فُحص ورُخص من قبلها في كانون الأول ٢٠٠٢

دو أو - سكايل كريم

التركيب: Crotamiton 10%
Sulphur precipitated 8%

المواد غير الفعالة:

Sorbitan monostearate, polysorbate 60, cetyl esters wax, cetostearyl alcohol, octyldodecanol, benzyl alcohol, purified water

تأثيرات الدواء الطبية:

لمعالجة الجرب والمناطق التي تحك على سطح الجلد.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو لأدوية الجلد الأخرى المخصصة للعلاج الموضعي.
لا يجوز إستعمال هذا الدواء على جلد ملتهب بصورة حادة أو رطبة أو جلد متشقق.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل.

تحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء. يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين وإن حصل ذلك خطأ يجب غسلهما جيداً بالماء. كما يجب على النساء المرضعات الإمتناع عن دهن هذا الدواء في منطقة حلمة الثدي والمناطق المجاورة لها.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصةً بما يتعلق بمستحضرات التجميل التي قد تسبب جفاف الجلد.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كالإحمرار أو تقشر الجلد.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً: تهيج، طفح جلدي أو إلتهاب موضعي (لم تكن هذه الأعراض قبل إستعمال الدواء) - (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

بالإضافة، بالإمكان تبليغ شركة بيريجو بواسطة العنوان التالي: www.perrigo-pharma.co.il

المقادير الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.

المقادير الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: أنظر/ي إلى فقرة "إرشادات الإستعمال".

المقادير للأطفال: لدى الأطفال دون ٣ سنين من العمر، لا يجوز دهن هذا الدواء أكثر من مرة واحدة في اليوم. لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها.

إنتبه/ي! هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط. يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين، الأنسجة المخاطية (كالفم والأنف).

إرشادات الإستعمال: قبل إستعمال هذا الدواء يجب الإغتسال بالماء الساخن وتنشيف الجسم جيداً. ثم ادهن/ي مقداراً من الكريم على اليدين وافرك/ي كل الجسم، من الذقن حتى أطراف الأصابع، بما في ذلك طيات الجلد والتجعدات (عدا الوجه وفروة الرأس)، حتى إختفاء كل الدواء وإمتصاصه الكامل في الجسم. يجب تكرار هذه العملية مرة واحدة في اليوم (من المستحسن مساءً) لفترة ٣ - ٥ أيام.

يجب الحرص على استبدال لوازم السرير والبياضات (الألبسة الداخلية) يومياً. يجب غسل كل الجسم جيداً وذلك بإجراء حمام من الماء الساخن وذلك بعد مرور حوالي ٤٨ ساعة من إنتهاء الدهنة الأخيرة.

كَيْفَ تَسْتَطِيعُ / يَنْ أَنْ تَسَاهَمُ / يَ فِي نَجَاحِ الْعَلاَجِ ؟

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. إذا بلع الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد دون ٢٥ درجة مئوية. بالإمكان الإستعمال لفترة ٦ أشهر بعد الفتح الأولي. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٤٦٥٤ - ٢٩٨٥

المنتج: بيريجو إسرائيل فارماسيوتيكا م.ض.ص.ب. ١٦، يروحام.