

תאריך: 22.08.2016

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום: PecFent

פקפנט 100 : 152-59-33975

פקפנט 400 : 152-60-33978

שם בעל הרישום : מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10, פתח תקווה

טופס זה מיועד לפרוט החמרות בלבד !

על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן

ההחלטות המבוקשות

פרק בעלון	טקסט נוכחי	טקסט חדש
4. תופעות לוואי	<p>תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות הן: זיהומים בחזה, כאבים או רגישות ודלקות בגרון ובאף, שיעול, התעטשות, נזלת, דלקת בדרכי הנשימה, צינון, שינויים בנוזלים המופרשים באף, תגובות אלרגיות, פריחה, ירידה או עליה בתאבון, עליה במשקל, התייבשות, צימאון, שימוש לרעה או שימוש שגוי בתרופה, הזיות (ראיה או שמיעה), תחושת בלבול, דכאון, חרדה, עצבנות או איטיות, חוסר ריכוז או פעילות מוגברת, אבדן זיכרון, תחושת אופוריה, חוסר מודעות או תגובה, פרכוסים, התעלפות, התכווצויות שרירים או רעד, אובדן תחושת הטעם, אובדן או שינוי בתחושת הריח, קושי בדיבור, עור בצבע כחול, תחושת סחרור (ורטיגו), נפילה, תחושת חולי כללית, תחושת חום ובעיות בזרימת הדם, אודם בפנים או חום, צמרמורת, הזעה מוגברת, התנפחות רקמות רכות, לחץ דם נמוך, חסימה של קנה הנשימה, קוצר נשימה, דימום מהנרתיק, קרע במעי או דלקת בדופן הקיבה, חוסר תחושה או עקצוץ בפה, בלשון או באף בעיות אחרות בלשון, כיבים בפה, יובש בפה, שלשול, תנועתיות הפוכה של הקיבה והושט ללא הקאה, כאבי בטן, קלקול קיבה, רגישות או כאבים בפרקים, קושי אי-יכולת להשתין, כאב בחזה, עייפות, חולשה, בעיות עם תנועה, שינויים בספירת דם (ניתן לאבחון על ידי בדיקת דם), עליה ברמת הסוכר בדם, חלבון בשתן.</p>	<p>תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות הן: זיהומים בחזה, כאבים או רגישות ודלקות בגרון ובאף, שיעול, התעטשות, נזלת, דלקת בדרכי הנשימה, צינון, שינויים בנוזלים המופרשים באף, תגובות אלרגיות, פריחה, ירידה או עליה בתאבון, עליה במשקל, התייבשות, צימאון, שימוש לרעה או שימוש שגוי בתרופה, הזיות (ראיה או שמיעה), תחושת בלבול, דכאון, חרדה, עצבנות או איטיות, חוסר ריכוז או פעילות מוגברת, אבדן זיכרון, תחושת אופוריה, חוסר מודעות או תגובה, פרכוסים, התעלפות, התכווצויות שרירים או רעד, אובדן תחושת הטעם, אובדן או שינוי בתחושת הריח, קושי בדיבור, עור בצבע כחול, תחושת סחרור (ורטיגו), נפילה, תחושת חולי כללית, תחושת חום ובעיות בזרימת הדם, אודם בפנים או חום, צמרמורת, הזעה מוגברת, התנפחות רקמות רכות, לחץ דם נמוך, חסימה של קנה הנשימה, קוצר נשימה, דימום מהנרתיק, קרע במעי או דלקת בדופן הקיבה, חוסר תחושה או עקצוץ בפה, בלשון או באף בעיות אחרות בלשון, כיבים בפה, יובש בפה, שלשול, תנועתיות הפוכה של הקיבה והושט ללא הקאה, כאבי בטן, קלקול קיבה, רגישות או כאבים בפרקים, קושי אי-יכולת להשתין, כאב בחזה, עייפות, חולשה, בעיות עם תנועה, שינויים בספירת דם (ניתן לאבחון על ידי בדיקת דם), עליה ברמת הסוכר בדם, חלבון בשתן.</p>