

שימוש וטרינרי בלבד  
**קוינאביק 15% וטרינרי**  
**QUINABIC 15% VETERINARY ORAL SOLUTION**  
**Norfloxacin Nicotinate 150 mg/ml**  
תמיסה להגשה במי שתייה

תכולה: כל 1 מ"ל מכיל: 150 מ"ג Norfloxacin Nicotinate  
חומרים בלתי פעילים: 2-Pyrrolidone, Purified water



**התוויה:** בתרנגולות ובהודוים לטיפול בדלקות וזיהומים הנגרמים ע"י חיידקי קולי, סלמונלה, פסטולה וחיידקים גרם שלילים, וגרם חיוביים אחרים רגישים לנורפלוקסצין, רק לאחר שהוכחה רגישות החיידק ונמצא כי אין חלופה טיפולית.

**מינון והגשה:** בהתאם להוראות הרופא הוטרינר. חייב מרשם רופא וטרינר שיהיה תקף רק לאחר אישור מנהל מעבדת עופות מחוז.

**מינון מומלץ:**

לתרנגולות: 20 מ"ג קוינאביק לכל 1 ק"ג משקל חי ליממה במשך 3-5 ימים רצופים בשיטת ההצמאה.  
להודוים: 30 מ"ג קוינאביק לכל 1 ק"ג משקל חי ליממה במשך 3-5 ימים רצופים בשיטת ההצמאה.  
שיטת ההצמאה: להצמיא את העופות המטופלים כשעתיים לפני הטיפול.

להגיש את המנה היומית של קוינאביק ב- 1/5 מנפח המים שהעופות נותנים ביום אחד. יש לחדש את הספקת המים לשתייה רגילה לאחר שהעופות סיימו לשתות את התנפח.

**אזהרות:**

1. אין להשתמש במטילות ביצי מאכל.
2. יש להפסיק את הטיפול 4 ימים לפני השחיטה.
3. אין להשתמש כאשר יש פגיעה כליתית או בכבד.
4. התכשיר עלול לגרום לרגישות לקרני השמש.
5. קוינאביק עלול לגרום לגירוי במגע עם העור. יש להימנע ממגע ישיר עם התכשיר.

ניתן לזחוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

**אחסנה:**


מתוחלת ל-25°C Store below 25°C

מס' רישום: 080-56-92162-03

יצוק ובעל הרישום:

אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, ת"ד 489, בית שמש פורמט עלון זה מקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו.

070485-03



חייב מרשם רופא  
ملازم بوصفة طبيب  
Prescription only medicine

1 ליטר

**קוינאביק**

A Division of **Phibro** ישראל