

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها

فُحص ورُخص من قبلها في أيار ٢٠١٠

بوليكوتان كريم

Clotrimazole	1%	التركيب:
Dexamethasone Acetate	0.044%	
Neomycin Sulfate	0.645%	

المواد غير الفعالة: Sorbitan monostearate, polysorbate 60, cetyl esters wax, cetostearyl alcohol, 2-octyldodecanol, benzyl alcohol, purified water

تركيز المادة الحافظة: Benzyl alcohol 1%

الفصيلة العلاجية:

- كلوتريمازول - مضاد للفطريات من نوع إيميذازول.
- نيثوميسين - مضاد حيوي من نوع أمينوجليكوزيد.
- دكساميثازون - كورتيكوستيرويد.

تأثيرات الدواء الطبية:

لمعالجة التهابات الجلد التي يشترك فيها أيضاً تلوث جرثومي و/أو فطري.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

لا يجوز إستعمال المستحضر في حالات سل الجلد أو في حالات تشكل مسيرات لداء الزهري في المنطقة التي تتطلب العلاج وكذلك الأمر في أمراض فيروسية كالعقولة (هربس) أو جدري الماء.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً في الحالات التالية:

عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة. إذا وصف الطبيب لك هذا الدواء وأنت في فترة الرضاعة، فلا يجوز دهن المستحضر على الصدر قبل الإرضاع. إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي (كالربو)، الأوعية الدموية، الكبد، جهاز المناعة، السكري، جلوكوما أو العدسة الكدرة (كاتاراكت) - (في الإستعمال الطويل المدى بالمستحضر).

تحذيرات: يجب الإمتناع عن إستعمال المستحضر على مساحات واسعة من الجلد، جروح مفتوحة و/أو لفترات طويلة (أكثر من ٤ أسابيع). يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين، وإن حصل ذلك خطأ يجب شطفهما جيداً بالماء. يجب الإمتناع عن تماس المستحضر بالوجه وذلك في حالات وجود التهابات جلدية حول الفم أو إذا كان المريض يعاني من عد وردية (rosacea). يجب إتخاذ الحذر بشكل خاص عند إستعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين. كما يجب أن يتم الإستعمال تحت إشراف ومراقبة طبية. لا يجوز إستعمال الضمادات المسدودة إلا حسب تعليمات الطبيب (تعتبر الحفاضات البلاستيكية للرضع ضمادات مسدودة).

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالأحمرار والتهيج في الجلد، جفاف الجلد، الشعور بالحرق والوخز في المنطقة المعالجة. تختفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً: إذا لم تختف هذه الأعراض الجانبية أو إذا ظهر رد فعل أليرجي للمستحضر (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب. في حالات فرط التهيج أو إذا لم يطرأ تحسناً على حالتك أو إذا تفاقم الوضع (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً!

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله!

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

بالإضافة، بالإمكان تبليغ شركة بيريجو بواسطة العنوان التالي:
www.perrigo-pharma.co.il

المقادير الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: يجب دهن طبقة رقيقة من الكريم مرتين في اليوم (صباحاً ومساءً) على المنطقة المصابة ومن ثم التدليك إلى داخل الجلد. يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال عدة أيام أو إذا تفاقم الوضع.

إنّته/ي! لا يجوز البلع! هذا المستحضر مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

كَيْفَ تَسْتَطِيعُ/ينَ أَنْ تَسَاهِمَ/يَ فِي نَجَاحِ الْعِلَاجِ؟

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب من أجل منع تكرار التلوثات.

لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء قبل الأوان بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنّب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال والرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا بلع الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء. لا تسبب/ي التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد، دون ٢٥ درجة مئوية. بالإمكان الإستعمال لفترة ٦ أشهر بعد الفتح الأولي. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٣١٧٢ - ٤٨٥٢

المنتج: بيريجو إسرائيل فارماسيوتيكا م.ض.ص.ب. ١٦، يروحام.