

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון על העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתכשיר
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על-ידי במאי 2010

פוליקוטן קרם

Clotrimazole	1%	הרכב:
Dexamethasone Acetate	0.044%	
Neomycin Sulfate	0.645%	

חומרים בלתי פעילים:
Sorbitan monostearate, polysorbate 60, cetyl esters wax, cetoestearyl alcohol, 2-polyldodecanol, benzyl alcohol, purified water

ריכוז חומר משמר: Benzyl alcohol 1%

קבוצה תרופוית:

- אנטי פטרייתי מסוג אימידול.
- אנטיביוטי מסוג אמינוגליקוזיד.
- קורטיקוסטרואיד.

פעילות רפואית:

טיפול בדלקות עור שמעורב בהן גם זיהום חיידקי ו/או פטרייתי.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך גרישות אוש מרמכרי התכשיר.
אין להשתמש בתכשיר במצבים של שחפת או תלחית עגבתים
ביאור הדורש טיפול, כמו-כן במחלות נגיפיות כגון הרפס או
אבעבועות רוח.

אין להשתמש בתכשיר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול במקרים הבאים:

אם הניך בהריון או מיניקה. אם רופא אישר שימוש לאישה מיניקה,
אין למרות את התכשיר על החזה לפני ההנקה.
אם הניך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת הנשימה
(כגון אסתמה), כל דם, הכבד, מערכת החיסון, סוכרת, גלאוקמה
או קטארקט (בשימוש ממושך בתכשיר).

אזהרות: יש להימנע משימוש התכשיר על שטחי עור נרחבים, פצעים
פתוחים ו/או לתקופות ממושכות (יותר מ- 4 שבועות).

אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם העיניים, במקרה של מגע יש
לשטוף היטב במים. אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם הפנים, אם
יש דלקת עור סביב הפה, או אם החולה סובל/ת מחזית ורודה
(rosacea). זהירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ובמתבגרים.
השימוש חייב להיות מלווה במעקב רפואי. אין להשתמש בחבישה
אוסמת אלא עפ"י הוראות הרופא (ניתולים מניילים לניקוז המוהים
חבישה אוסמת). אם הניך גרישה/ת למון כלשהו או לתרופה כלשהי,
עלך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בתכשיר.

הגבות בין-תרופתיות: אם הניך גולט/ת תרופה נוספת, או אם
גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה, עלך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או
אי-היעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי: בנוסף לפעולות הרצויה של התכשיר, בזמן השימוש
עלך לעלות להופיע תופעות לוואי, כגון: אדמומיות וגירוי בעור, יובש
בעור, הרגשת חום וקצקץ באיזור המטופל. תופעות אלו חולפות
בדרך-כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.

תופעות לוואי המהיירות מיוחדות:
במידה שתופעות לוואי אלו אינן חולפות או אם מופיעה תגובה
אלרגית לתכשיר (נדיר): הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא. במקרה
של גירוי יתר או אם לא חל שיפור או אף הורע המצב (נדיר): הפסק/י
את הטיפול ופנה/י לרופא מיד בכל מקרה שבו הניך מרגיש/ת
תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית
עלך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בלדים ותינוקות:
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעה לוואי וכן על כל
תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף
הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס
המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequenceofsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה:

www.perrigo-pharma.co.il

מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. בהעדר הוראה אחרת מהרופא,
יש לטרוח שכבה דקה מהקדם פעמיים ביום (בוקר וערב) על האזור
הנוגע למחלת התורן העור. אם תוך מספר ימים לא חל שיפור במצב
או אף חלה הרעה, יש לפנות לרופא.

שימי לב: אל לבולע! תכשיר זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד.

יכיד תוכלי לסייע לזלחת הפיזול

עלך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא, על-מנת למנוע
את השתנות של הזיהומים. אם חל שיפור במצב בריאותך, אין
להפסיק את הטיפול בתכשיר לפני הזמן ללא התייעצות עם רופא.

מנעי הרעלה! תכשיר זה וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ותינוקות ועל-ידי כך תמנעי/י הרעלה
אם בטעות בלע ילד מן התכשיר, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים,
הובאי/י את התכשיר איתך. אין לגרוע לתקנה ללא הוראה מפורשת
ממואל! תכשיר זה נרשם לטיפול במצבך; בחולה אחר/ת הוא עלול
להזיק. אל תנתי/י תכשיר זה לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ללטול
תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהניך
משתמשת/ת בתכשיר. יש להרכיב משקפיים אם הניך זקוקה/ת להם.

אחסנה: במקום קריר, מתחת ל- 25°C. לאחר פתיחה ראשונה ניתן
להשתמש במשך 6 חודשים. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים,
תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. לא לשים לב לתאריך
התפוגה של התכשיר בכל מקרה של ספק, עלך להיוועץ ברופאך
שסיפק לך את התכשיר. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 4852.231.72

היצור: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ,
ת.ד. 16, ירוחם.