

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו ניבדק ואושר על ידו.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ביפוזיט, קרם

הרכב: Bifonazole 1%

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה מחמירים או אינם משתפרים. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה אנטי פטרייתית, בעלת פעולה רחבת טווח, לטיפול בזיהומי עור פטרייתיים.

קבוצה תרפויטית: אנטי פטרייתי מסוג אימידזול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם: אתה רגיש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על- כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף מיד עם מים.
- אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה, **תרופות אחרות** כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח כדי למנוע סיכונים או אי- יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

הריון והנקה

אם הנך בהריון או מניקה, אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה 1% Benzyl Alcohol כחומר משמר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפני הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: למרוח על האזור הנגוע פעם אחת ביום, רצוי לפני השינה.

אין לעבור על המנה המומלצת!

שים לב אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד!

יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים ורקמות ריריות (כגון בפה ובאף).

- **אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלעת או בלע ילד מן התרופה,** פנה מיד לחדר מיון של בית החולים והבא איתך את אריזת התרופה.
- **אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!**

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע.

- אופן השימוש: יש לרחוץ ולייבש האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. למרוח שכבה דקה של התכשיר ולעסות לתוך העור. בין טיפול לטיפול במשחה - ניתן להשתמש באבקת טלק כדי לייבש את המקום.

- כאשר הטיפול ברגליים - יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש במיוחד בין אצבעות כף הרגל. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה. יש להימנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות

- המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.
- אין ליטול תרופות בחושרך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח

4. תופעות לוואי:

- כמו בכל תרופה, השימוש בביפופויט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
- **עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:**
- אדמומית קלה, תחושת צריבה או גירוי בעור. תופעות אלו נדירות וחולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.
- **תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:** גירוי ממושך, פריחה או דלקת מקומית (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר), בחילה, סחרחורת (נדיר): הפסק הטיפול ופנה לרופא.
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
- תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות **בילדים ובתינוקות:** על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי ועל כל תרופה נוספת הניתנת לילד!
- ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן את התרופה?

- אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ 25°C.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- ניתן להשתמש בתרופה במשך 6 חודשים לאחר פתיחתה לראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על האריזה.
- התרופה היא קרם שקוף למחצה לבן עד צבע קרם. אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין בשינוי במרקם או בצבע העלול להעיד על קלקול התרופה.
- אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם את החומרים הבלתי פעילים הבאים: Purified Water, Octyldodecanol, Cetostearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Sorbitan Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

התרופה היא קרם שקוף למחצה לבן עד צבע קרם. ארזה בשפופרת במשקל של 15 גרם.

בעל הרישום והיצרן:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ויטאמד ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.



עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: 07.2014

מספר רישום התרופה: 115.32.29687.00

לשם הפשטות והקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.