

إيميفيدو ١٠ ملغ، ٥٠ ملغ

كبسولات صلبة

التركيز:

المادة الفعالة:

ميتيلفوزين ١٠ ملغ، ٥٠ ملغ

لقائمة المواد الكاملة أظر: "معلومات إضافية".

Miltefosine 10 mg, 50 mg

كيف تستعمل الدواء؟
يجب استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب، دائماً. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً.

الجرعة وطريقة العلاج سيخذدما الطبيب، فقط.

• يجب بلع الكبسولة يأكلها مع كأس من الماء.

• منوع مضنة الكبسولة.

• في حال كان المقدار العلاجي يتطلب تناول ٢ - ١٥ كبسولة في اليوم، يجب تقسيم المقدار إلى ٢ - ٣ مرات في اليوم، صباح ومساء أو صباح، ظهر ومساء.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى أو إذا قام طفل بتناول كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتجو، فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

تناول جرعة أعلى ممكن أن يزيد من احتمالات حدوث اعراض جانبية.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد وقم باستشارة الطبيب. يجب الاستمرار في تناول الدواء حسب التوصية من قبل الطبيب.

لا توقف عن تناول الدواء، يجب إكمال العلاج كما وصفه لك الطبيب. إذا أوقفت العلاج قبل إنهاء، من المحتمل عودة العدو.

إذا كانت لديك أسلطة إضافية بالنسبة لاستعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال إيميفيدو أعراضًا جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تصدّم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أنها تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شائعة جداً:

• تقيز، إسهال، غثيان

• ارتفاع في مستوى إنزيمات الكبد

• أعراض جانبية شائعة:

• فقدان الشهية

• ارتفاع في كرياتينين (Creatinine) وفي البول (urea)، اللذان يشيران إلى اختلال في

وظائف الكلى

• أعراض جانبية نادرة:

• الالم في البطن السفلي

نزول هذه الأعراض الجانبية غالباً بعد انتهاء العلاج، لذلك لا حاجة لإيقاف العلاج أو ملائمة

الجرعة.

في عدد قليل من الحالات تم التبليغ عن هبوط في عدد صفائح الدم (Thrombocytopenia). العلامات الأولى لذلك ممكن أن تكون تزيف من اللثة، تزيف من الأنف أو علامات دكبات.

تم التبليغ في حالة واحدة عن ظاهرة Stevens-Johnson syndrome (رد فعل شديد وأحياناً مهدد للحياة، في الجلد أو في الأغشية المخاطية، والتي يصاحبها نففات في الجلد). إذا لاحظت ظهور هذه العلامات على الجلد أو في الأغشية المخاطية، توجه فوراً إلى الطبيب. من المحتمل أن يوقف الطبيب العلاج بـ إيميفيدو وإن يقرر اصطدامك علاج فوري.

إذا ظهرت أحدي الأعراض الجانبية التي لم تذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبلية عن أعراض جانبية

يمكن تبليغ وزارة الصحة بأي عرض جانبي من خلال الاستماراة الإلكترونية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة:

www.health.gov.il

أو عبر الدخول إلى الرابط التالي:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

كيف يخزن الدواء؟

• تحسب التسمة! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الأطفال، وهكذا تحسب التسمة، لأن التسمة بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يمنع تناول الدواء في الطعام! افحص اللاصقة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة لها.

• يمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ينتهي إلى اليوم الأخير في الشهر.

• تاريخ انتهاء الصلاحية ينتهي إلى اليوم الأخير في الشهر.

• احفظ بدرجة حرارة تحت ٣٠°C.

• يجب الاحتفاظ بالدواء في عبوته الأصلية لحفظه عليه من الرطوبة.

معلومات إضافية

• بالإضافة إلى المادة الفعالة Miltefosine يحتوي الدواء، أيضاً:

Silica, colloidal anhydrous, Cellulose, microcrystalline, Lactose monohydrate, Talc, Magnesium stearate, Gelatin, Titanium dioxide (E171), Iron oxide red (E172), Capsugel 00A1 White ink.

• كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

إيميفيدو ١٠ ملغ: كبسولات صلبة حمراء بحجم ٣، على الكبسولة مطبوع باللون الأبيض "PLB" ، وعلى غطاء الكبسولة مطبوع باللون الأبيض "MILT 10".

مزروم في شرائط: ٥٦ كبسولة - ٨ شرائط، يحتوي كل شريط على ٧ كبسولات.

إيميفيدو ٥٠ ملغ: كبسولات صلبة حمراء بحجم ٢، على الكبسولة مطبوع باللون الأبيض "PLB" ، وعلى غطاء الكبسولة مطبوع باللون الأبيض "MILT 50".

مزروم في شرائط في عبوات بالأحجام التالية:

٥٦ كبسولة - ٨ شرائط، يحتوي كل شريط على ٧ كبسولات.

٢٨ كبسولة - ٤ شرائط - يحتوي كل شريط على ٧ كبسولات.

• صاحب التسجيل وعنوانه: ميجافارم. م.ض. ص.ب. ٥١٩، هود هشارون ٤٥١٠٥٠١.

• المنتج وعنوانه: بيسيل + لوراي. م.ض. ، راينبرج، ألمانيا.

• تم فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: تشرين الأول ٢٠١٥.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

إيميفيدو ١٠ ملغ: ١٥٤٠٥٣٤٣١١

إيميفيدو ٥٠ ملغ: ١٥٤٠٦٣٤٣١٣

• لتبييض قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.

لا توجد معلومات سريرية كافية بالنسبة لمرضى يعانون من فشل في الكلى أو في الكبد.

المرضى الذين يعانون من فشل في الكلى أو في الكبد

لا يوجد معلومات سريرية كافية بالنسبة لمرضى يعانون من فشل في الكلى أو في الكبد.

المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

لدى المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يجب إعطاء علاج بواسطة إيميفيدو

فقط بعد إعطاء علاج آخر ملائم، بسبب عدم وجود معلومات سريرية كافية حول العلاج بـ إيميفيدو لدى هؤلاء المرضى.

إذا كنت تتناول أو تتناول موخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية

والمحملات الغذائية، فاقرأ الطبيب أو الصيدلي بذلك.

استعمال الدواء والغذاء:

يجب تناول الكبسولات مع وجبات الطعام.

الحمل والإرضاع

تأكد من أنك لست حامل قبل بدء العلاج بـ إيميفيدو.

النساء في جيل الخصوبة يجب عليهم استعمال وسائل منع حمل ناجحة خلال فترة العلاج بـ

إيميفيدو، وخلال خمسة أشهر إضافية بعد انتهاء العلاج من أجل ضمان عدم الحمل في هذه

الفترة.

النفاسات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

• كنت حاملًا (تعاني من حساسية) للمادة الفعالة ميتيلفوزين، أو لأي واحد من المركبات

الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر رجاء إلى البند "معلومات إضافية")

• كنت تعاني من إصابة حادة في الكبد أو في الكلى

• كنت تعاني من متلازمة باسم Sjogren - Larsson (اضطراب وراثي نادر في الجهاز

الأرضي والذي يؤدي إلى تصلب وزيادة سمك الجلد)

• كنت مرضعة

• النساء اللواتي من المحتمل أن يكن حوامل ولم يجرين فحص حمل. النساء اللواتي من

المحتمل أن يكن حوامل يجب عليهم إجراء فحص حمل (دم أو بول) قبل تناول الدواء

• النساء اللواتي من المحتمل أن يكن حوامل ولا يستعملن وسائل منع حمل ناجحة خلال فترة

استعمال الدواء أو ٥ أشهر بعد انتهاء العلاج

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

• العلاج بواسطة إيميفيدو ممكن أن يتسبّب ضررًا للكلية وللكبد. نظرًا لعدم المقدرة على

استبعاد حدوث إصابة بالكلية والكبد نتيجة العلاج بـ إيميفيدو، يجب عليك إجراء فحوصات

بول ودم مرة في الأسبوع، لفحص أداء وظائف الكلى والكبد. إذا كانت قيم أداء وظائف الكلى

والكبد في نهاية العلاج مختلفة عن القيم العادي، يجب المتتابعة وإجراء فحوصات على

القيم إلى وضعها العادي.

• إيميفيدو ممكن أن يتسبّب بأعراضًا جانبية مثل التقيز والإسهال. في حال استمرار هذه

الأعراض الجانبية يجب شرب كميات كبيرة من الماء من أجل التعويض عن فقدان السوائل

ولمنع حدوث فشل في الكلى.

المرضى الذين يعانون من فشل في الكلى أو في الكبد

لا توجد معلومات سريرية كافية بالنسبة لمرضى يعانون من فشل في الكلى أو في الكبد.

المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

لدى المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يجب إعطاء علاج بواسطة إيميفيدو

فقط بعد إعطاء علاج آخر ملائم، بسبب عدم وجود معلومات سريرية كافية حول العلاج بـ

إيميفيدو لدى هؤلاء المرضى.

إذا كنت تشكين أنك حامل خلال العلاج بـ إيميفيدو أو خلال خمسة أشهر بعد العلاج، استشيري

الطبيب فوراً من أجل فحص إذا كنت حامل. إذا أظهرت الفحص أنك حامل، يجب مناشة المختبر

المختبر على تجنب إيميفيدو خلال فترة العلاج بهذا الدواء، لذلك من المحتمل

أن تتضرر حناعة جنوب من الحمل. أخيراً طبيب إذا كنت تعاني من هذه الأعراض الجانبية

من أجل أن يصف لك وسائل منع أخرى.

إذا كنت تشكين أنك حامل خلال العلاج بـ إيميفيدو أو خلال خمسة أشهر بعد العلاج، استشيري

الطبيب فوراً من أجل فحص إذا كنت حامل. إذا أظهرت الفحص أنك حامل، يجب مناشة المختبر

المختبر على تجنب إيميفيدو خلال فترة العلاج بهذا الدواء، لذلك من المحتمل

أن تتضرر حناعة جنوب من الحمل.

يُمنع استعمال إيميفيدو خلال فترة الإرضاع. إذا كان طفل يرضع منك وكنت

للحصول على علاج بـ إيميفيدو، يجب فحص إمكانية فطم الطفل عن الرضاعة.

في الأبحاث التي أجريت على الحيوانات لوحظ إحداث ضرر على الخصوبة، الأمر الذي كان

قابلًا للانعكاس. ليس معروفاً إذا كان إيميفيدو يتسبّب ضررًا على الخصوبة لدى البشر أيضًا.

القيادة وتشغيل الماكينات

يُمنع القيادة أو تشغيل ماكينات خطيرة خلال فترة العلاج بـ إيميفيدو، لأن الأعراض الجانبية

لهذا الدواء قد يتسبّب ضررًا لهذه القرارات.

شرب الكحول سيؤدي إلى تفاقم هذه الأعراض.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

كل كبسولة من ١٠ ملغ تحتوي على ٨٠,٨٥ ملغ لكتوز.

كل كبسولة من ٥٠ ملغ تحتوي على ١٠,٨٧ ملغ لكتوز.

إذا قيل لك أنك تعاني من عدم قدرة احتفال لأنواع معينة من السكر، استشر الطبيب قبل البدء

بتناول إيميفيدو، لأن هذه الكبسولات تحتوي على لكتوز.

الفحوصات والمتابعة

نظرًا لعدم المقدرة على استبعاد حدوث إصابة بالكلية والكبد نتيجة للعلاج بـ إيميفيدو، سيرجى

الطبيب فحوصات بول ودم مرة في الأسبوع، لفحص أداء وظائف الكلى والكبد.

إذا كانت قيم أداء وظائف الكلى والكبد في نهاية العلاج مختلفة عن القيم العادي، يجب المتتابعة

وإجراء مراقبة حتى عودة القيم إلى وضعها العادي.