نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – ١٩٨٦

يُسمح للدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تيموتيل ٣٠٠ تحرير مُمتد
تيموتيل ٦٠٠ تحرير مُمتد

أقراص بتحرير ممتد

المادة الفعّالة:
كاربامازيبين **Carbamazepine 300 mg**
كاربامازيبين **Carbamazepine 600 mg**

لقائمة المركبات الكاملة انظر: "معلومات إضافية"

إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء لأن معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وُصف لك شخصيًا. لا تعطه إلى آخرين، فقد يسبب الضرر حتى إذا بدا أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
هذا الدواء غير مخصص للأطفال تحت جيل ٦. هكذا أشكال إعطاء أخرى (كأشراب أو أقراص بتحرير فوري) الملائمة أكثر للأطفال تحت جيل ٦.

لأي غرض مخصص الدواء؟

تيموتيل يستعمل لعلاج نوعين مختلفين من الألم: **Trigeminal neuralgia** – ألم حاد ومتكرر في الوجه). لمعالجة إضطراب الهوس ومنع الهوس الاكتئابي- إضطرابات مزاج ثنائية القطب.

الفصيلة العلاجية:
مضاد للصرع ذي تأثير عصبي ذي تأثير نفسي.

قبل استعمال الدواء

لا يجوز استخدام المستحضر إذا:

- كنت حساس (أو عندي) للمادة الفعالة كاربامازيبين أو لأي واحد من التركيبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (الرجاء أنظر "معلومات إضافية").
- كنت حساس لمضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة (مثل: نورتريبتيلين، ديسيبرامين، دوزيبينيفاين).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من نقص في نخاع العظم.
- كنت تعاني من مشاكل في وظيفة الكبد (يُفحص أيضًا تأثير تجلطي في الدم).
- كنت تعاني من مشاكل في وظيفة القلب (بالإضافة إلى الاضطرابات الإيقاعية) أو في الأوعية الدموية.
- كنت تعالج بأدوية من مجموعة مثبطات مونوامين أوكسيداز (MAO inhibitors) لعلاج الاكتئاب. أو عولجت بها خلال الأسبوعين الأخيرين.
- كنت تعالج بفيرباميل (verapamil) أو بأدوية من مجموعة الثيازيدات (diltiazem) أو بأدوية من مجموعة النظير الضوئي (voricozonazole) – راجع قسم "الأدوية الأخرى" أو إذا كنت تتلقى العلاج الدوائي **بتيموتيل**.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يمكن أن **تيموتيل** قد يسبب "تريات فصل" مشوهة في الجنين (مثل: هيبوسبادياس – ألم حاد ومتكرر في الوجه). لمعالجة **Trigeminal neuralgia**
إستشر الطبيب ومنع الهوس الاكتئابي- إضطرابات مزاج ثنائية القطب.

- كنت تعاني من اضطراب في إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول (SIADH) أو انخفاض في تركيز الصوديوم في الدم أو إذا يزيد خطر تطوير هذا الاضطراب (مثل: مسنين، أشخاص يتناولون أدوية معينة التي تخفض مستوى الصوديوم في الدم (انظر أيضًا "التفاعلات الجانبية")، أشخاص يتناولون أدوية مدرة للبول (أدوية تزيد إفراز البول)).
- كنت تعاني من مشاكل في الكلى. الكبد أو الغدة "الأدرينالية الجانبية" أو الغدة "الدرقية".
- كنت تعاني من مرض ضمور العضلات (myotonic dystrophy). (أو مشاكل في وظيفة الكلى. تظهر في فترات متقاربة لدى مرضى بنية واحدة).
- إذا كان لديك مستوى منخفض جدًا داخل الجين (جلوكوز) أو إذا كنت غير قادر على حمل السكر.

تحذيرات إضافية:

- يجب أن يتم إجراء فحص الطبيب لكي يحري فحص لتحديد أنك تعاني من أي مشاكل أخرى في الكبد، الكلى أو القلب قبل أن تبدأ العلاج **بتيموتيل**. سنحتاج أن نقوم بفحوصات دم منتظمة (بما في ذلك فحوصات الدم) قبل وخلال العلاج **بتيموتيل**. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد، الكلى أو القلب، الكبد أو الكلى، راجع الطبيب أو الصيدلي قبل أن تبدأ العلاج **بتيموتيل**.
-