

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيانة (مستحضرات) – ١٩٨٢

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

القرص ديسل أقراص ٤٠، ٨٠، ١٦٠ ملغ

كل قرص يحتوي فالسارتان (Valsartan) بجرعة ٤٠، ٨٠، و١٦٠ ملغ على التوالي.

مركبات غير فعالة. أنظر بند ٦.

إن الغرضه الأساسي من هذا الدواء هي تقليل آثاره على مستعمل الدواء.

تحذير هام عند الشفرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة أو ملاحظات توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

إن وصفة هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تختلف لأخرين، حيث أنه قد يسبب لهم الضرر، حتى ولو بد أن كان مرضهم مشابه.

يمكن استعمال فالسارتان كمسك لدى مرضى عمرهم ٦٥ وقرص.

هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال والمراهقين دون عمر ١٨.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

فالسارتان بكمسل ٤٠، ٨٠، و١٦٠مخصص لعلاج فشل القلب والعلاج و

فالسارتان بكمسل ٨٠٠ و١٦٠ مخصص أيضا لعلاج فرط ضغط الدم.

١. **الفصلية العلاجية:** صنادة مستقبل الأنجيوتنسين II.

فالسارتان ديسل ينتمي لفصلية الأدوية التي تدعى مضادات مستقبل الأنجيوتنسين II، التي تساعد بالسيطرة على فرط ضغط الدم.

٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حامل بعد الشهر الثالث وما بعد (من المفضل الامتناع عن تناول فالسارتان بكمسل أيضا في بداية الحمل، انظري بند "الحمل والإرضاع".
- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعالة (فالسارتان) أو لأي واحد من المركبات الإضافية في يحتويها الدواء (المفصلة في بند ٦).
- كنت تعاني من مرض كلى ورجيم، من اضطراب ورجيم في وظائف الكبد.
- كنت تعاني من السكري أو من خلل في وظائف الكلى وكنت تتناول أدوية تتأقش ضغط الدم الذي يحتوي على السيكورين في نفس الوقت
- إذا كانت لديك هذه الحالات تمت بصفة إلكي، أخبر الطبيب أو دوق أن تتناول فالسارتان بكمسل.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

كل علاج بفالسارتان بكمسل يجب إبلاغ الطبيب إذا:

- لديك مرض كلى، أو كنت تمر بعلاج بالديلز (دياليزا).
- كنت تعاني من تضيق شريان الكلية أو إذا همت مؤخرا بزرع كلية.
- كنت تتناول الأدوية السيكرين، أو مسيط ACE (مثل الألبيريل) واليسينوبوريل، رامبيريل، أو مضيط ACE بالدمج مع مسحور بيتا (دواء الذي يحمض مستقبلات من نوع B) مثلا ميتازولول) لعلاج فشل القلب أو مضيط ACE بالدمج مع دواء من نوع MRB (دواء الذي يحمض مستقبلات الثريات المنعدية) مثلا سيبرونولاكتون، إلفنرون لعلاج فشل القلب.
- كنت تعاني من فقدان سوائل بسبب تقيؤ أو إسهال، أو إذا كنت تتناول جرعات عالية من اوية مرة مرة لثليل.
- كنت حساس لأي غذاء أو أي دواء.

– كنت تعاني من فشل القلب أو كان لديك اشتباه بمضلة القلب (نوبة قلبية). عليك أن تتبع إرشادات الطبيب بالضبط حول الجرعة الأولية. من المحتمل أن يفحص طبيبك وظائف الكلية لديك.

لديك مرض قلب غير فشل القلب أو نوبة قلبية.

كان لك ذات مرة نفاخ خصوصا في الوجه الحلق واللسان الذي نتج عن تفاعل أرجي شديد يدعى وعائية عندما أخذت اوية أخرى (ما في ذلك مضيط ACE). في حال أن لدى الأعراض تتطابق عليك يجب أن توقف أخذ فالسارتان بكمسل وتتصل بطبيب فورًا. لا يجوز أن تأخذ فالسارتان بكمسل مجدداً (انظر بند ٣ "أعراض الحساسية").

– كنت تتناول اوية ترفع مستويات البوتاسيوم في الدم مثلا مدرات البول اوية أو البوتاسيوم، أو فيتامين د، أو فيتامين ب١٢، أو تعدي على البوتاسيوم، أو هبارين، من المحتمل أن يتناول حاجة لإجراء فحوصات دورية لمستوى البوتاسيوم في الدم.

– كنت تعاني من الودستيريوية (مرض يكون فيه إنتاج زائد لهورمون الودستيريون من قبل الغدة الكظرية)، في هذا الحالة لا يوصى بتناول فالسارتان بكمسل.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا، أي دوية أخرى، بما في ذلك اوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

من المحتمل أن تكون حاجة لتغيير الجرعة، إتخاذ اختيارات أو بحالات معينة إغبات تناول أدوية أخرى.

عليه والخصوص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ الأدوية التالية:
– اوية التي تستعمل في مضبوط ضغط الدم، مثل اشكال قلب خصوصا مدرات البول، مضطبات ACE (مثل الألبيريل، سيسينوبوريل، السيكورين (انظر بند ٢ "أعراض الحساسية")، و"تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء".

– مدرات البول المؤثرة (المحافظة) البوتاسيوم مثل: سيبرونولاكتون، تريامتيرين، ألبوريديز.إضافات البوتاسيوم بدائل الملح التي تحتوي على بوتاسيوم، هيبيرين أو اوية أخرى التي قد ترفع مستويات البوتاسيوم.

– قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات دورية لمستوى البوتاسيوم في دمك.

– نوع معين من مسكبات الألم تدعى مضطبات التهاب لاسيترويدية (NSAIDs) مثل ايبوبروفين، نابروكسين، وناوكتيد سكلاب أو كسيجيتاز-٢-تغذائية (مضطبات COX-٢). قد يفحص الطبيب وظيفة كليتك أيضا.

– أنثيومت (أدوية تستعمل لعلاج أنواع معينة من الأمراض النفسية).

– مضادات حيوية معينة (من مجموعة أمينوغليكوسايد) دواء الذي يستعمل كإقاية من رفض الزرع (سيكلوسبورين) أو دواء مكافحة الفيروس الأرواحي الذي يستعمل لعلاج التهاب HIV (أيدز (ريوتافيير).

قد تزيد هذه الأدوية من تأثير فالسارتان بكمسل.

أدوية إضافية:

– دمج مع دواء من نوع مضيط ACE لعلاج فشل القلب غير مرضي به.

– دمج مع دواء من نوع مضيط ACE ومرا MRB (مثل سيبرونولاكتون، إلفنرون).

– دمج مع دواء من نوع مضيط ACE لعلاج نوبة قلبية، غير مرضي به.

استعمال الدواء والاطلع:

يمكن تناول فالسارتان بكمسل مع أو دون وجبة.

الحمل والإرضاع:

أخبر الطبيب إذا كنت حامل أو تعتدين أنك قد تكونين حامل. الطبيب سيتصاحك عادة وتتوقف عن تناول الدواء قبل أن تحملي أو متأثرة بعد أن علمت أنك حامل.

وتناول دواء آخر بدلًا عن فالسارتان بكمسل، الدواء غير مرضي به في المراحل المبكرة من الحمل وينصح باستخدامه بعد الشهر الثالث للملح. بعد ذلك، لا بد من تجنب دواء آخر بدلًا من فالسارتان بكمسل.

استشرى الطبيب إذا كنت ترضعين أو تخططين للإرضاع.

إرشاد أخصائى حديثي الولادة (أثناء الاستعمال الأول بعد الولادة) خصوصا إذا كنت غير مرضي به أثناء تناول الدواء.

السياسة واستعمال الآلات

كما في اوية أخرى كثيرة المدعة لعلاج فرط ضغط الدم، فالسارتان بكمسل

قد يؤدي أحيانا بادرة أضرار وضور بالتركيز. لذلك يجب سيقاة مركبة استعمال آلات أو تنفيذ كل نشاط يستلزم تركيز، عليك التأكد أنك تعرف آلات تتجنب فالسارتان بكمسل.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

دائما يجب الاستعمال وفقا لتعليمات الطبيب. عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

تحدد الجرعة وكيفية العلاج من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يمكن استعمال فالسارتان بكمسل لدى مرضى عمرهم ٦٥ وما فوق.

هذا الدواء غير مخصص للرضع، للأطفال والمراهقين دون عمر ١٨.

يجب أن تستعمل هذا الدواء في أوقات محددة كما حدد من قبل الطبيب المعالج، بوصى بتناول الدواء في نفس الوقت في كل يوم، وتفضل صباحًا. تتناول الدواء في نفس الوقت كل يوم يساعدك على أن تتذكر متى تتناول الدواء. يجب بلع الدواء مع كأس ماء.

فالسارتان بكمسل ٤٠،٨٠: يجوز الشطر.

فالسارتان بكمسل ١٦٠: لا يجوز شطر القرص لأنه لا يوجد خط تقسيم. لا توجد معلومات وإضافات للمضغ والمضغ.

فحوصات ومراقبة

عادة، لا يلاحظ مرضى فرط ضغط الدم علامات المشكلة يشعر كثيرون بتألم جديد، ذلك نتيجة الاستمرار بزيارة الطبيب في غايه الأهمية حتى لو كنت تشعر أنك تشعر أنك جديد. قد يقوم طبيبك بإجراء فحص وظائف الكلية، ضغط الدم وكمية الكهارل (مثل البوتاسيوم) في الدم وعلى فترات زمنية ثابتة.

من المهم تناول الدواء بالضبط وفقا لإرشادات الطبيب حتى تحصل على النتائج الأفضل وتخفيف الاختطال لأعراض جانبية.

إذا أقرطت تناول الجرعة عن طريق الخطأ من الممكن حدوث

أعراض مثل دوار وأو إغماء. في هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب على الفور والاستلقاء. إذا أقرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع طفن من الدواء بالخطأ، فيجب التوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مستخدما عوة الدواء مع.

إذا كنت تتناول هذا الدواء في وقت المطلوب لا يجوز تناول جرعة مزدوجة. قد يحدث القامة في وقت المعتاد وانتشر الدواء.

يجب الاستمرار بالعلاج كما أوصى من قبل الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بدواء عن استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا كنت تتناول الدواء، قد يحدث تفاعل من مرضك.

• لا يجوز تناول اوية في التلاما تفاع من الصمق والجرعة الدوائية في كل مرة تزده تتناول فيها دواء. صنع القطرات إذا كنت بحاجة لها.

• إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء أو حول كم من الوقت عليك أن تأخذ فالسارتان بكمسل، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، استعمال فالسارتان بكمسل قد يسبب أعراضا جانبيةً لدى جزء من المستعملين، أو تفرغ عند قراءة لائحة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تعاني من واحدة منها.

قد تكون أعراض جانبية معينة جديفة.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أية أعراض جانبية على الفور إذا:

– لديك أعراض جانبية وعائية (انظر بند ٣ "أعراض الحساسية")، اللسان، الحلق أو الشفتين، صموتك يلم، صموتك تنفس، شرى، حكة.

يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا:

– كنت تتفاعل في كُلت القدمين، في الكاحلين، في اليدين أو ارتفاع غير

متشعر بدون أو إغماء، في هذا الحال يجب أن تستلقي وتتصل مع الطبيب فورًا.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (أعراض جانبية تظهر لدى ١٠-١ مستخدمين

من بين ١٠٠٠)

– دوام ضغط دم منخفض مع أو بدون أعراض مثل دوار أو إغماء أو دوخة.

– انخفاض في وظائف الكلى (علامات لاضطرابات في الكلى).

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض جانبية تظهر لدى ١-١٠ مستخدمين

من بين ١٠٠٠):

– رد فعل تحسسي مع أعراض مثل طفح، حكة، دوام، انتفاخ الوجه الشفتين، اللسان، أو الحلق، صموتات تنفس أو بلع، (علامات وُدمة وعائية). انظر أيضا "يجب التوجه إلى الطبيب على الفور إذا".

– فقدان مفاجئ ورجيم، شعور بدوار (vertigo).

– اختلال ورجيم في وظيفة الكلى (علامات مثل الكلى الحاد).

– بوتاسيوم ورجيم، وبصفة خاصة نضيب نص غير سليمة (أعراض فرط بوتاسيوم الدم).

– صدق تنفس صموية التنفس أثناء الاستلقاء، انتفاخ كُلت القدمين أو

الرجلين (علامات فشل القلب).

– صداع، سعال، ألم بطن، غثيان، إسهال، تعب، ضعف.

أعراض جانبية شويها غير معروف (أعراض لم يحدد بحدوث شويها بعد):

– بثور في الجلد (علامة التهاب الجلد البثورى).

– رد فعل تحسسي مع طفح، حكة، شرى، سوية مع جزء من العلامات والآعراض التالية: انتفاخ الوجه الشفتين، اللسان، أو الحلق، صموتات تنفس، آلام في المفاصل، آلام في العظام، التهاب السحايا، انتفاخ الجلد السطوحي، وآو علامات تشبه الأنفازنزا (بقع حمراء) (serum sickness).

– التهاب رئوي صموية، حكة (علامات لالتهاب بالأوعية الدموية - Vasculitis).

– زئبق أو طيور كلى، غير عادية (علامات لمستوى منخفض

لصفيحات الدموية - Thrombocytopenia).

– ألم عضلات (Myalgia).

– سؤونة، ألم حلق أو ترحاح في الفم نتيجة لتلوثات (أعراض لمستوى

منخفض من خلايا الدم البيضاء- قُلة العدلات).

– انخفاض بمستويات البوتاسيوم ورجيم وانخفاض في نسبة خلايا الدم الحمراء في الدم (الأمز الذي قد يؤدي في حالات وخيمة إلى فقر

الدم).

– ارتفاع بمستوى البوتاسيوم في الدم (الذي قد يسبب في حالات وخيمة، اختلال عضلات وتشم كُلت الدم).

– ارتفاع في وظائف الكلى قد تشير لضور في الكبد، بما في ذلك ارتفاع البوتاسيوم في الدم (والذي يمكن في حالات وخيمة، أن يسبب سؤونة أو الغثيان).

– ارتفاع بمستوى كُلت البوتاسيوم في الدم وما يرتاقه في صموتات الكرياتينين في مصل الدم (يمكن أن يشير إلى وظيفة كلى غير سليمة).

– سؤونة منخفضة من الصموميد من الدم (من شأنه أن يسبب تعب، ارتباك، اختلاج عضلات وآو اختلاجات في حالات وخيمة).

– قد يتغير تواتر أعراض جانبية معينة وفقا لِحالتك، مثلا، أعراض جانبية مثل دوام وانخفاض في وظيفة الكلى ظهرت بوتوات أقل لدى مرضى الذين عولجوا بفرط ضغط الدم المقارنة مع المرضى الذين عولجوا بفشل القلب أو بعد نوبة قلبية حدثت مؤخرا.

تم تجميع الأعراض التالية خلال أبحاث كلىنيكية على المستعملين الذين يحتوي فالسارتان بدون أن تكون قدرة لتحديد إذا ما كانت الأعراض تحدث من الدواء أو عن عوامل أخرى. أي ظهير، تغيرات في الشعور الجنسية، التهاب الجيوب الأنفية، أرق، ألم في المفاصل، التهاب البلعوم، رشغ أو انسداد الأنف، التهاب كُلت الديدن، الكيميين، أو كُلتات الرجلين، تلوذات في الجهاز التنفسي العلوي، تلوذات فرسوية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من أعراض جانبية لم يذكر في النشرة أو يستمر أكثر من عدة أيام، يجب أن تستشير الطبيب.

التعليق عن أعراض جانبية:

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دعونا على تلموحات لادوية عقب سيقول تلموحات" الموجود

في صفحة البيت بموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) لموجهة لاسئلة (الانترنيت للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الفخول للرابط: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence?sequence_id=1&asp?formType=AdversEffectMedicine@mo.gov.il

٥. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمرار يجب حفظ هذا الدواء كل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا

عن متناول أيدي الأطفال وآو الرضع، وذلك لمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يتطرق لليوم الأخير من نفس الشهر.

• ظروف التخزين: لا يجوز التخزين درجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية. خزن في العبوة الأصلية.

٦. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة يحتوي على المستحضر على: Mannitol, Copovidone, Cros Carmellose Sodium, Silica Colloidal Anhydrous, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Dioxide (E-171), Talc, Macroglol, Iron Oxide Yellow (E-172; 40 mg and 160 mg only), Iron Oxide Red (E-172; 80 mg only), Carnauba Wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة

فالسارتان بكمسل ٤٠: أقراص صفراء مطوّلة ومحدبة مع خط تقسيم في

جانب واحد.

فالسارتان بكمسل ٨٠: أقراص زهرية مطوّلة ومحدبة مع خط تقسيم في

جانب واحد.

فالسارتان بكمسل ١٦٠: أقراص صفراء مطوّلة ومحدبة.

كل عبوة تحتوي: ٣٠، ٢٨، ١٤، ١٠، قرص في عبوات لويحات (بلستر). قد تكون جميع أحجام العبوة مسؤونة.

المنتج وعواله: ديسل، مرض، شارع ديكم ١، أور عكيفا ٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل.

فصحت هذا النشرة ومنت المصلفة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ

تشرين الثاني ٢٠١٦.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي بوزارة الصحة:

فالسارتان بكمسل ٤٠: ٤٢٧٠٣٣٤٢٠٠

فالسارتان بكمسل ٨٠: ٤٢٧٠٣٣٤٢٠٠٠

فالسارتان بكمسل ١٦٠: ٤٢٧١٣٣٤٢٧٠٠٠

للتبسيط وتسهيل القراء، تمت صياغة هذا النشرة بصيغة المنكر، بالرغم من ذلك، الدواء والمعلومات مخصص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل: ديسل فارما تكنولوجيا مرض، شارع دكسل ١، أور-عكيفا٣٠٦٠٠٠٠، إسرائيل