

"פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר באוגוסט 2015"

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 -
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

איקון

טיפות עיניים

תמיסה סטרילית ללא חומר משמר

חומר פעיל:

Sodium Hyaluronate 0.15 mg/ml

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6: "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע
תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח

התרופה מיועדת למבוגרים (מעל גיל 18). עליך להשתמש בה בצורה נכונה.
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם התסמינים
(סימפטומים) של העיניים היבשות מחמירים.

1. למה מיועדת התרופה?

איקון מיועדת לטיפול בתסמיני עיניים יבשות (תסמונת העין היבשה).
קבוצה תרפויטית: תכשירי סיכה לעיניים

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש באיקון:

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה.

במצבים בהם קיים סיכון מוגבר לדלקת חיצונית או פנימית של העין (למשל
אחרי ניתוח עיניים או כאשר למטופל יש נטייה לדלקת).
במטופלים מתחת לגיל 18

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באיקון , ספר לרופא אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד העיניים (כגון גלאוקומה).

לא ידוע האם קיימת השפעה של איקון על הלחץ התוך עיני או על המדידה שלו.

אם אתה לוקח , או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח . אם הנך מטופל בתרופות נוספות לעיניים, יש להמתין לפחות 5 דקות לפני הזלפת טיפות עיניים אייקון. על איקון להיות התרופה האחרונה אשר ניטלת. אם הנך מרכיב עדשות מגע, יש להסירן לפני השימוש בטיפות העיניים אייקון ולהמתין לפחות 30 דקות לפני הרכבת העדשות מחדש.

הריון והנקה

במחקרי רבייה לא הודגם שום סיכון כתוצאה מהשימוש, אך בטיחות השימוש בטיפות אייקון במהלך ההיריון לא נבדקה. היות ואיקון משפיע על העין השפעה פיזיקלית בלבד , ניתן להשתמש בתרופה זו בעת הריון והנקה.

נהיגה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה עלול לגרום לטשטוש ראייה זמני מיד לאחר מתן התרופה ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ראייה תקינה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא :לפי דרגת היובש בעיניים -טיפה אחת, 4-8 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת
לא לבלוע! לשימוש בעיניים.

אופן השימוש:


רחץ היטב את ירך.

אריזת התכשיר מכילה רצועות של בקבוקונים חד פעמיים העטופים בשקיות אלומיניום. פתח שקית אלומיניום והוצא מתוכה את רצועת הבקבוקונים החד

פעמיים. הפרד בקבוקון אחד מהרצועה באמצעות סיבוב הבקבוקון ולא על ידי משיכתו (ראה ציור מס' 1 מטה).

לפתיחת בקבוקון החד פעמי, יש לסובב את חלקו העליון (ראה ציור מס' 2 מטה). שמור את מכסה המכל.

כעת, הטה את ראשך מעט לאחור או שכב על מיטה, הבט כלפי מעלה והרחק מעט את העפעף התחתון מהעין בעזרת האצבע. טפטף טיפה אחת לתוך החלק התחתון של שק הלחמית על ידי לחץ קל על הקצה התחתון של הבקבוקון (ראה ציור מס' 3 מטה). למניעת זיהום התמיסה יש להימנע מכל מגע של פיית הטפטוף עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין. סגור את המכל באמצעות מכסה הבקבוקון (ראה ציור מס' 4). עצום את העיניים קלות למשך מספר דקות.



התכשיר הינו סטרילי כל עוד לא נפגמה אריזת הפלסטיק של הבקבוקון. אין להשתמש בתכשיר בעל אריזה פגומה.

כל בקבוקון ניתן לסגירה חוזרת ולשימוש חוזר במשך 12 שעות.

אין להשתמש בבקבוקון יותר מ 12 -שעות לאחר פתיחתו

לראשונה ואין להעביר אותו מאדם לאדם.

ניתן לשימוש עם כל סוגי עדשות המגע.

אם השתמשת בטעות בכמות גדולה יותר מהנדרש

עד כה לא דווח על תופעות של מינון יתר כתוצאה מטיפול באיקון.

אם שכחת להשתמש באיקון

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיקון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

בזמן השימוש באיקון עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: הרגשת צריבה בעין או טשטוש ראייה לזמן קצר. לאחר תקופת הסתגלות קצרה לתכשיר, תופעות אלו חולפות בדרך כלל. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה החיצונית / תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
 - יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ 25 מעלות צלזיוס.
 - יש לשמור את הבקבוקונים בשקיות הפנימיות ובתוך האריזה החיצונית המקורית, בכדי להגן על התכולה מפני אור.
 - לאחר פתיחה של בקבוקון חד פעמי, ניתן להשתמש בו תוך 12 שעות. לאחר מכן יש להשליך את ה בקבוקון.
 - לאחר פתיחה שקית האלומיניום הפנימית- ניתן להשתמש בבקבוקונים הסגורים תוך 4 שבועות בלבד- ולאחר מכן יש להשליכם.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Water for Injection , Glycerol, Carbomer

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
האריזה מכילה 20 או 30 בקבוקונים חד פעמיים הארוזים בשקיות אלומיניום פנימיות. יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- בעל הרישום וכתובתו: פארמידאס ישראל, רח' הגפן 84, מושב גימזו,
7313000
- שם היצרן וכתובתו:
PHARMA STULLN GmbH
WERKSSTRASSE 3, STULLN 92551, GERMANY .
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 08.2015
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
116-76-29346-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.