

أعمار سنتين حتى ٦ سنين: يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط.

من عمر ٦ سنين: يسوق الدواء بدون وصفة طبيب.

قاكس DM شراب

چوافينيزين ١٠٠ ملخ/٥ مل، دكستروميتورفان هيدروبروميد ١٠ ملخ/٥ مل

Guaifenesin 100 mg/5 ml, Dextromethorphan HBr 10 mg/5 ml

لقائمة المركبات الإضافية في الدواء المفصلة أنتظر الفقرة ٦ - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أستئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والرضع دون عمر سنتين.

لدى أطفال دون عمر ٦ سنين: إعطاء الدواء يلزم وصفة طبيب.

عليك إستعمال الدواء بصورة صحيحة.

إسترشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب في حال تفاقم علامات المرض

(أعراض) أو عدم تحسنها بعد ٧ أيام.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

شراب مقشع لخفيف السعال.

الفصيلة العلاجية:

Dextromethorphan هو مقشع و- Guaifenesin هو مثبطة للسعال.

٢) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (اليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

لا يجوز إستعمال الدواء لدى رُضع دون عمر سنتين.

إذا كنت تتناول دواء من فصيلة مثبطات MAO مثل أدوية مضادة للإكتئاب أو أدوية لعلاج مرض پاركينسون ولفترة أسبوعين بعد انتهاء العلاج بأدوية من هذه الفصيلة.

قبل العلاج بقاكس DM إحك للطبيب إذا:

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة

جهاز التنفس (كالربو) أو الكبد.

كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

كان السعال يترافق بسخونة، حكة أو صداع.

كنت تعاني من سعال متواصل أو مزمن، يترافق بحالات مثل: تدخين، ربو، إلتهاب قصبات مزمن، نفاخ رئوي (emphysema) أو إذا كان السعال يترافق بإفراز غزير من القشوع.

تحذيرات خاصة تتعلق بـاستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة أو لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب!

إذا كنت تتناولت أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول: أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل: أدوية مهدئات، منومة، أدوية پاركينسون، أدوية الصرع); مضادات السعال والرذاق؛ مضادات الربو؛ مضادات الإكتئاب (من فصيلة مثبطات MAO)؛ إذا كنت تتناول دواء من هذه الفصيلة لا يجوز إستعمال شراب قاكس DM. يمكن إستعمال هذا الشراب بعد أسبوعين من انتهاء العلاج بأدوية من هذه الفصيلة.

استعمال الدواء والطعام: من المستحسن عدم تناول الدواء حالاً بعد وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع: إذا كنت حاملاً أو مرضعة، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية.

٣) كيفية إستعمال الدواء:

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والرضع دون عمر سنتين. لدى أطفال من عمر سنتين حتى ٦ سنين فإن إعطاء الدواء يلزم وصفة طبيب.

لدى أطفال من عمر ٦ سنين وما فوق فإن الدواء يسوق دون وصفة طبيب ويصرف من قبل صيدلي فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

للكبار والأطفال من عمر ١٢ سنة وما فوق:

ملعقتين صغيرتين (١٠ مل) كل ٤ ساعات.

لأطفال من عمر ٦ سنين حتى ١٢ سنة: ملعقة صغيرة واحدة (٥ مل) كل ٤ ساعات.

لكل الجنسيين.

لا يجوز تناول أكثر من ٦ جرعات في ٢٤ ساعة.

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

من المستحسن تناول المستحضر مع كأس من الماء.

طريقة إستعمال الدواء - تعليمات عامة:

يجب الحرص على قياس الجرعة بكأس القياس الملحة

بالعبوة.

ملعقة صغيرة (٥ مل) = ١ TSP.

إذا لم يحصل تحسن على وضعك خلال ٧ أيام يجب

مراجعة الطبيب.

إذا تناولت جرعة مفرطة عن طريق الخطأ أو إذا بلغ طفل

بالخطأ من الدواء، توجه للطبيب حالاً أو لغرفة الطوارئ في

المستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

لا تتناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها

دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أستئلة إضافية بخصوص إستعمال الدواء،

إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال قاكس DM قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا يتدهش من قائمة الأعراض

الجانبية. من الجائز إلا تعاني أي منها.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت الأعراض الجانبية

التالية أو إذا كانت مزعجة بصورة خاصة:

إنزعاج في الجهاز الهضمي، نعاس خفيف.

تخفيق هذه الأعراض عادة خلال وقت قصير بعد فترة

التعود على الدواء.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من

عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة

الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة

بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية

عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي

يوجهك إلى التموزج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية،

أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

بالإضافة، بالإمكان تبليغ شركة بيريوجو بواسطة العنوان التالي: www.perrigo-pharma.co.il

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسميم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان

مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع،

وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسمم

تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية

(exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة والقنية. يشير

تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية. لا يجوز التخزين

في البراد. بالإمكان إستعمال خلال ٣ أشهر بعد فتح

القنية لأول مرة.

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Citric acid, FD&C red 40, glycerin, high fructose corn syrup, propylene glycol, natural cherry type flavour, menthol, sucralose, sodium citrate, sodium benzoate, purified water.

كمية الصوديوم في ملعقة صغيرة (٥ مل): 3 mg

كمية المادة الحافظة في ملعقة صغيرة (٥ مل):

Sodium benzoate 5 mg

كمية شراب الفروتكوز في ملعقة صغيرة (٥ مل):

High fructose corn syrup 3,800 mg

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

قنينة تحتوي ١١٨ مل من سائل رائق بلون برتقالي - أحمر

ذو رائحة خفيفة للكرزن.

منتج لأجل ويسوق من قبل: سوبرفارم (ישראל) מ.ض.

ص.ب. ٢١٧١، هرتسليا ٤٦٧٢٥١٦.

صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات بيريوجو إسرائيل م.ض.

شارع ليحي ٢٩،بني - براق ٥١٢٠٠.

اسم المنتج وعنوانه: شركة بيريوجو، آيلchan، ميشيغان،

الولايات المتحدة.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فحص

وრخص في حزيران ٢٠١٢

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة

الصحة: ١٤٨٢٩-٣٣٦٧١

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة

بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص

لكل الجنسين.